

AMPERA®

Fungicidas

Veikloji medžiaga: tebukonazolas 133 g/l + prochlorazas 267 g/l.

Aliejinė vandeninė emulsija.

Veikimo spektras: AMPERA® – plataus spektro triazolų ir imidazolų fungicidų klasės sisteminis fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, rugių ir kvietrugių pasėliuose, taip pat žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose grybinėms ligoms naikinti.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.



KENKSMINGAS



APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO!

Dirgina akis.

Kenksmingas prarijus.

Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

Gali pakenkti negimusiam vaikui.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius neigiamus vandens ekosistemų pakitimus.

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Dirbant su produktu nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Vengti patekimo į akis.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių, jeigu nėra nustatytas kitoks apsauginis atstumas paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos apraše.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties plotų.

Siekiant apsaugoti bites ir kitus augalus apdulkinančius vabzdžius, negalima naudoti augalų apsaugos produkto bičių aktyvaus maitinimosi metu.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote. (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių ir vengti taršos per drenažą iš sodybyų ar nuo kelių.)

Pakuotė: 1, 5, 10, 20, 200 l

Registracijos numeris: 0358F/08

Siuntos numeris: žiūrėti ant įpakavimo

Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo

Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas:

Makhteshim-Agan Holland B.V.
 P.O. Box 355
 NL-3830 AK Leusden
 The Netherlands
 Tel: +31 33 494 84 94
 Fax: +31 33 494 80 44
Atstovas Lietuvoje: 8-5 2108622

Gamintojas:

Makhteshim Chemical Works Ltd
 P.O. Box 60
 Ind. Zone, Be'er Sheva 84100
 Izraelis

**PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTO
 NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ.
 SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS,
 BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.
 NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS**

AMPERA® POVEIKIO SPEKTRAS

Stiebalūžė (<i>Oculimacula</i> spp.)	kviečiai
Lapų septoriozė (<i>Septoria tritici</i>)	kviečiai, kvietrugiai
Varpų septoriozė (<i>Septoria nodorum</i>)	kviečiai, kvietrugiai
Geltonosios rūdys (<i>Puccinia striiformis</i>)	kviečiai, kvietrugiai
Rudosios rūdys (<i>Puccinia recondita</i>)	kviečiai, rugiai, kvietrugiai
Smulkiosios rūdys (<i>Puccinia hordei</i>)	miežiai
Varpų fuzariozė (<i>Fusarium</i> spp)	kviečiai, rugiai, kvietrugiai
Miltligė (<i>Blumeria graminis</i>)	kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai
Rinchosporiozė (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	miežiai, rugiai
Tinkliškoji dryžligė (<i>Pyrenophora teres</i>)	miežiai
Baltasis (sklerotinis) puvinys (<i>Sclerotinia sclerotorium</i>)	rapasai
Juodoji dėmėtligė (<i>Alternaria</i> spp.)	
Fomozė (<i>Phoma lingam</i>)	

ŽIEMINIAI IR VASARINIAI JAVAI

Purškimo norma: 1,0–1,5 l/ha.

Didesnė fungicido norma naudojama jautresnių ligoms javų veislių pasėliuose ar intensyviai plintant ligoms ir kai pasėliai purškiami vieną kartą.

Vandens kiekis: 200–300 l/ha. Priklauso nuo pasėlio dydžio ir tankumo.

Didžiausias vandens kiekis rekomenduojamas vešliems pasėliams, ypač sausomis oro sąlygomis.

Didžiausias purškimų skaičius: 2. Intervalas tarp purškimų – mažiausiai 3 savaitės.

Karencija: 30 dienų.

AMPERA® apsaugo nuo žemiau išvardintų ligų, jeigu produktas naudojamas pagal rekomendacijas.

<i>Ligos</i>	<i>Norma l/ha</i>	<i>Naudojimo rekomendacija</i>
Stiebalūžė (<i>Oculimacula</i> spp.)	1,5	Nuo stiebalūžės žieminių kviečių pasėliai purškiami nuo augalų bambėjimo pradžios iki antro bamblio (BBCH 30–32) tarpsnio.

		Nupurškus nuo stiebalūžės, pasėlis tuo pačiu metu bus apsaugotas nuo septoriozės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių bei miltligės ankstyvo išplitimo.
Lapų septoriozė (Septoria tritici) Varpų septoriozė (Stagonospora nodorum) Miltligė (Blumeria graminis) Rudosios rūdys (Puccinia recondita) Geltonosios rūdys (Puccinia striiformis)	1,0–1,5	Nuo lapų ligų pasėliai sezono metu purškiami vieną arba du kartus pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Naudojimo laikas: nuo bamblėjimo tarpsnio iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 32–59). Purškiant AMPERA® nuo septoriozės, rūdžių bei dryžligės, fungicidas iš dalies apsaugos ir nuo miltligės.
Varpų fuzariozė (Fusarium spp.)	1,5	Nuo varpų fuzariozės pasėliai purškiami žydėjimo metu (BBCH 65). Panaudojus AMPERA® nuo varpų fuzariozės, augalai taip pat bus apsaugoti nuo varpų septoriozės bei juodligės.

ŽIEMINIAI IR VASARINIAI MIEŽIAI

<i>Ligos</i>	<i>Norma l/ha</i>	<i>Naudojimo rekomendacija</i>
Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres) Smulkiosios rūdys (Puccinia hordei) Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis) Miltligė (Blumeria graminis)	1,0–1,5	Pasėliai sezono metu purškiami vieną arba du kartus pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams nuo augalų bamblėjimo pradžios iki išplaukėjimo (BBCH 30–59). Purškiant AMPERA® nuo rūdžių bei dryžligės, fungicidas iš dalies apsaugos ir nuo miltligės. Dryžligei pradėjus plisti bamblėjimo pradžioje, pasėlius reiktų apdoroti du kartus: pirmą kartą – ligos plitimo pradžioje, antrą kartą – po 3 savaitių. Kai dryžligė pradeda plisti po vėliavinio lapo pasirodymo (BBCH 37), vienas purškimas AMPERA® duos gerų rezultatų.

RUGIAI

<i>Ligos</i>	<i>Norma l/ha</i>	<i>Naudojimo rekomendacija</i>
Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis) Rudosios rūdys (Puccinia recondita) Miltligė (Blumeria graminis)	1,0–1,5	Nuo lapų ligų pasėliai sezono metu purškiami vieną arba du kartus pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Naudojimo laikas: nuo augalų bamblėjimo tarpsnio iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 32–59).

KVIETRUGIAI

<i>Ligos</i>	<i>Norma l/ha</i>	<i>Naudojimo rekomendacija</i>
Lapų ir varpų septoriozė (<i>Septoria tritici</i> ; <i>Stagonospora nodorum</i>) Rudosis rūdys (<i>Puccinia recondita</i>) Miltligė (<i>Blumeria graminis</i>)	1,0–1,5	Nuo lapų ligų pasėliai sezono metu purškiami vieną arba du kartus pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Naudojimo laikas – nuo augalų bambėjimo tarpsnio iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 32–59). Purškiant AMPERA [®] nuo septoriozės, rūdžių, fungicidas iš dalies apsaugos ir nuo miltligės.

Pastaba: nupurškus fungicidu AMPERA[®] kviečius, ant lapų trumpam laikui gali atsirasti taškelių, tačiau tai nesukels neigiamo poveikio derliui.

ŽIEMINIAI IR VASARINIAI RAPSAI

Purškimo norma: 1,0–1,2 l/ha

Vandens kiekis: 200–400 l/ha.

Didžiausias vandens kiekis rekomenduojamas vešliems pasėliams.

Didžiausias purškimų skaičius: 1.

Karencija: **56 dienos.**

<i>Ligos</i>	<i>Norma l/ha</i>	<i>Naudojimo rekomendacija</i>
Juodoji dėmėtligė (<i>Alternaria</i> spp.)	1,0–1,2	Pasėliai purškiami vieną kartą. Naudojimo laikas – nuo žydėjimo pabaigos iki ankštųjų formavimosi pradžios tarpsnio (BBCH 69–71). Didesnė fungicido norma naudojama jautresnių ligoms rapsų veislių pasėliuose ar intensyviai plintant ligoms.
Baltasis (sklerotinis) puvinyš (<i>Sclerotinia sclerotorum</i>)	1,0–1,2	Pasėliai purškiami vieną kartą. Naudojimo laikas – rapsų žydėjimo metu (BBCH 63–69) Didesnė fungicido norma naudojama jautresnių ligoms rapsų veislių pasėliuose ar prognozuojant ligos protrūkį.
Fomozė (<i>Phoma lingam</i>)	1,0–1,2	Žieminių rapsų pasėliai purškiami vieną arba du kartus. Pasėliai purškiami rudenį pasirodžius pirmiesiems ligos simptomams (BBCH 13–19).

TIRPALO RUOŠIMAS

Prieš naudojimą produktą gerai suplakite. Prieš pradėdami darbą, reikia sureguliuoti purkštuvą, patikrinti jo rezervuarą, vamzdynų, purkštukų švarumą. Reikiamą produkto kiekį būtina iš pradžių išmaišyti nedideliame vandens kiekyje, o vėliau, įjungus maišyklę, supilti į pripildytą vandeniu purkštuvą. Purškimo ir pertraukų metu maišyklė turi būti įjungta. Visas tirpalas tuoj pat išpurškiamas. Tuščią pakuotę reikia išskalauti švariu vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkšti. Kasdien po darbo ar keičiant produktus, purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu.

ATSPARUMAS

Yra tikimybė, kad fungicidui AMPERA® (kaip ir kitiems fungicidams) gali atsirasti ligų atsparumas. Pasėlis neturėtų būti pakartotinai purškiamas vėl šiuo produktu, kad neatsirastų atsparių patogeninių populiacijų (pvz., miltligė). Siekiant išvengti atsparių ligų formų atsiradimo, AMPERA® turėtų būti naudojamas maišant su kitu fungicidu arba iš viso keičiamas kitu produktu, turinčiu kitokį poveikį.

TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS

Tuščią pakuotę reikia uždaryti, pažymėti ir sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Naudoti kitiems tikslams draudžiama.

SAUGOJIMAS

Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, ne aukštesnėje kaip +50 °C ir ne žemesnėje kaip 0 °C temperatūroje, atskirai nuo maisto produktų, vandens, pašarų ir trąšų. Saugoti nuo šalnų. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Saugoti nuo šalčio.

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA

Gesinimo priemonės: nedidelį gaisrą gesinkite gesinimo milteliais, vandeniu, anglies dioksidu. Esant dideliame gaisrui, gesinkite vandeniu, putomis.

Nutekančiam vandeniui surinkti padarykite laikinas žemės sankasas.

Gaisro metu gali išsiskirti kenksmingų garų (azoto oksidas, chloro vandenilis, chloridai, anglies monoksidas).

Gesindami dėvėkite dujokaukes su kombinuotais filtrais.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su fungicidu AMPERA®, būtina naudoti asmens apsaugos priemones – cheminėms medžiagoms atsparias pirštines ir darbo drabužius, kaukę su filtru, apsaugančią nuo skystų aerozolių, bei veido kaukę arba apsauginius akinius. Darbo metu negalima valgyti, rūkyti ir gerti. Saugokitės, kad produkto nepatektų į kvėpavimo takus, akis, virškinamąjį traktą. Dirbdami lauke atkreipkite dėmesį į vėjo kryptį, stenkitės neįkvėpti purškiamo tirpalo dulksnos. Produktas pavojingas akims, tad dėvėkite apsauginius akinius. Jei produkto pateko ant odos, reikia nuplauti švariu vandeniu ir muilu. Jei produkto pateko į akis, nedelsdami gerai išplaukite švariu vandeniu. Baigę darbą, nusiprauskite vandeniu ir muilu, persirenkite. Tuščią pakuotę padėkite tam skirtoje vietoje; naudoti jos kitiems tikslams draudžiama.

PIRMOJI PAGALBA

Patekus produkto ant odos, nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius, o odą nuplaukite šilto vandens srove ir muilu.

Patekus į akis, plaukite jas švariu vandeniu mažiausiai 15 minučių ir nedelsdami kreipkitės į akių gydytoją.

Prarijus, nesukelkite vėmimo. Išplaukite burna dideliu kiekiu vandens. Nieko neduokite į burną nukentėjusiajam be sąmonės. Jei kvėpavimas sunkus, reikalingas kvėpavimo aparatas. Jeigu nekvėpuoja, padarykite dirbtinį kvėpavimą. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Įkvėpus garų, nukentėjusį išveskite į gryną orą. Kreipkitės į gydytoją komplikacijų atveju..

Pastaba gydytojui: priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. Nuriijimo atveju išplaukite skrandį ir duokite aktyvuotosios anglies.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

PASTABA

Gamintojas garantuoja kokybę produkto, gauto gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei produktas netinkamai saugomas ir naudojamas.

AMPERA[®] – registruotas Makhteshim-Agan Industries Ltd prekinis ženklas.