

**AUGALŲ AUGIMO REGULIATORIAI**

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
1.	<b>Caryx</b> BASF A/S 0466AR/13 2020-02-28	Mepikvat chloridas + metkonazolas 210+30 g/l	0,7-1,4	Žieminiai rapsai	Purkšti rudenį, kai 3 lapas išsivystęs-iki šoninių ūglių formavimosi (BBCH 13-20)	1	Pavojingas. Smarkiai pažeidžia akis. Kenksmingas įkvėpus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus į akis: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Jei sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Prarijus: Pasijutus blogai skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Įkvėpus: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė
		0,7-1,4	Žieminiai rapsai	Purkšti pavasarį, kai susiformuoja 1 šoninis ūglis-iki matomo pirmieji žiedlapiai, tačiau žiedpumpuriai vis dar neišsiskleidę (BBCH 21-59)	1		

								<p>ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.</p> <p>Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.</p> <p>Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.</p> <p>Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Talpyklą atiduoti į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių.</p> <p>Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.</p>
2.	<b>Cerone</b> Bayer CropScience AG 0146R/05, 2015-02-25	Etefonas 480 g/l	0,5	Žieminiai kviečiai	Purškiama nuo paskutinio lapo pasirodymo iki vamzdelėjimo vidurio, kai sustorėja paskutinio lapo lapamakštė		2	
			0,75-1,0	Žieminiai rugiai	Purškiama nuo paskutinio lapo pasirodymo iki pirmųjų akuotų pasirodymo		2	
			0,5	Vasariniai kviečiai	Purškiama nuo paskutinio lapo pasirodymo iki vamzdelėjimo vidurio, kai sustorėja paskutinio lapo lapamakštė		1	
			0,5	Vasariniai miežiai	Purškiama nuo antrojo bamblio susiformavimo iki pirmųjų akuotų pasirodymo		1	

3.	<b>Cycoceel 750</b> BASF A/S, 0093R/01, 2015-05-31	Chlormekvatchloridas 750 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai	Pasėliai purškiami krūmijimosi pabaigoje - bamblių pradžioje		1	
			2,0	Žieminiai rugiai	Pasėliai purškiami krūmijimosi pabaigoje - bamblių pradžioje		1	
			1,0	Vasariniai miežiai, kviečiai	Pasėliai purškiami krūmijimosi metu		1	
4.	<b>Cycogan</b> Makhteshim – Agan Holland B. V. 0194R/00, 2014-05-31	Chlormekvat chloridas 675 g/l	1,1	Žieminiai kviečiai	Pasėliai purškiami bamblių pradžioje		2	Saugo javus nuo išgulimo
			1,0	Vasariniai kviečiai	Pasėliai purškiami krūmijimosi stadijoje		2	
5.	<b>CCC</b> Nufarm GmbH & Co KG, 0142R/03, 2015-05-31	Chlormekvatchloridas 750 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Pasėliai purškiami nuo pilno krūmijimosi iki pirmojo bamblio pasirodymo		1	
			0,5	Vasariniai miežiai	Pasėliai purškiami krūmijimosi metu		1	
6.	<b>Cuadro 25 EC</b> Cheminova A/S 0463AR/13 2018-04-30	Trineksapak etilas 250 g/l	0,2-0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti nuo bamblių pradžios iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 30–39)		1	Saugo nuo išgulimo. Augimo reguliatorius klasifikuojamas: Atsargiai. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio
			0,2-0,3	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo bamblių pradžios iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 30–39)		1	
			0,4-0,6	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Purkšti nuo bamblių pradžios iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 30–39)		1	
			0,4-0,6	Žieminiai rugiai, kvietrugiai	Purkšti nuo bamblių pradžios iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 30–39)		1	
			0,4-0,8	Gausiažiedės bei daugiametės svidrės	Purkšti nuo bamblių pradžios iki žiedyno susidarymo (BBCH 30–49)		1	
			0,8	Nendriniai ir raudonieji eraičinai	Purkšti nuo bamblių pradžios iki žiedyno susidarymo (BBCH 30–49)		1	
			0,5-0,8	Pašariniai motiejukai, šnažolės	Purkšti nuo bamblių pradžios iki žiedyno susidarymo (BBCH 30–49)		1	

								vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Pakuotė: 5 l.
7.	<b>Medax Top</b> BASF A/S 0382R/10 2020-04-01	Mepikvatchloridas + kalcio proheksadionas 300 + 50 g/l.	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Purkšti nuo bamblių pradžios (BBCH 30) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) tankius, gerai įtręštus pasėlius, ilgus šiaudus turinčiose veislėse, kai vyrauja vėsūs, lietingi orai		1	
			0,75-1,0	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Purkšti nuo bamblių pradžios (BBCH 30) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) lengvuose dirvožemiuose auginamus, atsparesnių išgulimui veislių javus, kai yra šilta ir pakanka drėgmės			
			1,0	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo bamblių pradžios (BBCH 30) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) tankius, gerai įtręštus pasėlius, ilgus šiaudus turinčiose veislėse, kai vyrauja vėsūs, lietingi orai		1	
			0,5	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo bamblių pradžios (BBCH 30) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) lengvuose dirvožemiuose auginamus, atsparesnių išgulimui veislių javus, kai yra šilta ir pakanka drėgmės			
8.	<b>Moddus 250 EC (A7725M)</b> Syngenta Crop Protection AG, 0219R/11, 2021-02-14	Trineksapak etilas 250 g/l	0,3-0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-34)		1	Saugo javus nuo išgulimo
			0,2-0,3	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-32)		1	
			0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-33)		1	

9.	<b>Optimus</b> Makhteshim – Agan Holland B.V. 0413R/11 2018-04-30	Trineksapak etilas 175 g/l	0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 31–37)	1	Saugo javus nuo išgulimo
			0,4	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30–37)	1	
			0,2-0,5	Žieminiai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)	1	
			0,2-0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)	1	
10.	<b>Stabilan 750</b> Nufarm GmbH & Co KG, 0141R/03, 2015-05-31	Chlormekvachloridas 750 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Pasėliai purškiami nuo pilno krūmijimosi iki pirmojo bamblio pasirodymo	1	
			0,5	Vasariniai miežiai	Pasėliai purškiami krūmijimosi metu	1	
11.	<b>Terpal 460</b> BASF A/S, 0163R/05, 2015-07-30	Mepikvachloridas + etefonas 305 +155 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai	Pasėliai purškiami nuo antrojo bamblio tarpsnio iki lapamakštės sustorėjimo	1	
			1,0-1,5	Žieminiai rugiai	Pasėliai purškiami nuo antrojo bamblio tarpsnio iki lapamakštės sustorėjimo	1	
			1,0	Vasariniai miežiai	Pasėliai purškiami nuo antrojo bamblio tarpsnio iki pasirodant paskutiniam lapui	1	
10.	<b>Trimaxx</b> Makhteshim – Agan Holland B.V. 0412R/11 2018-04-30	Trineksapak etilas 175 g/l	0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 31–37)	1	Saugo javus nuo išgulimo
			0,4	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30–37)	1	
			0,2-0,5	Žieminiai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)	1	
			0,2-0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)	1	

## DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS

Preparato pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Apdorojimas	Kenksmingi organizmai	Pastabos
1. <b>Menno Florades</b> Menno Chemie-Vertriebs Ges.m.b.H, 0257/05, 2015-11-07	Benzoinė rūgštis 90 g/l	Paviršių, vazonėlių šiltnamiuose dezinfekcijai	Dezinfekuojama 1–4% tirpalu/ 16 valandų	Virusai	Gali pagreitinti metalų koroziją
			Dezinfekuojama 1 % tirpalu/ 16 valandų	Bakterijos, grybai	
		Peilių, įrangos, naudojamų šiltnamiuose, dezinfekcijai	Dezinfekuojama 2–3 % tirpalu/ 3 minutes	Virusai	
			Dezinfekuojama 1 % tirpalu/ 3 minutes	Bakterijos, grybai, viroidai	
		Dėžės, padėklai, sandėliai, transporteriai, transporto priemonės, pakrovimo vietos, techninė įranga naudojama bulvių auginimo technologijose	Dezinfekuojama 2 % tirpalu	Virusai, bakterijos, grybai, viroidai	