

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
1.	<b>Acrobat Plus</b> BASF A/S, 0160F/11, 2018-09-30	Dimetomorfis + mankocebas 90 + 600 g/kg	2,0	Bulvės	Maras, sausligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	7	8	
			2,0	Ropiniai švogūnai	Netikroji miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	14	3	
2.	<b>Acanto 250 SC</b> Du Pont Finland Ltd., 0333F/07, 2017-10-15	Pikoksistrobinas 250 g/l	0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rūdys, kviečių dryžligė, septoriozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	Didžiausia norma per sezoną 1,0 l/ha
			0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,5-1,0	Žieminiai rugiai, kvietrugiai	Miltligė, rūdys, rinchosporiozė, septoriozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,5	Avižos	Miltligė, rūdys, avižų dryžligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis)puvinys	Purkšti vegetacijos metu	Baigiant žydėti rapsams (BBCH 69)	1	Didžiausia norma per sezoną 1,0 l/ha
			0,5-1,0	Rapsiukai	Baltasis (sklerotinis) puvinys	Purkšti vegetacijos metu	Baigiant žydėti rapsams (BBCH 69)	1	
			0,5-1,0	Cukriniai runkeliai	Miltligė, baltuliai, rudmargė, rūdys (dalinai)	Purkšti vegetacijos metu	42	2	

3.	<b>Acanto Prima</b> Du Pont Finland Ltd. 0334F/11, 2021-04-28	Pikoksistrobinas+ ciprodinilas 80 +300 g/l	1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė rudosios rūdys, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	1	Didžiausia norma per sezoną 1,5 l/ha
			1,5 (po 0,75 kg/ha 2 kartus)	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė rudosios rūdys, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	po 0,75 kg/ha 2 kartus	
			1,0-1,5	Rugiai	Miltligė, rūdys, rinchosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	1	
			1,5 (po 0,75 kg/ha 2 kartus)	Rugiai	Miltligė, rūdys, rinchosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	po 0,75 kg/ha 2 kartus	
			1,0-1,5	Kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė rudosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	1	
			1,5 (po 0,75 kg/ha 2 kartus)	Kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė rudosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	po 0,75 kg/ha 2 kartus	
			0,75-1,0	Avižos	Miltligė, avižų dryžligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	1	
			1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	1	
			1,5 (po 0,75 kg/ha 2 kartus)	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	po 0,75 kg/ha 2 kartus	
4.	<b>Adexar</b> BASF A/S, 0449F/12 2019-04-30	Fluksapiroksadas + epoksikonazolas 62,5+62,5 g/l	2,0	Žieminiai kviečiai, žieminiai kvietrugiai	Lapų, varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai kviečiai, žieminiai kvietrugiai	Lapų, varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys,	Purkšti vegetacijos metu	35	2	

					kviečių dryžligė, miltligė, stiebalūžė			
		2,0	Žieminiai rugiai		Geltonosios, rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1
		1,0	Žieminiai rugiai		Geltonosios, rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2
		2,0	Žieminiai miežiai		Geltonosios rūdys, rudosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1
		1,0	Žieminiai miežiai		Geltonosios rūdys, rudosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2
		2,0	Vasariniai kviečiai		Lapų, varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1
		1,0	Vasariniai kviečiai		Lapų, varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2
		2,0	Vasariniai miežiai		Geltonosios rūdys, rudosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija	Purkšti vegetacijos metu	35	1
		1,0	Vasariniai miežiai		Geltonosios rūdys, rudosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija	Purkšti vegetacijos metu	35	2
		2,0	Avižos		Vainikuotosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1
		1,0	Avižos		Vainikuotosios rūdys,	Purkšti vegetacijos metu	35	2

					miltligė	metu			
5.	<b>Allegro</b> BASF A/S, 0175F/99, 2015-12-31	Krezoksim metilas + epoksikonazolas 125 + 125 g/l	0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, septoriozė, rusvoji dėmėtligė, rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	20	2	Didesnė norma naudojama ligoms intensyviai plintant. Saugoti nuo patekimo į vandens telkinius.
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Rusvoji dėmėtligė, rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	20	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, rūdys, tinkliškoji dryžligė, septoriozė, rinchosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	20	2	
6.	<b>Allegro Plus</b> BASF A/S, 0176F/99, 2015-12-31	Krezoksim metilas + epoksikonazolas + fenpropimorfas 125 + 125 + 150 g/l	0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, septoriozė, rusvoji dėmėtligė, rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	20	1	Didesnė norma naudojama ligoms intensyviai plintant. Saugoti nuo patekimo į vandens telkinius
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, rūdys, tinkliškoji dryžligė, septoriozė, rinchosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	20	2	
7.	<b>Allegro Super</b> BASF A/S, AS2-50F/2014 2020-04-30	Krezoksim- metilas + epoksikonazolas + fenpropimorfas 83 +83 +317 g/l	1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai arba	Miltligė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, stiebalūžė, juodligė (dalinai)	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Fungicido forma: suspoemulsija Fungicidas klasifikuojamas: Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksmingas įkvėpus. Įtariama, kad sukelia vėžį. Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos
			0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, stiebalūžė, juodligė (dalinai)	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai arba	Miltligė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, stiebalūžė, juodligė (dalinai)	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, stiebalūžė, juodligė (dalinai)	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai arba	Miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	

			0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	<p>priemonės.</p> <p>Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerosolio.</p> <p>Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.</p> <p>Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.</p> <p>Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.</p> <p>Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.</p> <p>Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.</p> <p>Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo / filtravimo sistema).</p> <p>Purkšti galima tik traktoriniais lauko purkštuvais / traktoriais, turinčiais sandarias kabinas su</p>
			1,5	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosis rūdys, stiebalūžė, juodligė (daliniai)	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosis rūdys, stiebalūžė, juodligė (daliniai)	Purkšti vegetacijos metu	35	2	

									oro kondicionavimo / filtravimo sistema, turinčiais didesnes nei 2000 l rezervuaro talpas vandeniui ir užgriebio plotį nuo 18 metrų. Pakuotė: 5 l, 10 l
8.	<b>Amistar 250 SC</b> Syngenta Crop Protection AG., 0255F/07, 2015-12-31	Azoksistrobinas 250 g/l	0,75-1,0	Žieminiai kviečiai	Rudosis ir geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, septoriozė, varpų juodligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu per 1 kartą naudojant 0,75-1,0 l/ha, per 2 kartus po 0,5 l/ha	35	2	
			0,75-1,0	Vasariniai miežiai	Dryžligės, smulkiosios rūdys, ramularija, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1	
			0,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, pilkasis puvinys, dalinai fomozė	Purkšti vegetacijos metu			
			0,8	Svogūnai	Netikroji miltligė	Purkšti ropelių formavimosi tarpsnyje, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams	14	2	
			0,8	Kopūstai (vidutinio vėlyvumo ir vėlyvieji)	Juodoji dėmėtligė	Purkšti gūžių formavimosi tarpsnyje, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams	14	2	
			0,8	Morkos	Alternariozė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams	10	2	
			0,1% tirpalas	Pomidorai, auginami šiltnamiuose	Maras, sausligė	Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams	3	2	

9.	<b>Amistar xtra</b> Syngenta Ltd., 0260F/04, 2015-12-31	Azoksistrobinas + ciprokonazolas 200 + 80 g/l	0,75-1,0	Žieminiai kviečiai	Miltligė, septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	21	1	
			0,75-1,0	Vasariniai miežiai	Miltligė, dryžligė, septoriozė, rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	21	1	
			0,8-1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis (sklerotinis) puvinys, pilkasis puvinys, fomozė (dalinė apsauga)	Purkšti vegetacijos metu	21	1	
10.	<b>Amistar opti 480 SC</b> Syngenta Crop Protection AG 0347F/08 2018-02-20	Azoksistrobinas + chlorotalonilas 80+400 g/l	2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1	
			2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1	
11.	<b>Ampera</b> Adama Registrations B.V. 0358F/08 2015-12-31	Tebukonazolas + prochlorazas 133 + 267 g/l	1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Stiebalūžė, lapų ir varpų septoriozė, miltligė, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, varpų fuzariozė	Purškiama vegetacijos metu	30	2	Didesnė fungicido norma naudojama jautresnių ligoms kviečių (miežių, rugių, kvietrugių) veislėse ar intensyviai plintant ligoms ir kai pasėliai purškiami vieną kartą
			1,0 – 1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	30	2	
			1,0 – 1,5	Žieminiai rugiai	Miltligė, rudosios rūdys, rinchosporiozė	Purškiama vegetacijos metu	30	2	
			1,0 – 1,5	Žieminiai kvietrugiai	Miltligė, rudosios rūdys, lapų ir varpų septoriozė	Purškiama vegetacijos metu	30	2	
			1,0 – 1,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis sklerotinis puvinys, fomozė	Purškiama vegetacijos metu	56	1	Didesnė fungicido norma naudojama jautresnių ligoms rapsų veislėse ir intensyviai plintant ligoms

12.	<b>Archer Turbo 575 EC</b> Syngenta Crop Protection AG, 0457F/13, 2019-12-31	Propikonazolas + fenpropidinas 125 + 450 g/l	0,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai	Miltligė	Purkšti bambklėjimo (BBCH 31-33) metu	42	1	
			0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rudosios rūdys, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė	Purkšti nuo bambklėjimo pabaigos iki žydėjimo vidurio (BBCH 37-65)	42	1	
			0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, rudosios rūdys, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė	Purkšti nuo bambklėjimo pabaigos iki žydėjimo vidurio (BBCH 37-65)	42	1	
			0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė	Purkšti nuo bambklėjimo pabaigos iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 37-59)	42	1	
			0,8-1,0	Žieminiai rugiai	Miltligė, rudosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti nuo bambklėjimo pabaigos iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 32-59)	42	2	
13.	<b>Artea 330 EC</b> Syngenta Crop Protection AG, 0182F/00, 2015-05-31	Propikonazolas + ciprokonazolas 250 + 80 g/l	0,4-0,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Septoriozė, miltligė, rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	42	2	
			0,4-0,5	Vasariniai miežiai	Rūdys, dryžligė, rinchosporiozė, septoriozė, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	42	2	
			0,4-0,5	Cukriniai runkeliai	Rudmargė, baltuliai, fomozė, alternariozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	42	1	
14.	<b>Ataka NT</b> Indofil Industries Limited, 0217F/09, 2019-12-16	Mankocebas 750 g/kg	2,0	Bulvės	Maras, sausligė	Purškama vegetacijos metu	7	8	Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Labai toksiškas vandens
			2,5	Ropiniai svogūnai, Shallot svogūnai, česnakai	Netikroji miltligė, rūdys	Purškama vegetacijos metu	28	4	
			2,5	Porai	Fitoftorozė, rūdys	Purškama	28	3	



					vegetacijos metu			<p>organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Stengtis neįkvėpti dulkių / aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 40 metrų apsaugos zoną purškiant sėklavaisius, kaulavaisius ir vaiskrūmius, 5 metrų apsaugos zoną purškiant šakniagumbines ir svogūnines daržoves ir 3 metrų apsaugos zoną purškiant</p>
2,0	Morkos, pastarnokai	Alternariozė (juodoji dėmėtligė)	Purškiama vegetacijos metu	30	4			
2,0	Žiediniai kopūstai, brokoliai	Netikroji miltligė, alternariozė	Purškiama vegetacijos metu	30	4			
2,0	Žieminiai kviečiai	Lapų septoriozė, rudosios rūdys	Purškiama vegetacijos metu	60	2			
2,0	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purškiama vegetacijos metu	28	4			
2,0	Slyvos, vyšnios	Slyvų rūdys, rudasis vaisių puvinys	Purškiama vegetacijos metu	30	4			
2,13	Juodieji serbentai	Deguliai	Purškšti vegetacijos metu	30	4			

									kitus augalus iki paviršinio vandens telkinių. Pakuotė: 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg
15.	<b>Barclay Bolt XL</b> Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., 0451F/13 2017-01-31	Propikonazolas 250 g/l	0,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios ir geltonosios rūdys, varpų juodligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios ir geltonosios rūdys, varpų juodligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,5	Žieminiai rugiai	Miltligė, rudosios rūdys, varpų juodligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,5	Avižos	Miltligė, varpų juodligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,5	Varpinės žolės	Miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
			0,5	Varpinės žolės sėklai	Miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,5	Cukriniai runkeliai	Baltuliai	Purkšti vegetacijos metu	28	2	
16.	<b>Bell</b> BASF A/S AS2-42F/2014 2019-07-31	Boskalidas + epoksikonazolas 233 + 67 g/l	1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	1	Fungicidas klasifikuojamas: Pavojingas. Smarkiai pažeidžia akis. Įtariama, kad sukelia vėžį. Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 1,2-benzotiazol-3(2H)-ono su 2-metilozotiazol-3(2H)-onu. Gali sukelti alerginę reakciją. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias
			0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	2	
			1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	1	
			0,75	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	2	

			1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	1	instrukcijas. Mūvēti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
			0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu.	35	2	Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.
			1,5	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.
			0,75	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	Surinkti ištekėjusią medžiagą.
			1,5	Avižos	Vainikuotosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
			0,75	Avižos	Vainikuotosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 5 l
17.	<b>Bell Super</b> BASF A/S 0419F/12 2020-04-30	Boskalidas + epoksikonazolas 140+50 g/l	2,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Pakuotė: 1 l, 5l, 10l.
			1,25	Žieminiai ir vasariniai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios	Purkšti vegetacijos metu	35	2	

				kviečiai	rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė				
			2,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,25	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,25	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
18.	<b>Bumper 25 EC</b> Adama Registrations B.V. 0164F/08 2018-04-11	Propikonazolas 250 g/l	0,5	Žieminiai kviečiai	Septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	30	2	
			0,5	Vasariniai kviečiai	Septoriozė, miltligė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	30	2	
			0,5	Vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rudadėmė dryžligė, rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	30	2	
19.	<b>Bumper super 490 EC</b> Adama Registrations B.V. 0283F/06, 2015-12-31	Prochlorazas + propikonazolas 400 + 90 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Stiebalūžė, septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė, dryžligė, juodligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	20	2	
			0,8-1,0	Cukriniai runkeliai	Lapų baltuliai, rudmargė, fomozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu. Purškiant per 2 kartus naudoti po 0,4-0,5 l/ha.	20	2	
20.	<b>Candit</b> BASF A/S, 0192F/07,	Krezoksimetilas 500 g/kg	0,2	Obelys, kriaušės	Rauplės, miltligė, vaisių puviniai	Purškama vegetacijos metu	35	3	Fungicido forma: vandenyje dispersiškos granulės
			0,2	Serbentai	Tamsioji miltligė,	Purškama	14	2	Fungicidas klasifikuojamas:

2015-12-31			veimutrūdė, deguliai, serbentų šviesmargė	vegetacijos metu			<p>Atsargiai. Įtariama, kad sukelia vėžį. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną vaiskrūmiams ir 20 metrų apsaugos zoną vaismedžiams iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti produkto smėlinguose su mažu organinių medžiagų kiekiu dirvožemiuose. Pakuotė: 0,2 kg</p>
		Agurkai, auginami šiltnamiuose	Miltligė	Purškiama vegetacijos metu 0,02% tirpalu	4	2	
	0,2	Braškės	Miltligė	Purškiama vegetacijos metu	14	2	
		Dekoratyviniai augalai	Rožių miltligė, rožių rudoji dėmėtligė, begonijų miltligė, fitoftora, gvazdikų rūdys	Purškiama vegetacijos metu 0,02% tirpalu		3	
		Dekoratyviniai augalai	Chrizantemų baltosios rūdys	Purškiama vegetacijos metu 0,1%		3	

21.	<b>Cantus</b> BASF A/S, 0319F/09, 2019-12-16	Boskalidas 500 g/kg	0,5	Žieminiai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė, fomozė	Purškiama vegetacijos metu	-	2	
			0,5	Vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė, fomozė	Purškiama vegetacijos metu	-	1	
22.	<b>Capalo</b> BASF A/S AS2- 41F/2014 2019-04-30	Epoksikonazolas + Fenpropimorfais+ Metrafenonas 62,5 + 200 +75 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, stiebalūžė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	<p>Fungicidas klasifikuojamas: Pavojingas. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Įtariama, kad sukelia vėžį. Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.</p> <p>Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerolio.</p> <p>Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal</p>
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, stiebalūžė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, miltligė, rinchosporiozė, stiebalūžė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, miltligė, rinchosporiozė, stiebalūžė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
			2,0	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys, stiebalūžė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
			2,0	Avižos	Miltligė, vainikuotosios rūdys	Purškiama vegetacijos metu	35	1	

									<p>nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.</p> <p>Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo / filtravimo sistema).</p> <p>Purkšti galima tik traktoriniais lauko purkštuvais / traktoriais, turinčiais sandarias kabinas su oro kondicionavimo / filtravimo sistema, turinčiais didesnes nei 2000 l rezervuaro talpas vandeniui ir užgriebio plotį nuo 18 metrų.</p> <p>Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 50 l.</p>
23.	<b>Cerix</b> BASF A/S 0458F/13 2019-04-30	Fluksapiroksadas + epoksikonazolas + piraklostrobinas 41,6 + 41,6 + 66,6 g/l	3,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			3,0	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,5	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	

			3,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Geltonosios ir rudosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Geltonosios ir rudosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			3,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			3,0	Avižos	Vainikuotosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,5	Avižos	Vainikuotosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
24.	<b>Champion 50 WP</b> Nufarm UK Ltd., 0262F/04, 2015-05-31	Vario hidroksidas 77% (vario 500 g/kg)	5,0	Obelys	Rauplės	Purškama iki vegetacijos pradžios prieš pumpurų brinkimą		1	
			2,5	Bulvės	Bulvių maras, sausligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	7	4	
25.	<b>Chorus 50 WG</b> Syngenta Crop Protection AG, 0392F/10 2020-09-24	Ciprodinilas 500 g/kg	0,3-0,45	Obelys	Rauplės, moniliozė	Purškama vegetacijos metu	21	3	
			0,45	Kriaušės	Rauplės, moniliozė	Purškama vegetacijos metu	21	3	
26.	<b>Cidely Top (A18119A)</b> Syngenta Crop Protection AG, AS2-46F/2014 2019-12-31	Difenokonazolas + ciflufenamidas 125+15 g/l	100 ml/100 l vandens neviršijant 1,0 l/ha	Agurkai šiltnamiuose	Miltligė, rauplės, agurkų alternariozė, juodasis stiebo ir vaisių puvinys	Purkšti vegetacijos metu	3	2	Fungicidas klasifikuojamas: Pavojingas. Smarkiai pažeidžia akis. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijas
			100 ml/100 l vandens neviršijant 1,0 l/ha	Cukinijos šiltnamiuose	Miltligė, rauplės, agurkų alternariozė, juodasis stiebo ir vaisių puvinys	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			100 ml/100 l vandens	Paprikos šiltnamiuose	Miltligė, alternariozė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	



			neviršijant 1,0 l/ha						nurodymus. Mūvēti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemonės. Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l.
			100 ml/100 l vandens neviršijant 1,0 l/ha	Pomidorai šiltnamiuose	Miltligė, sausligė, rudoji dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			100 ml/100 l vandens neviršijant 1,0 l/ha	Braškės šiltnamiuose	Miltligė, braškių antraknozė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
27.	<b>Comet</b> BASF A/S, 0224F/05, 2015-11-07	Piraklostrobinas 250 g/l	1,0	Žieminiai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1	Fungicido forma: koncentruota er Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Kenksmingas įkvėpus. Kenksmingas prarijus. Dirgina odą. Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti alerginę odos reakciją Labai toksiškas vandens organizm ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikat keliamos rizikos, būtina vykdy instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko / garų /ae Mūvēti apsaugines pirštines apsauginius drabužius. Pasijutus blogai, skambinti į
			1,0	Vasariniai miežiai	Miltligė, septoriozė, smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1	

									<p>kontrolės ir informacijos biurą gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išsiplėtinę gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinių reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos ar jo pakuote (neplauti purškimo šalia paviršinio vandens telkinių / per drenažą iš sodybu ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną vandens telkinių ir 1 metro – ikigriovių. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l</p>
28.	<b>Comet Pro</b> BASF A/S, 0396F/10 2020-11-09	Piraklostrobinas 200 g/l	1,25	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,25	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
29.	<b>Corbel</b> BASF A/S, AS2-36F/2014 2020-04-30	Fenpropimorfis 750 g/l	0,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, geltonosios ir rudosios rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	<p>Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Kenksmingas įkvėpus. Dirgina odą. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Stengtis neįkvėpti garų, aerozolio.</p>
			0,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, geltonosios ir rudosios rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
			0,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, rinchosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
			0,5	Žieminiai rugiai	Miltligė, rudosios rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
			0,5	Avižos	Miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	

									<p>Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.</p> <p>Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.</p> <p>Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.</p> <p>Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.</p>
30.	<b>Darcos</b> Rotam Agrochemical Europe Limited, 0469F/13, 2020-08-31	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rudosios rūdys, lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Kenksmingas prarijus. Sukelia smarkų akių dirginimą. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, rudosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

			1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Fomozė, pilkasis puvinys, juodoji dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu	56	1	<p>Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.</p> <p>Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.</p> <p>Mūvēti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.</p> <p>Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.</p> <p>Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.</p> <p>Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aukštelę, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuokelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.</p> <p>Pakuotė: 0,25 l, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.</p>
31.	<b>Difo 25% EC</b> Sharda Europe b.v.b.a., 0454F/13, 2019-12-31	Difenokonazolas 250 g/l	0,2	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti vegetacijos metu	21	3	
32.	<b>Dithane NT</b> Indofil Industries Limited,	Mankocebas 750 g/kg	2,0	Bulvės	Maras, sausligė	Purškiama vegetacijos metu	7	8	Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Įtariama, kad kenkia
			2,5	Ropiniai	Netikroji miltligė,	Purškiama	28	4	

0009F/09, 2019-12-16		svogūnai, Shallot svogūnai, česnakai	rūdys	vegetacijos metu			<p>negimusiam vaikui. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Stengtis neįkvėpti dulkių / aerozolio. Mūvēti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 40 metrų apsaugos zoną purškiant</p>
	2,5	Porai	Fitoftorozė, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	28	3	
	2,0	Morkos, pastarnokai	Alternariozė (juodoji dėmėtligė)	Purkšti vegetacijos metu	30	4	
	2,0	Žiediniai kopūstai, brokoliai	Netikroji miltligė, alternariozė	Purkšti vegetacijos metu	30	4	
	2,0	Žieminiai kviečiai	Lapų septoriozė, rudosis rūdys	Purkšti vegetacijos metu	60	2	
	2,0	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti vegetacijos metu	28	4	
	2,0	Slyvos, vyšnios	Slyvų rūdys, rudasis vaisių puvinys	Purkšti vegetacijos metu	30	4	
	2,13	Juodieji serbentai	Deguliai	Purkšti vegetacijos metu	30	4	

									sėklavaisius, kaulavaisius ir vaiskrūmius, 5 metrų apsaugos zoną purškiant šakniagumbines ir svogūnines daržoves ir 3 metrų apsaugos zoną purškiant kitus augalus iki paviršinio vandens telkinių. Pakuotė: 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg.
33.	<b>Duett ultra</b> BASF A/S AS2-43F/2014 2018-10-31	Epoksikonazolas + tiofanat metilas 187+310 g/l	0,6	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Fungicidas klasifikuojamas: Pavojingas. Kenksmingas įkvėpus. Kenksmingas prarijus. Įtariama, kad sukelia vėžį. Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus. Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra tiofanatmetilo ir 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono su 2-metilzotiazol-3(2H)-onu. Gali sukelti alerginę reakciją. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal
			0,3	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,6	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,3	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,6	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė, rudadėmė dryžligė (dalinis poveikis)	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,3	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė, rudadėmė dryžligė (dalinis poveikis)	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,6	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,3	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	

									nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l
34.	<b>Effector</b> BASF A/S, 0147F/04, 2015-05-31	Ditianonas 700 g/kg	0,5-1,0	Obelys	Rauplės, filostikozė, paprastasis obelių vėžys, rūdis, rudasis puvinys	Purškiama vegetacijos metu	21	6	
			0,75-1,0	Kriaušės	Rauplės, kriaušių rūdis, degligė	Purškiama vegetacijos metu	21	6	
			0,5-1,0	Vyšnios, trešnės	Kokomikozė, rauplės, šratligė, moniliozė, vaisių puvinys	Purškiama vegetacijos metu	21	4	
			0,75-1,0	Slyvos	Šratligė, rūdis, moniliozė	Purškiama vegetacijos metu	21	4	
			0,5-1,0	Juodieji ir raudonieji serbentai, agrastai	Šviesmargė, deguliai, rūdis, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	21	4	
			0,75-1,0	Avietės	Deguliai, aviečių šviesmargė, žievėplaiša, rūdis, pilkasis puvinys	Purškiama vegetacijos metu	21	4	
35.	<b>Efilor</b> BASF A/S 0420F/12 2019-06-31	Boskalidas + metkonazolas 133+60 g/l	0,7-1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis (sklerotinis) puvinys, pilkasis kekerinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu	42	1	Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius

									<p>pakitimus.</p> <p>Sudėtyje yra 1,2-benzotiazol-3(2H)-ono su 2-metilozotiazol-3(2H)-onu. Gali sukelti alerginę reakciją.</p> <p>Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.</p> <p>Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas,</p> <p>Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.</p> <p>Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.</p> <p>Laikyti užrakintą.</p> <p>Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuokelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.</p> <p>Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.</p>
36.	<b>Electis 75 WG</b> Gowan Comercio Internacional e Servicos Limitada 0206F/09, 2019-10-16	Zoksamidas + mankocebas 83,3 + 666,7	1,8	Bulvės	Maras, sausligė	Purkšti vegetacijos metu	7	8	<p>Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai.</p> <p>Gali sukelti alerginę odos reakciją.</p> <p>Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.</p> <p>Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius</p>



									<p>pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Mūvēti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Neįkvėpti dulkių / rūko / aerozolių. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Pakuotė: 5,4 kg</p>
37.	<b>EpoX extra</b> Adama Registrations B.V. 0455F/13 2020-04-30	Epoksikonazolas + folpetas 50+375 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	42	1	Fungicidas klasifikuojamas: Pavojingas. Kenksmingas įkvėpus. Sukelia smarkų akių dirginimą. Įtariama, kad sukelia vėžį.
			1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių	Purkšti vegetacijos metu	42	2	

				kviečiai	dryžligė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė				Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.
		2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, septoriozė, smulkiosios rūdys, miltligė, ramuliarija	Purkšti vegetacijos metu	42	1		Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus Sudėtyje yra folpeto ir metinamino. Gali sukelti alerginę reakciją.
		1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, septoriozė, smulkiosios rūdys, miltligė, ramuliarija	Purkšti vegetacijos metu	42	2		Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
		2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	42	1		Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.
		1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	42	2		Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo

									<p>pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių)</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.</p> <p>Pakuotė: 5 l, 10 l</p>
38.	<b>EpoX Top</b> Adama Registrations B.V. 0397F/10 2020-11-09	Epoksikonazolas + fenpropidinas 40+100 g/l	2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu, kai palankios sąlygos ligoms plisti, auginamos jautrios ligoms kviečių veislės	35	1	<p>Fungicido forma: koncentruota emulsija.</p> <p>Fungicidas klasifikuojamas: Pavojingas.</p> <p>Smarkiai pažeidžia akis.</p> <p>Įtariama, kad sukelia vėžį.</p> <p>Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.</p> <p>Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>Sudėtyje yra fenpropidino, propano rūgšties (2S)-2-hidroksi-2-etilheksilo esterio ir kanifolijos. Gali sukelti alerginę reakciją.</p> <p>Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.</p> <p>Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.</p>
			1,5-2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu, kai sąlygos ligoms plisti nepalankios, auginamos atsparesnės ligoms kviečių veislės	35	1	
			2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, tinkliškoji dryžligė, miežių septoriozė, rinchosporiozė, rudadėmė dryžligė (dalinai), ramuliarija (vasariniai miežiai dalinai)	Purkšti vegetacijos metu, kai palankios sąlygos ligoms plisti, auginamos jautrios ligoms miežių veislės	35	1	
			1,5-2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, tinkliškoji dryžligė, miežių septoriozė,	Purkšti vegetacijos metu, kai sąlygos ligoms plisti	35	1	

					rinchosporiozė, rudadėmė dryžligė (dalinai), ramuliarija (vasariniai miežiai dalinai)	nepalankios, auginamos atsparesnės ligoms miežių veislės			Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Pakuotė: 5 l.
			2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu, kai palankios sąlygos ligoms plisti, auginamos jautrios ligoms kvietrugių veislės	35	1	
			1,5-2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu, kai sąlygos ligoms plisti nepalankios, auginamos atsparesnės ligoms kvietrugių veislės	35	1	
39.	<b>Falcon 460 EC</b> Bayer CropScience atstovybė Baltijos šalims, 0185F/00, 2015-12-31	Tebukonazolas + triadimenolas + spiroksaminas 167 + 43 + 250 g/l	0,4-0,6	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, septoriozė, dryžligės, rūdys, varpų fuzariozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	30	2	Saugoti nuo patekimo į vandens telkinius.
			0,4-0,6	Žieminiai rugiai	Miltligė, rūdys, rinchosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	30	2	
			0,4-0,6	Vasariniai miežiai	Miltligė, tinkliškoji dryžligė, rūdys, rinchosporiozė, helmintosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	30	2	

40.	<b>Falcon forte</b> Bayer CropScience AG, 0379F/10 2020-03-04	Tebukonazolas + protriokonazolas + spiroksaminas 148 + 53 + 224 g/l	0,6-0,8	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,6-0,8	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,6-0,8	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,6-0,8	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, dalinai ramuliarija	Purkšti vegetacijos metu	51	2	
41.	<b>Fandango</b> Bayer CropScience AG 0282F/09, 2019-12-16	Protriokonazolas + fluoksastrobinas 100 + 100 g/l	0,8-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rūdys, dalinai prieš stiebalūžę, varpų fuzariozę	Purškama vegetacijos metu	35	2	
			0,8-1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, tinkliškoji ir rudadėmė dryžligės, ramuliarija, rūdys, rinchosporiozė, daliniai stiebalūžę, varpų fuzariozę	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
42.	<b>Flexity</b> BASF A/S, 0311F/10, 2020-04-07	Metrafenonas 300 g/l	0,5	Žieminiai kviečiai	Miltligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 1,2-benzotiazol- 3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti
			0,5	Vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	

									<p>naudojimo instrukcijos nurodymus.          Naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.          Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.          Saugoti, kad nepatektų į aplinką.          Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.          Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodų ar nuo kelių).          Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir drenažinių griovių.          Pakuotė: 1 l, 5 l.</p>
43.	<b>Flint</b> Bayer Crop Science AG 0391F/10 2020-09-24	Trifloksistrobinas 500 g/kg	0,1-0,15	Obelys	Rauplės, vaisių puviniai, filostiktozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	14	3	
			0,1-0,15	Kriaušės	Rauplės, vaisių puviniai	Purkšti vegetacijos metu	14	3	
44.	<b>Frownicide,</b> ISK BioSciences Europe NV, AS2-30F/2014 2020-02-08	fluazinamas 500 g/l	0,4	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	8	
			0,4	Svogūnai	Lapų dėmėtligė ( <i>Botrytis squamosa</i> ), netikroji miltligė ( <i>Peronospora destructor</i> )	Purkšti vegetacijos metu	7	3	
45.	<b>Folicur</b> Bayer CropScience AG AS2-16F/2015, 2020-08-31	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios ir geltonosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 40-69)	35	1	Fungicidas klasifikuojamas: Pavojingas. Kenksmingas prarijus. Kenksmingas įkvėpus. Smarkiai pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus.
			0,9	Žieminiai	Juodoji dėmėtligė,	Purkšti pavasarį ar	56	1	

				rapsai	fomozė, sklerotinis ir pilkasis puvinys, šviesmargė arba saugo nuo išgulimo	vasarą, kai žieminiai rapsai yra nuo šoninių ūglių formavimosi iki žydėjimo vidurio tarpsnio (BBCH 20–65)			Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo
		1,0		Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, fomozė, sklerotinis ir pilkasis puvinys, šviesmargė arba saugo nuo išgulimo	Purkšti vegetacijos metu	56	1	

									<p>kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. Siekiant apsaugoti grūntinį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra tebukonazolo, dažniau kaip kas antrus metus tame pačiame lauke. Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l.</p>
46.	<b>Gloria</b> Bayer CropScience AG 0290F/06, 2016-03-25	Fenamidonas + propamokarbo hidrochloridas 75 + 375 g/l	2,0	Bulvės	Maras, sausligė	Purškiamos vegetacijos metu, kai susidaro palankios sąlygos grybinei infekcijai plisti, bet ne vėliau kaip pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams	7	3	<p>Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sudėtyje yra propamokarbo hidrochlorido ir 1,2- benzisotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos reikalavimus. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybu ar nuo</p>



									<p>kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 3 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos fenamidono, dažniau kaip kas dvejus metus tame pačiame lauke. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l</p>
47.	<b>Infinito</b> Bayer Crop Science AG, 0337F/12, 2021-05-31	Propamokarbo hidrochloridas + fluopikolidas 625 +62,5 g/l	1,2-1,6	Bulvės	Maras	Purškama vegetacijos metu	7	4	<p>Fungicido forma: koncentruota suspensija Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų</p>
			1,6	Svogūnai	Netikroji miltligė	Purškama vegetacijos metu	7	3	
				Agurkai, auginami šiltnamiuose	Netikroji miltligė	Purškama vegetacijos metu 0,14% tirpalu	3	3	
			1,6	Gūžiniai, žiediniai ir briuseliniai, brokoliniai kopūstai	Netikroji miltligė	Purškama vegetacijos metu	14	3	
			1,6	Porai	Netikroji miltligė	Purškama vegetacijos metu	14	2	

									<p>apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.</p> <p>Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti produkto rūgščiuose dirvožemiuose.</p> <p>Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, naudoti produktą pagal nurodytus naudojimo reglamentus ne dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke.</p> <p>Pakuotė: 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l</p>
48.	<b>Impact 12,5 SC</b> Cheminova A/S, 0085F/01, 2015-05-31	Flutriafolas 125 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rūdys, septoriozė, helmintosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	30	2	
			1,0	Vasariniai miežiai	Miltligė, dryžligės, rūdys, rinchosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	20	1	
			0,5	Cukriniai runkeliai	Miltligė, fomozė, cercosporozė, rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	30	2	
49.	<b>Impact 25 SC</b> Cheminova A/S, 0086F/01, 2015-05-31	Flutriafolas 250 g/l	0,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rūdys, septoriozė, helmintosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	30	2	
			0,5	Vasariniai miežiai	Miltligė, dryžligės, rinchosporiozė, rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	20	1	
			0,25	Cukriniai runkeliai	Miltligė, fomozė, cercosporozė, rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	30	2	
			0,2	Obelys,	Rauplės	Purškama	20	2	

				kriaušės		vegetacijos metu			
50.	<b>Input</b> Bayer CropScience AG 0286F/06 2015-12-31	Protiokonazolas + spiroksaminas 160 + 300 g/l	0,8–1,0	Žieminiai kviečiai	Stiebalūžė, fuzariozė, miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosis rūdys, varpų fuzariozė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	
			0,8–1,0	Vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	
			0,8–1,0	Žieminiams miežiams	Miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	
			0,8–1,0	Vasariniams miežiams	Miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, tinkliškoji ir rudadėmė dryžligė, dalinai saugo prieš lapų septoriozę	Purškiama vegetacijos metu	35	2	
51.	<b>Juventus 90</b> BASF A/S, 0266F/11, 2018-05-31	Metkonazolas 90 g/l	0,7	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė, rudosis ir geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Neįkvėpti rūko / garų / aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemonės. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Varpų fuzariozė				
			0,7	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Varpų fuzariozė				
			0,7	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tikliškoji dryžligė, miežių septoriozė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Varpų fuzariozė				
			0,5-0,7	Žieminiai rapsai	Kaip augimo regulatorius	Purkšti vegetacijos metu	56	1	
			0,7	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, fomozė, baltasis puvinys				
			0,5-0,7	Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys arba	Purkšti vegetacijos metu	56	1	

					naudoti kaip augimo reguliatorių				gydytoją. Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro apsaugos zoną iki melioracijos griovių. Pakuotė: 1 l, 5 l.
52.	<b>Leander</b> Adama Registrations B.V. 0415F/11 2019-12-31	Fenpropidinas 750 g/l	0,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rudosios ir geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	42	1	
			0,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	42	1	
			0,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	42	1	
53.	<b>Leimay</b> Nissan Chemical Europe S.A.R.L. 0390F/10 2015-12-31	Amisulbromas 200 g/l	0,5	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	6	Fungicido forma: koncentruota suspensija. Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Surinkti ištekėjusią medžiagą Talpyklą šalinti pagal

									<p>nacionalinius teisės aktų reikalavimus.          Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).          Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.          Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l</p>
54.	<b>Manfil 75 WG</b> Indofil Industries Limited AS2-10F/2014 2019-01-31	Mankocebas 750 g/kg	2,13	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	8	<p>Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai.          Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.          Gali sukelti alerginę odos reakciją.          Sukelia smarkų akių dirginimą. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.          Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.          Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.          Stengtis neįkvėpti dulkių / aerozolio.          Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.          Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.          Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.          Jei akių dirginimas nepraeina:</p>
			2,13	Pomidorai, auginami lauke	Maras	Purkšti vegetacijos metu	3	5	
			3,2	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,86-2,13	Vynmedžiai	Netikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu	63	2	

									<p>Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 40 metrų apsaugos zoną purškiant sodus, 10 metrų apsaugos zoną purškiant vynuogynus ir 5 metrų apsaugos zoną purškiant bulves ir pomidorus iki paviršinio vandens telkinių. Pakuotė: 5 kg, 10 kg, 25 kg.</p>
55.	<b>Manfil 80 WP</b> Indofil Industries Limited AS2-12F/2014 2019-01-31	Mankocebas 750 g/kg	2,0	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	8	<p>Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Stengtis neįkvėpti dulkių / aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir</p>
			2,0	Pomidorai, auginami lauke	Maras	Purkšti vegetacijos metu	3	5	
			3,0	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			2,0	Vynuogynai	Netikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu	63	2	

									<p>naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.</p> <p>Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.</p> <p>Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.</p> <p>Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 40 metrų apsaugos zoną purškiant sodus, 10 metrų apsaugos zoną purškiant vynuogynus ir 5 metrų apsaugos zoną purškiant bulves ir pomidorus iki paviršinio vandens telkinių.</p> <p>Pakuotė: 5 kg, 10 kg, 25 kg.</p>
56.	<b>Maredo 125 SC</b> Adama Registrations B.V. 0401F/10 2020-12-10	Epoksikonazolas 125 g/l	0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, miltigė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	<p>Fungicido forma: koncentruota suspensija</p> <p>Fungicidas klasifikuojamas: Pavojingas.</p> <p>Kenksmingas įkvėpus.</p> <p>Įtariama, kad sukelia vėžį.</p> <p>Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.</p> <p>Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.</p> <p>Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p>
			0,5-0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, miltigė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai	Miežių septoriozė, smulkiosios rūdys,	Purkšti vegetacijos metu	35	1	

				miežiai arba	miltligė, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, dalinai rudadėmė dryžligė, dalinai ramuliarija (vasariniai miežiai)				Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.
			0,5-0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miežių septoriozė, smulkiosios rūdys, miltligė, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, dalinai rudadėmė dryžligė, dalinai ramuliarija (vasariniai miežiai)	Purkšti vegetacijos metu	35	2	Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Pakuotė: 5 l
			1,0	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75-1,0	Cukriniai runkeliai arba	Baltuliai, rudmargė, miltligė, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
			0,5-0,75	Cukriniai runkeliai	Baltuliai, rudmargė, miltligė, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	28	2	
57.	<b>Mentor</b> BASF A/S, 0177F/99, 2015-12-31	Krezoksimetilas + fenpropimorfis 150 + 300 g/l	0,35-0,7	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, septoriozė, rusvoji dėmėtligė, rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	20	1	Didesnė norma naudojama ligoms intensyviai plintant. Saugoti nuo patekimo į vandens telkinius.
58.	<b>Menara (A9856G)</b> Syngenta Crop Protection AG	Propikonazolas + ciprokonazolas 250+160 g/l	0,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Geltonosios, rudosios rūdys, miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė	Purkšti vegetacijos metu	42	1	Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.



	AS2-13F/2014 2022-05-31		0,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Geltonosios, rudosios rūdys, miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	42	1	Sukelia smarkų akių dirginimą. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra propikonazolo. Gali sukelti alergiją. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis, kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aukštelę, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l.
			0,5	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	42	1	
			0,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė	Purkšti vegetacijos metu	42	1	
59.	<b>Merpan 80 WG</b> Adama Registrations B.V. AS2-12F/2015	Kaptanas 800 kg	1,8-2,225	Obelys	Rauplės	Purkšti vegetacijos metu	21	4	Fungicido forma: vandenyje dispersiškos granulės Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai.

	2018-09-30		1,8-2,225	Kriaušės	Rauplės, vaisių puviniai	Purkšti vegetacijos metu	21	4	<p>Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Įtariama, kad sukelia vėžį. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Stengtis neįkvėpti dulkių / rūko / garų / aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo (oro filtravimo) sistema). Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio</p>
			1,8-2,225	Vyšnios	Kokomikozė	Purkšti vegetacijos metu	21	3	

									<p>vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 30 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina taikyti ir papildomą 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais (purškiant obelis bei kriaušes). Pakuotė: 5 kg.</p>
60.	<b>Mirage 45 EC</b> Adama registrations B.V. 0230F/02, 2015-12-31	Prochlorazas 450 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Stiebalūžė, tinkliškoji dryžligė, rudadėmė dryžligė, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	20	1	<p>Fungicidas klasifikuojamas: Aplinkai pavojingas. Rizikos frazės: Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugos frazės: Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). Specialiosios saugos frazės: Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų</p>
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Stiebalūžė, lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	20	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Stiebalūžė, lapų septoriozė, varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	20	1	
			1 ml/m <sup>2</sup>	Grybai	Sausasis ir šlapiasis puvinys	Purškama praėjus 3–4 paroms po durpės uždėjimo	8		

									ar nuo kelių). Pakuotė: 5 l
61.	<b>Mystic</b> Nufarm GmbH&Co KG 0403F/11 2021-04-14	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Rudosis rūdys, varpų septoriozė, varpų fuzariozė, lapų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	30	2	Fungicido forma: koncentruota emulsija. Fungicidas klasifikuojamas: Pavojingas. Dirgina odą. Smarkiai pažeidžia akis. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Rudosis rūdys, varpų septoriozė, varpų fuzariozė, kviečių dryžligė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	30	2	
			1,0	Žieminiai rugiai	Rudosis rūdys, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	30	2	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Rudosis rūdys, varpų fuzariozė, miltligė, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė, juodligė	Purkšti vegetacijos metu	30	2	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Fomozė, baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė, pilkasis puvinys, netikroji miltligė (dalinai efektyvus)	Purkšti vegetacijos metu	56	2	

									apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybu ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – melioracijos griovių. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.
62.	<b>Nando 500 SC</b> Nufarm GmbH&Co KG 0411F/11 2020-02-28	Fluazinamas 500 g/l	0,3-0,4	Bulvės	Bulvių maras, sausligė	Purkšti vegetacijos metu	7	8	
63.	<b>Ohayo 500 SC</b> ISK BioSciences Europe NV AS2-19F/2014 2020-02-28	Fluazinamas 500 g/l	0,4	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	8	Fungicidas klasifikuojamas: Kenksmingas. Aplinkai pavojingas. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Gali pakenkti negimusiame vaikui. Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti patekimo ant odos. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines. Prarijus nedelsiant kreiptis į
			0,4	Svogūnai	Lapų dėmėtligė, netikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu	7	3	

									<p>gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.</p> <p>Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.</p> <p>Vengti patekimo į aplinką.</p> <p>Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).</p> <p>Siekiant apsaugoti dirvos organizmus, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra fluazinamo dažniau kaip kas dvejus metus tame pačiame lauke.</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną purškiant bulves ir 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais, purškiant svogūnus iki paviršinio vandens telkinių.</p> <p>Pakuotė: 1 l.</p>
64.	<b>Opera</b> BASF A/S, 0225F/05, 2015-11-07	Piraklostrobinas + epoksikonazolas 133 + 50 g/l	0,75–1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Septoriozė, rūdys, kviečių dryžligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu Maksimali suminė norma hektarui 1,5 l/ha	35	2	
			0,75–1,0	Vasariniai miežiai	Septoriozė, dryžligė, rūdys, rinchosporiozė	Purškama vegetacijos metu	35	1	
65.	<b>Opera N</b> BASF A/S AS2-9F/2015 2018-01-31	Piraklostrobinas +epoksikonazolas 85+62,5 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu arba	35	1 arba	Fungicidas klasifikuojamas: Pavojingas. Dirgina odą. Kenksmingas įkvėpus. Kenksmingas prarijus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Įtariama, kad sukelia vėžį. Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kviečių dryžligė, lapų ir varpų septoriozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu		2	
			2,0	Vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rudadėmė dryžligė, miežių septoriozė, miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rudadėmė dryžligė,	Purkšti vegetacijos metu		2	

					miežių septoriozė, miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė				pakitimais. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinių vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos
		1,0-1,2	Kukurūzai	Kukurūzų dryžligė, rudoji dėmetligė	Purkšti vegetacijos metu		1		

									zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo / filtravimo sistema). Purkšti galima tik traktoriniais lauko purkštuvais / traktoriais, turinčiais sandarias kabinas su oro kondicionavimo / filtravimo sistema, turinčiais didesnes nei 2000 l rezervuaro talpas vandeniui ir užgriebio plotį nuo 18 metrų. Pakuotė: 5 l, 10 l
66.	<b>Opus</b> BASF A/S, AS2-35F/2014, 2020-04-30	Epoksikonazolas 125 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1	Fungicidas klasifikuojamas: Pavojingas. Dirgina odą. Kenksmingas įkvėpus. Įtariama, kad sukelia vėžį. Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 1,2-benzotiazol-3(2H)-ono su 2-metilozotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Esant poveikiui arba jeigu
			0,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miežių septoriozė, miltligė	Purškama vegetacijos metu	35	1	
			0,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miežių septoriozė, miltligė	Purškama vegetacijos metu	35	2	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė	Purškama vegetacijos metu	35	1	
			0,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys,	Purškama vegetacijos metu	35	2	



					rinchosporiozė				numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.
			1,0	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
			0,5	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	Saugoti, kad nepatektų į aplinką
			1,0	Avižos	Vainikuotosios rūdys, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	Surinkti ištekėjusią medžiagą.
			0,5	Avižos	Vainikuotosios rūdys, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
									Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
									Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.
									Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.
67.	<b>Opus EC</b> BASF A/S AS2-34F/2014 2020-04-30	Epoksikonazolas 83 g/l	1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1	Fungicidas klasifikuojamas: Pavojingas.
			0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksmingas įkvėpus.
			1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miežių septoriozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	Įtariama, kad sukelia vėžį.
									Gali pakenkti negimusiame vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.
									Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
									Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
									Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti

			0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, miežių septoriozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. Pasijutęs blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.
			1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	Jeigu akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą.
			0,75	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
			1,5	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	1	Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
			0,75	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, rinchosporiozė, miltligė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.
			1,5	Avižos	Vainikuotosios rūdys	Purškiama vegetacijos metu	35	1	
			0,75	Avižos	Vainikuotosios rūdys	Purškiama vegetacijos metu	35	2	
									Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 50 l.

68.	<b>Orius 250 EW</b> Adama Registrations B.V. 0288F/06, 2016-03-23	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė	Purškama vegetacijos metu	30	1	
			1,0	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys, netikroji miltligė, fomozė	Purškama vegetacijos metu	56	1	
			1,0	Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, netikroji miltligė, fomozė	Purškama vegetacijos metu	56	1	
69.	<b>Orvego</b> BASF A/S AS2-5F/2015 2018-09-30	Ametoktradinis + dimetomorfis 300+225 g/l	0,8	Bulvės	Bulvių maras	Purškama vegetacijos metu	7	3	<p>Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Kenksmingas prarijus. Sudėtyje yra 1,2- benzisothiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Siekiant apsaugoti požemini</p>

									vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra ametoktradino, dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke. Pakuotė: 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l
70.	<b>Osiris</b> BASF A/S AS2-8F/2015 2019-04-30	Epoksikonazolas + metkonazolas 37,5 + 27,5 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė, rudosios ir geltonosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1 arba	Fungicidas klasifikuojamas: Pavojingas. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali dirginti kvėpavimo takus. Įtariama, kad sukelia vėžį. Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, miltligė, rudosios ir geltonosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1 arba	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			2,0	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	

									nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybu ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Pakuotė: 5 l, 10 l
71.	<b>Osiris Star</b> BASF A/S AS2-17F/2014 2020-04-30	Epoksikonazolas +metkonazolas 56,25 + 41,25 g/l.	1,33	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu 1-2 kartus, ne daugiau kaip 1,33 l/ha per sezoną	35		Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Įtariama, kad sukelia vėžį. Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
			1,33	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios ir rudosios rūdys, kviečių dryžligė, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu 1-2 kartus, ne daugiau kaip 1,33 l/ha per sezoną	35		Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir
			1,33	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu 1-2 kartus, ne daugiau kaip 1,33 l/ha per sezoną	35		

									išskalbti prieš vėl juos apsiselkiant. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aukštelę, pagal nacionalinių teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių. Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.
72.	<b>Pencozeb 75 DG</b> Cerexagri S.A.S, 0250F/09, 2019-11-02	Mankocebas 750 g/kg	2,0	Bulvės	Maras sausligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	20	3	
			2,0	Svogūnai	Netikroji miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	20	4	
			2,0	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purškama vegetacijos metu	20	3	
73.	<b>Previcur Energy</b> Bayer CropScience AG 0356F/08 2018-10-17	Propamokarbas 530 g/l + fosetilas 310 g/l	1,25 % (250 ml/ 20 l vandens 1 m <sup>3</sup> substrato)	Substratas daržovių, dekoratyvinių augalų auginimui	Pašaknio ir šaknų puviniai (Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phoma spp., Phytophthora spp., Alternaria spp)	Laistoma vegetacijos metu		1	
			0,15 % (15/10 l vandens)	Agurkų, pomidorų, paprikos, gūžinių ir žiedinių kopūstų, brokolių, Briuselio kopūstų, salotų daigai	Pašaknio ir šaknų puvinių sukėlėjai (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Laistoma vegetacijos metu		2	

			3,0 l/ha arba 30 ml/100 m <sup>2</sup>	Agurkai, pomidorai, paprikos	Pašaknio ir šaknų puvinių sukėlėjai ( <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.)	Laistoma vegetacijos metu	3	2	Laistoma lašeline drėkinimo sistema natūraliame substrate
			3,0 l/ha arba 30 ml/100 m <sup>2</sup>	Agurkai, pomidorai, paprikos	Pašaknio ir šaknų puvinių sukėlėjai ( <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.)	Laistoma vegetacijos metu	3	4	Laistoma lašeline drėkinimo sistema mineraliniame substrate
			0,2 % (20 ml/10 l vandens)	Dekoratyviniai augalai	Pašaknio ir šaknų puvinių sukėlėjai ( <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.)	Purškiama vegetacijos metu		2	
			2,5 l/ha arba 25 ml/100 m <sup>2</sup>	Dekoratyviniai augalai	Netikroji miltligė ( <i>Peronospora</i> spp., <i>Bremia</i> spp.)	Purškiama vegetacijos metu		2	
74.	<b>Previcur 607 SL</b> Bayer CropScience atstovybė Baltijos šalims, 0065F/06, 2016-03-25	Propamokarbas 607 g/l	1,5	Bulvės	Maras	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	14	2	Naudoti mišinyje su 1,5 kg/ha Dithane NT.
			2,0-4,0	Agurkai lauke	Netikroji miltligė	Purškiama vegetacijos metu	5	3	
			0,25 % tirpalas	Agurkai šiltnamiuose	Netikroji miltligė	Purškiama vegetacijos metu	3	3	
			0,25 % tirpalas	Pomidorai šiltnamiuose	Maras	Purškiama vegetacijos metu	5	2	
			0,15 % tirpalas	Agurkų, pomidorų ir kopūstų daigai	Pašaknio ir šaknų puviniai	Purškiama vegetacijos metu			
			0,15 % tirpalas	Auginiai	Pašaknio ir šaknų puviniai	Mirkoma 15–20 minučių prieš sodinimą			
			0,3 % tirpalas	Gėlių svogūnėliai	Pašaknio ir šaknų puviniai	Mirkoma 15–20 minučių prieš sodinimą			
			0,3-0,4 l/m <sup>3</sup>	Komposto ir kitų substratų dezinfekcija	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistoma laistytuvu su smulkių skylučių tinkleliu ir išmaišoma			
			0,15 % tirpalas	Dekoratyviniai augalai	Netikroji miltligė	Purškiama vegetacijos metu		3	

			0,15-0,3% tirpalas	Dekoratyviniai augalai	Pašaknio ir šaknų puviniai	Purkšti vegetacijos metu			
75.	<b>Prolectus</b> Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. AS2-9F/2014 2023-12-31	Fenpirazaminas 500 g/kg	0,8-1,2	Pomidorai, baklažanai, paprika, agurkai, cukinijos auginami šiltnamiuose	Kekerinis puvinys ( <i>Botrytis cinerea</i> )	Purkšti vegetacijos metu	1	3	Fungicidas klasifikuojamas: Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aukštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
			0,8-1,2	Braškės, auginamos po danga	Kekerinis puvinys ( <i>Botrytis cinerea</i> )	Purkšti vegetacijos metu	1	3	Pakuotė: 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg, 1,2 kg, 2,4 kg, 3,5 kg.
76.	<b>Propulse</b> Bayer Crop Science AG 0435F/12 2015-06-18	Fluopiramas + protiokonazolas 125 + 125 g/l	0,8-1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys, juodoji dėmėtligė, pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti vegetacijos metu	56	1	Fungicido forma: suspoemulsija Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Gali pakenkti kepenims, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol- 3(2H)-ono ir 2-[2-(1- chlorciklopropil)-2-hidroksi-3- fenilpropil]-2,4-dihidro-3H- 1,2,4-triazol-3-tiono. Gali sukelti alerginę reakciją. Siekiant išvengti žmonių



									<p>sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.</p> <p>Neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.</p> <p>Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro iki melioracijos griovių.</p> <p>Pakuotė: 1 l, 5 l, 15 l</p>
77.	<b>Prosaro</b> Bayer CropScience AG AS2-2F/2015 2019-07-31	Protiokonazolas + tebukonazolas 125 + 125 g/l	0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosis rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	<p>Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai.</p> <p>Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali dirginti kvėpavimo takus.</p> <p>Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.</p> <p>Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.</p> <p>Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>Sudėtyje yra 2-[2-(1-chlorciklopropil)-2-hidroksi-3-fenilpropil]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiono. Gali sukelti alerginę reakciją.</p> <p>Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos</p>
			0,75-1,0	Žieminiai miežiai	Miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75-1,0	Vasariniai miežiai	Miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, tinkliškoji ir rudadėmė dryžligė, miežių septoriozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75-1,0	Žieminiai kvietrugiai	Septoriozė, rudosis rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75-1,0	Vasariniai kvietrugiai	Miltligė, septoriozė, rudosis rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu u	35	1	
			1,0	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, fomozė, sklerotinis ir	Purkšti vegetacijos metu	56	1	



									apželdintą daugiamečiais augalais. Siekiant apsaugoti vandens organizmus purškiant vasarinius javus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l, 50 l HDPE
78.	<b>Ranman Top</b> ISK BioSciences Europe S.A., 0389F/10 2020-06-02	Ciazofamidas 160 g/l	0,5	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	6	
79.	<b>Revus 250 SC</b> Syngenta Crop Protection AG 0345F/08 2015-12-31	Mandipropamidas 250 g/l	0,6	Bulvės	Bulvių maras	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	3	3	
			0,6	Pomidorai auginami lauke ir šiltnamiuose	Maras	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	3	3	
80.	<b>Revus Top (A14576A)</b> Syngenta Crop Protection AG AS2-8F/2014 2019-12-31	Mandipropamidas + difenokonazolas 250+250 g/l	0,6	Bulvės	Bulvių maras, sausligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aukštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Sudėtyje yra 1,2-benzotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alergiją. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo

									<p>pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių.</p> <p>Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra difenokonazolo, daugiau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke.</p> <p>Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.</p>
81.	<b>Ridomil Gold MZ 68 WG</b> Syngenta Crop Protection AG, 0237F/09, 2019-10-19	Metalaksilas-m + mankocebas 4 % + 64 %	2,5	Bulvės	Maras	Purkšti vegetacijos metu	20	3	
82.	<b>Rovral Aqua Flo</b> BASF A/S 0354F/08, 2018-07-21	Iprodionas 500 g/l	1,0	Žirniai	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti vegetacijos metu	14	3	
			1,0	Briuselio kopūstai	Juodoji dėmėtligė (alternariozė)	Purkšti vegetacijos metu	14	3	
			1,5	Braškės	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti vegetacijos metu	14	3	
			1,0-1,5	Avietės	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti vegetacijos metu	14	3	
83.	<b>Rubric</b> Cheminova A/S, 0468F/13, 2020-04-30	Epoksikonazolas 125 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	<p>Fungicidas klasifikuojamas: Pavojingas.</p> <p>Kenksmingas įkvėpus.</p> <p>Įtariama, kad sukelia vėžį.</p> <p>Gali pakenkti negimusiame vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui.</p> <p>Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos</p>
			0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Varpų septoriozė, miltligė, rudosis rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė	Purkšti vegetacijos metu			
			0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,0	Žieminiai ir	Lapų septoriozė	Purkšti vegetacijos	35	2	

			vasariniai kvietrugiai		metu					
			0,5-1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Varpų septoriozė, miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, kviečių dryžligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu				rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
			0,5-1,0	Žieminiai rugiai	Miltligė, rudosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2		Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerosolio.
			0,5-1,0	Avižos	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1		Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.
			0,5-1,0	Cukriniai runkeliai	Baltuliai, rudmargė, miltligė, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	28	2		Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuokelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l

84.	<b>Score 250 EC (A7402T)</b> Syngenta Crop Protection AG, 0047F/13, 2019-12-31	Difenokonazolas 250 g/l	0,2	Obelys, kriaušės	Rauplės, miltligė (iš dalies)	Purkšti vegetacijos metu	21	2	
			0,2	Vyšnios, slyvos	Moniliozė	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
85.	<b>Sereno 60 WG</b> Bayer CropScience atstovybė Baltijos šalims, 0251F/06, 2016-04-29	Fenamidonas + mankocebas 100 + 500 g/kg	1,0-1,25	Bulvės	Maras, sausligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	7	2	
86.	<b>Shirlan 500 SC</b> ISK Biosciences Europe S.A., 0207F/13, 2020-02-28	Fluazinamas 500 g/l	0,4	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	8	
			0,4	Svogūnai	Lapų dėmėtligė, netikroji miltlogė	Purkšti vegetacijos metu	7	3	
87.	<b>Signum</b> BASF A/S, 0314F/09, 2019-12-16	Boskalidas + piraklostrobinas 267 + 67 g/kg	1,0	Gūžiniai kopūstai	Alternariozė, baltosios rūdys	Purškama vegetacijos metu	14	2	
			0,75-1,0	Morkos	Juodoji dėmėtligė, miltligė, dalinai sklerotinis puvinys	Purškama vegetacijos metu	14	2	
			1,5	Porai	Puviniai	Purškama vegetacijos metu	14	3	
			1,5	Salotos	Pilkasis kekerinis puvinys, sklerotinis puvinys	Purškama vegetacijos metu	14	2	
			1,0	Žirniai, pupos (grūdams)	Pilkasis kekerinis puvinys, pupų rūdys	Purškama vegetacijos metu	21	2	
			1,8	Braškės	Pilkasis kekerinis puvinys, šviesmargė, miltligė, braškių juodoji dėmėtligė	Purškama vegetacijos metu	7	3	
			0,2	Bulvės	Bulvių alternariozė	Purškama vegetacijos metu	14	4	
			1,5	Svogūnai	Puviniai	Purškama vegetacijos metu	14	2	
			0,75	Vyšnios, slyvos	Pilkasis kekerinis puvinys, moniliozė, vaisių rudasis puvinys, kokomikozė	Purškama vegetacijos metu	7	2	

			1,0	Juodieji serbentai	Deguliai, miltligė, kekerinis puvinys	Purškama žydėjimo pradžioje – brandos pradžioje (BBC 59 - 75)	7	2	
			1,0	Juodieji serbentai	Šviesmargė, deguliai, miltligė, kekerinis puvinys	Purškama po derliaus nuėmimo		1	
			1,5	Avietės	Žievėplaiša, kekerinis puvinys	Purškama vegetacijos metu	7	2	
88.	<b>Siltra Xpro</b> Bayer Crop Science AG AS2-1F/2015 2019-07-31	Biksafenas + protiokonazolas 60 + 200 g/l	0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Kenksmingas prarijus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
			0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerosolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
			0,75-1,0	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.
			0,75-1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys, ramuliarija, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Jei akių dirginimas nepraeina:

			0,75-1,0	Avižos	Avižų dryžligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	<p>Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.</p> <p>Pakuotė: 5 l, 15 l</p>
89.	<b>Sportak 45 EC</b> BASF A/S, 0017F/00, 2015-12-31	Prochlorazas 450 g/l	1,0	Žieminiai kviečiai	Stiebalūžė, septoriozė, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	20	1	
			1,0	Vasariniai miežiai	Stiebalūžė, miltligė, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	20	1	
			1,0	Varpinės žolės	Démėtligės	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	20	1	
90.	<b>Switch 62,5 WG</b> Syngenta Crop Protection AG AS2-39F/2014 2018-04-30	Ciprodinilas + fludioksonilas 375+250 g/kg	1,0	Avietės, gervuogės	Pilkasis kekerinis puvinys, žievėplaiša	Purkšti vegetacijos metu	10	2	<p>Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai.</p> <p>Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra ciprodinilo. Gali sukelti alerginę reakciją. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos</p>
			1,0	Serbentai	Pilkasis kekerinis puvinys, antraknozė	Purkšti vegetacijos metu	10	2	
			1,0	Braškės lauke	Pilkasis kekerinis puvinys, antraknozė	Purkšti vegetacijos metu	3	1	
			1,0	Braškės šiltnamiuose	Pilkasis kekerinis puvinys, antraknozė	Purkšti vegetacijos metu	1	1	
			1,0	Pomidorai,	Pilkasis kekerinis	Purkšti vegetacijos metu	3	2	



				šiltnamiuose	puvinys, sklerotinis puvinys	metu			rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
			1,0	Žirniai, pupos	Pilkasis kekerinis puvinys, sklerotinis puvinys, iš dalies Mycosphaerella pinoises, Ascochyta	Purkšti vegetacijos metu	14	2	Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės.
			1,0	Dekoratyviniai augalai lauke ir šiltnamiuose	Pilkasis kekrinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu		2	Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinių teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 0,1 kg, 0,25 kg, 0,4 kg, 1 kg
91.	<b>Syllit 544 SC</b> Agriphar S.A. AS2-4F/2015 2022-05-31	Dodinas 544 g/l	1,25	Obelys, kriaušės	Rauplės	Purkšti vegetacijos metu	60	2	Fungicidas klasifikuojamas: Pavojingas.
			1,25	Vyšnios, trešnės	Kokomikozė	Purkšti vegetacijos metu	14	2	Kenksmingas prarijus ir įkvėpus. Dirgina odą. Smarkiai pažeidžia akis. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

									<p>Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.</p> <p>Mūvēti apsaugines pirštines, naudoti akių apsaugos priemones.</p> <p>Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</p> <p>Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.</p> <p>Pakuotė: 1 l polietileno tereftalato (PET) ir didelio tankio polietileno (DTPE) buteliai; 5 l PET ir DTPE konteineriai.</p>
92.	<b>Tattoo 550 SC</b> Bayer CropScience atstovybė Baltijos šalims, 0066F/06, 2016-04-29	Propamokarbo hidrochloridas + mankocebas 248 + 302 g/l	3,0-4,0	Bulvės	Maras, sausligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	14	3	
93.	<b>Tango Flex SC</b> BASF A/S AS2-48F/2014	Metrafenonas + epoksikonazolas 100+83 g/l	0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kviečių dryžligė, lapų septoriozė, miltligė, rudosios rūdys,	Purkšti vegetacijos metu	35	2	Fungicido forma: koncentruota suspensija. Fungicidas klasifikuojamas:

2019-04-30			geltonosios rūdys, stiebalūžė				Pavojingas. Sukelia smarkų akių dirginimą. Įtariama, kad sukelia vėžį. Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono su 2-metilizotiazol-3(2H)-onu. Gali sukelti alerginę reakciją. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1
	1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Kviečių dryžligė, lapų septoriozė, miltligė, rudosis rūdys, geltonosios rūdys, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
	0,75	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, miltligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
	1,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, miltligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
	1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė, miltligė, geltonosios ir rudosis rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
	1,5	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosis rūdys, stiebalūžė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
	1,5	Avižos	Miltligė, vainikuotosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	

									metro apsaugos zoną iki melioracijos griovių. Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l
94.	<b>Tango super</b> BASF A/S, AS2-49F/2014 2020-04-30	Fenpropimorfis + epoksikonazolas 250 + 84 g/l	1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai  arba	Lapų ir varpų septoriozė, miltligė, kviečių dryžligė, rudosios ir geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Fungicidas klasifikuojamas: Pavojingas. Kenksmingas įkvėpus. Įtariama, kad sukelia vėžį. Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 1,2-benzotiazol-3(2H)-ono su 2-metilozotiazol-3(2H)-onu. Gali sukelti alerginę reakciją. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Stengtis neįkvėpti rūko. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo
			0,75	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, miltligė, kviečių dryžligė, rudosios ir geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,75-1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, miltligė, kviečių dryžligė, rudosios ir geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75-1,5	Žieminiai kvietrugiai ir miežiai	Dryžligė, miltligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys, geltonosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75-1,5	Žieminiai rugiai	Miltligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			0,75-1,5	Avižos	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	

									<p>kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo / filtravimo sistema). Purkšti galima tik traktoriniais lauko purkštuvais / traktoriais, turinčiais sandarias kabinas su oro kondicionavimo / filtravimo sistema, turinčiais didesnes nei 2000 l rezervuaro talpas vandeniui ir didesnį nei 18 metrų užgriebio plotį. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l</p>
95.	<b>Tanos 50 WG</b> Du Pont Finland Ltd., 0226F/06, 2016-04-29	Famoksadonas + cimoksanilas 250 + 250 g/kg	0,6-0,7	Bulvės	Maras, sausligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	14	6	
96.	<b>Taspa 500 EC</b> Syngenta Crop Protection AG 0370F/09 2019-04-06	Propikonazolas + difenokonazolas 250 + 250 g/l	0,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Septoriozė, kviečių dryžligė, geltonosios ir rudosios rūdys, miltligė (dalinai)	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	1	
97.	<b>Tazer</b> Nufarm GmbH&Co KG AS2-3F/2015 2022-12-31	Azoksistrobinas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	<p>Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sudėtyje yra 1,2-benzisothiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Labai toksiškas vandens</p>
			1,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	
			1,0	Žieminiai ir	Miltligė, smulkiosios	Purkšti vegetacijos	35	1	

				vasariniai miežiai	rūdys, geltonosios rūdys, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė	metu			organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Surinkti ištekėjusią medžiagą.
			1,0	Žieminiai rugiai	Miltligė, rudosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
			1,0	Avižos	Miltligė, vainikuotosios rūdys, septoriozė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
			1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Juodoji dėmėligė, pilkasis (kekerinis) puvinys, baltasis (sklerotinis) puvinys	Purkšti vegetacijos metu	21	1	Siekiant apsaugoti vandens organizmus, purškiant javus būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.
			0,5	Bulvės	Sausligė	Purkšti vegetacijos metu	7	1	Siekiant apsaugoti vandens organizmus, purškiant rapsus būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.
			tang	Pomidorai, auginami šiltnamiuose	Maras, netikroji miltligė, miltligė, sausligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	Siekiant apsaugoti vandens organizmus, purškiant bulves būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l HPDE.
98.	<b>Tebusha 25% EW</b> Sharda Europe b.v.b.a. 0429F/12 2020-08-31	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.
			1,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė,	Purkšti vegetacijos metu	35	2	

					miltligė, varpų fuzariozė				
			0,75	Žieminiai rapsai	Fomozė	Purkšti rudenį, kai rapsai yra 4-6 lapelių tarpsnyje		1	
			1,0	Žieminiai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys	Purkšti vegetacijos metu	60	1	
99.	<b>Tilmor</b> Bayer Crop Science AG 0383F/10 2020-04-08	Tebukonazolas + protiokonazolas 160 + 80 g/l	0,8-1,2	Žieminiai rapsai	Fomozė, juodoji dėmėtligė, baltasis (sklerotinis) puvinys, pilkasis (kekerinis) puvinys, šviesmargė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	56	2	
			0,8-1,2	Vasariniai rapsai	Juodoji dėmėtligė, baltasis (sklerotinis) puvinys, šviesmargė, miltligė, fomozė	Purkšti vegetacijos metu	56	2	
100.	<b>Tilt 250 EC</b> Syngenta Crop Protection AG, 0119F/08, 2018-05-23	Propikonazolas 250 g/l	0,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, miltligė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
			0,5	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
			0,5	Vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	35	2	
101.	<b>Topas 100 EC</b> Syngenta Polska Sp.zo.o., AS2-20F/2015, 2020-12-31	Penkonazolas 100 g/l	0,5	Obelys, kriaušės	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	14	2	Fungicido forma: koncentruota emulsija. Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą.
			0,5	Agurkai lauke ir šiltnamiuose	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			0,5	Pomidorai lauke ir šiltnamiuose	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			0,5	Paprika lauke ir šiltnamiuose	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			0,5	Arbūzai, cukinijos, melionai, moliūgai lauke ir šiltnamiuose	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	
			0,5	Juodieji, raudonieji serbentai, agrastai	Tamsioji miltligė	Purkšti vegetacijos metu	20	1	

			0,5	Braškės lauke ir šiltnamiuose	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	3	2	Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių /vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra penkonazolo, dažniau nei du kartus per trejus metus tame pačiame lauke. Pakuotė: 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l.
			0,3	Vynuogės	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu	28	2	
			0,5	Vyšnios	Kokomikozė	Purkšti vegetacijos metu	20	2	
			0,5	Dekoratyviniai augalai lauke ir šiltnamiuose	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu		1	
102.	<b>Toprex 375 SC (A14049A)</b> Syngenta Crop Protection AG AS2-26F/2014 2019-12-31	Paklobutrazolas 125 g/l + difenokonazolas 250 g/l	0,35	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Saugo nuo fomezės, juodosios demėtligės, šviesmargės, taip pat nuo augalų ištįsimo ir išgulimo	Purškama pavasarį nuo stiebo ilgėjimo pradžios, kol išsiskirsto, tačiau nאיšsiskleidžia pagrindinio žiedyno butonas (BBCH 31-55)		1	Fungicidas-augalų augimo reguliatorius klasifikuojamas: Pavojingas. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.



									<p>Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aukštelę, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra difenokonazolo ir / arba paklobutrazolo daugiau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke.</p> <p>Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l.</p>
103.	<b>Variano Xpro</b> Bayer Crop Science AG AS2-16F/2014 2019-07-31	Biksafenas + fluoksastrobinas + protriokonazolas 40+50+100 g/l	1,0-1,25	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, miltligė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Įtariama, kad kenkia negimusiui vaikui. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Mūvėti apsaugines pirštines,
			1,0-1,25	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė, varpų fuzariozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,0-1,25	Žieminiai rugiai	Rudosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,0-1,25	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, smulkiosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė, varpų	Purkšti vegetacijos metu	35	2	

					fuzariozė				<p>dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.</p> <p>Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.</p> <p>Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.</p> <p>Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.</p> <p>Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.</p> <p>Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aukštelę, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių.</p> <p>Pakuotė: 1 l, 5 l, 15 l.</p>
104.	<b>Vista 228 SE</b> BASF A/S, 0222F/02, 2015-12-31	Prochlorazas + flunkvinazolas 174 + 54 g/l	1,5-1,7	Žieminiai kviečiai	Septoriozė, rūdys, miltligė, kviečių dryžligė stiebalūžė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	Saugoti nuo patekimo į vandens telkinius.
			1,5	Vasariniai kviečiai	Rūdys, septoriozė, miltligė, kviečių dryžligė	Purškiama vegetacijos metu	35	2	
105.	<b>Viverda</b> BASF A/S 0424F/12 2020-04-30	Boskalidas + epoksikonazolas + piraklostrobinas 140+50+60 g/l	2,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Fungicidas klasifikuojamas: Pavojingas. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksmingas įkvėpus.

			1,25	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	Įtariama, kad sukelia vėžį. Gali pakenkti negimusiam vaikui. Įtariama, kad kenkia vaisingumui. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
			2,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rinchosporiozė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
			1,25	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, geltonosios rūdys, rinchosporiozė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	Stengtis neįkvėpti rūko. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
			2,5	Žieminiai rugiai	Rinchosporiozė, rudosios rūdys, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.
			1,25	Žieminiai rugiai	Rinchosporiozė, rudosios rūdys, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
			2,5	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, stiebalūžė, muiltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Laikyti užrakintą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
			1,25	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Smulkiosios rūdys, tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, ramuliarija, stiebalūžė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens

									organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l
106.	<b>Winby 500 SC</b> ISK BioSciences Europe NV AS2-20F/2014 2020-02-28	Fluazinamas 500 g/l	0,4	Bulvės	Bulvių maras	Purkšti vegetacijos metu	7	8	Fungicidas klasifikuojamas: Kenksmingas. Aplinkai pavojingas. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Gali pakenkti negimusiam vaikui. Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti patekimo ant odos. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). Siekiant apsaugoti dirvos organizmus, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra fluazinamo dažniau kaip kas dvejus metus tame pačiame
			0,4	Svogūnai	Lapų dėmėtligė, netikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu	7	3	

									lauke. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną purškiant bulves ir 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais, purškiant svogūnus iki paviršinio vandens telkinių. Pakuotė: 1 l.
107.	<b>Xemium</b> BASF A/S 0417F/11 2015-12-31	Fluksapiroksadas 62,5 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, miltligė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys ir kviečių dryžligė.	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys, miltligė ir ramuliarija	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai rugiai	Rudosios rūdys, miltligė ir rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Rudosios rūdys, miltligė, lapų ir varpų septoriozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			2,0	Avižos	Vainikuotosios rūdys ir miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
103.	<b>Zantara</b> Bayer Crop Science AG 0394F/10 2015-03-31	Tebukonazolas + biksafenas 166+50 g/l	0,9-1,2	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Varpų fuzariozė				
			0,9-1,2	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios ir geltonosios rūdys, miltligė, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	

			1,5	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Varpų fuzariozė				
			0,9-1,2	Žieminiai rugiai	Rinchosporiozė, rudosios rūdys	Purkšti vegetacijos metu	35	2	
			0,9-1,2	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė, miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė	Purkšti vegetacijos metu	35	2	