

Eil.Nr.	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Piktžolės	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
1.	Agroxone 75 Nufarm GmbH & Co KG 0131H/10 2020-02-08	MCPA 750 g/l	0,7-1,0	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo 3-4 lapelių iki pirmojo bamblio pasirodymo	1		
			0,7-1,0	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo 3-4 lapelių iki pirmojo bamblio pasirodymo	1		
			0,8-1,0	Javai su doobilų įsėliu	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai dobilai yra 1-2 tikrųjų lapelių, o javai – krūmijimosi tarpsnyje	1		
			1,0-1,3	Linai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai linai „eglutės“ tarpsnyje (3-8 cm aukščio)	1		
			1,3-1,7	Pievos, ganyklos	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purškiamos jaunos, aktyviai augančios piktžolės	1		Nešienauti ir neganyti galvijų 4 savaites po purškimo
			1,3-1,7	Varpinės žolės sėklai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purškiama aktyvaus piktžolių augimo metu	1		
2.	Accurate 200 WG Cheminova A/S 0400H/10 2020-11-09	Metsulfuron metilas 200 g/kg	20 g/ha	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti pavasarį iki stiebo augimo pradžios (BBCH 32)	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Siekiant apsaugoti vandens	
			15 g/ha	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo 3 lapelių iki krūmijimosi tarpsnio pabaigos (BBCH 13-29)	1		

								<p>organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių, vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Pakuotė: 0,1 kg, 0,25 kg, 0,5 kg</p>
3.	Activus 330 EC Adama Registrations B.V. 0387H/10 2020-04-07	Pendimetalinas 330 g/l	4,0	Vasariniai miežiai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti po sėjos iki sudygimo arba sudygus, kai miežiai yra 1-3 lapelių tarpsnyje, iki kol piktžolės yra dviejų lapelių tarpsnio	1	
			4,0	Vasariniai miežiai su dobilų įsėliu	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti po sėjos iki sudygimo arba sudygus, kai miežiai yra 1-3 lapelių tarpsnyje, iki kol piktžolės yra dviejų lapelių tarpsnio. Purškiant po sudygimo dobilai turi turėti bent vieną tikrąjį lapelį	1	
			3,0	Pašariniai kukurūzai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti per 5 dienas po kukurūzų sėjos arba kukurūzams turint 1 - 4 lapelius	1	
			3,0	Žirniai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti nuo sėjos iki sudygimo arba kai žirniai yra 3-6 cm aukščio	1	
			2,0-3,0	Svogūnai, porai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Auginant iš sėklų, purkšti tuoj po svogūnų / porų sėjos, auginant iš ropelių, purkšti prieš sodinimą arba po sudygimo, kai svogūnai / porai turi ne mažiau 1 lapelį	Galima purkšti 2 kartus po 2,0 l/ha	

			4,0	Morkos, pastarnokai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti iki morkų / pastarnokų sudygimo arba kai morkos bei pastarnokai turi 2 visiškai išsivysčiusius lapelius	1	
			4,0	Briuselio kopūstai, gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti prieš kopūstų sudygimą arba prieš daigų persodinimą	1	
			4,0	Vyšnios, slyvos, obelys, kriaušės	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vėlai rudenį arba anksti pavasarį, kol augalai ramybės būklės	1	Nenaudoti pirmais vaismedžių pasodinimo metais
			4,0	Gervuogės, aviečių ir gervuogių hibridai, avietės, juodieji serbentai, agrastai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kol augalai ramybės būklės iki pumpurų susiformavimo	1	Nenaudoti pirmais uogakrūmių pasodinimo metais
			4,0	Braškės	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, braškių vegetacijos pabaigoje arba pavasarį, vėliausiai iki žiedyno pasirodymo	1	Nepurkšti ką tik pasodintų braškių, taip pat nepurkšti dirvos, kurioje bus sodinamos braškės
4.	Alister Grande Bayer Crop Science AG 0327H/13, 2019-12-31	Natrio metiljodo-sulfuronas + metil mezosulfuronas+ diflufenikanas 4,5+6+180 g/l	0,8	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai	Vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti rudenį sudygus javams, nuo trečio lapelio išsiskleidimo iki matomo trečiojo šoninio ūglio tarpsnio (BBCH13-23)	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina:

								<p>kreiptis į gydytoją. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą atiduoti į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metiljodosulfurono arba metilmezosulfurono dažniau kaip kartą per dvejus metus. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais iki paviršinio vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 5 l.</p>
5.	Ally Max SX Du Pont Finland Ltd 0437H/12 2017-02-28	Metsulfuron metilas + tribenuron metilas 143 + 143 g/kg	0,021 + paviršiaus aktyvioji medžiaga	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai yra krūmijimosi-paskutiniojo lapo (BBCH 20-39) tarpsnyje, o piktžolės yra nuo skilčialapių iki 4 lapelių tarpsnio	1	
			0,021 + paviršiaus aktyvioji medžiaga	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai yra dviejų lapelių-paskutiniojo lapo (BBCH 12-39) tarpsnyje, o piktžolės yra nuo	1	

						skilčialapių iki 4 lapelių tarpsnio		
6.	Amega Nufarm GmbH&Co KG, 0324H/07 2016-02-09	Glifosatas 360 g/l	3,0	Varpiniai javai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės ir dviskiltės	Purkšti 2 savaitės prieš pjūtį, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 %, ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 14 d.	1	Nenaudoti sėkliniuose varpinių javų pasėliuose
			3,0-4,0	Žirniai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai paruduoja 75% ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 14 d.	1	Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose
			3,0-4,0	Linai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 %, ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 10 d.	1	Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose
			3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė mažesnė kaip 30%, ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 10 d.	1	Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose
			2,0-4,0	Pūdymai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės ir dviskiltės		1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
			2,0-4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės ir dviskiltės		1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
			2,0-4,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės ir dviskiltės		1	Nenaudoti 1-2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
7.	Aminopielik 600 SL Adama Registrations B.V. 0366H/09 2019-02-25	2,4-dichlorfenoksi acto rūgštis 600 g/l	1,25	Žieminiai kviečiai, rugiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti javų krūmijimosi metu	1	
			1,25	Vasariniai kviečiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai turi 4-5 lapelius iki krūmijimosi tarpsnio pabaigos	1	
8.	Arelon flussig Stahler International GmbH & Co. 0320H/07,	Izoproturonas 500 g/l	2,0-3,0	Žieminiai rugiai, kviečiai, miežiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Pasėliai purškiami 3,0 l/ha rudenį, 1 lapelio tarpsnyje; pavasarį 2,0 - 3,0 l/ha – iki krūmijimosi pabaigos	1	

	2015-12-31		2,0	Vasariniai miežiai, kviečiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Pasėliai purškiami nuo 1 lapelio tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos	1	
9.	Ariane S Dow AgroSciences Denmark A/S, 0229H/11, 2015-12-31	Fluroksipiras + klopivalidas + MCPA 40 + 20 + 200 g/l	2,0-2,5	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti pavasarį, kai javai yra krūmijimosi pradžioje – pirmojo bamblio tarpsnio (BBCH21-31)	1	Herbicido forma: aliejinė vandens emulsija Herbidas klasifikuojamas: Atsargiai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1
			2,0-2,5	Vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai yra krūmijimosi pradžioje – pirmojo bamblio tarpsnio (BBCH21-31)	1	

								metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l.
10.	Arrat BASF A/S, AS2-51H/2014 2019-11-30	Tritosulfuronas + dikamba 250 + 500 g/kg	0,2 kg/ha + 0,5 l/ha Dash	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti pavasarį, prasidėjus aktyviai vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13–29)	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti dulkių / aerolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jeigu sudirginama oda: Kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio
			0,15 kg/ha + 0,5 l/ha Dash	Vasariniai kviečiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai yra nuo 3 lapelių iki krūmijimosi vidurio (BBCH 13–25)	1	
			0,2 kg/ha + 0,5 l/ha Dash	Kukurūzai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai kukurūzai turi 3-5 lapelius (BBCH 13-15)	1	

								kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra tritosulfurono, dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke. Veikliosios medžiagos tritosulfurono kiekis neturi viršyti 50 g/ha. Pakuotė: 0,8 kg.
11.	Attribut Bayer Crop Science AG 0202H/06, 2016-04-29	Natrio propoksi- karbazonas 700 g/kg	0,06-0,1	Žieminiai kviečiai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės ir kai kurios vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami nuo 3 lapo išsiskleidimo iki krūmijimosi pabaigos. Varpūtis jautriausias, kai išskleidžia 3–5, o kitos piktžolės – 2–3 lapelius	1	
			0,06	Vasariniai kviečiai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės ir kai kurios vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami nuo 3 lapo išsiskleidimo iki krūmijimosi pabaigos. Varpūtis jautriausias, kai išskleidžia 3–5, o kitos piktžolės – 2–3 lapelius	1	
12.	Agil 100 EC Adama Registrations B.V. 0020H/03, 2015-05-31	Propakvizafopas 100 g/l	1,5	Cukriniai runkeliai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės	Purškama, kai piktžolės yra 3-5 lapelių tarpsnio (10-15 cm aukščio)	1	Herbicidas klasifikuojamas: Dirginantis. Aplinkai pavojingas. Gali smarkiai pažeisti akis. Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Neįkvėpti aerozolių. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
			1,0	Linai, bulvės, žieminiai ir vasariniai rapsai, žirniai, gūžiniai kopūstai, svogūnai, česnakai, valgomieji burokėliai, kmynai, morkos, pašarinės pupos, lubinai, baltieji ir raudonieji dobilai, pašariniai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės	Purškama, kai piktžolės yra 3-5 lapelių tarpsnio (10-15 cm aukščio)	1	

				runkeliai, brokoliai, garstyčios, braškės, juodieji ir raudonieji serbentai, avietės, agrastai, dekoratyviniai augalai				Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemonės. Purškiant naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
			1,5-2,0	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės	Purškama, kai piktžolės yra 3-5 lapelių tarpsnio (10-15 cm aukščio)	1	Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybu ar nuo kelių). Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.
13.	Axial 50 EC Syngenta Crop Protection AG, 0332H/07, 2016-05-31	Pinoksadenas 50 g/l	0,6	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Dirvinės smilguolės	Purkšti javų krūmijimosi pabaigoje- stiebo augimo metu	1	
			0,9	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Dirvinės smilguolės	Purkšti javų paskutinio lapo tarpsnyje		
			0,9	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Peliniai pašiaušėliai	Purkšti javų krūmijimosi pabaigoje- stiebo augimo metu	1	
			1,2	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Peliniai pašiaušėliai	Purkšti javų paskutinio lapo tarpsnyje		
			0,6	Vasariniai kviečiai, miežiai	Tuščiosios avižos	Purkšti javų krūmijimosi pabaigoje- stiebo augimo metu	1	
			0,9	Vasariniai kviečiai, miežiai	Tuščiosios avižos	Purkšti javų paskutinio lapo tarpsnyje		
14.	Axial One 50 EC Syngenta Crop Protection 0409H/11, 2016-05-31	Pinoksadenas florasulamas 45+5 g/l	1,0	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Dirvinės smilguolės, tuščiosios avižos, gausiažiedės	Purkšti pavasarį, kai javai yra krūmijimosi- stiebo augimo (BBCH 25-32) tarpsniuose	1	

					svidrės, vienmetės ir kai kurias daugiametės dviskiltės piktžolės			
			1,3	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Peliniai pašiaušėliai	Purkšti pavasarį, kai javai yra krūmijimosi– stiebo augimo (BBCH 25-32) tarpsniuose	1	
			1,0	Vasariniai kviečiai, miežiai	Tuščiosios avižos, gausiažiedės svidrės, vienmetės ir kai kurias daugiametės dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai yra krūmijimosi pabaigoje– stiebo augimo (BBCH 25-32) tarpsniuose	1	
15.	Banvel 4S Syngenta Crop Protection AG, AS2-28H/2014 2019-12-31	Dikamba 480 g/l	0,15 – 0,2	Žieminiai kviečiai, rugiai, miežiai, kvietrugiai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Pasėliai purškiami krūmijimosi tarpsniu (BBCH 21 – 29)	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius
			0,15 - 02	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Pasėliai purškiami krūmijimosi tarpsniu (BBCH 21 – 29)	1	
			0,3 – 0,6	Kukurūzai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai kukurūzai turi 2 - 8 lapelių tarpsnyje, (BBCH 12 - 18)	1	
			0,3 – 1,0	Pūdymai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti pavasarį piktžolėms intensyviai augant iki žiedinių pumpurų pasirodymo	1	
			0,75	Ražienos	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti po derliaus nuėmimo sudyguos išbirusioms sėkloms	1	

								<p>augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybu ar nuo kelių).</p> <p>Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5l.</p>
16.	Basagran 480 BASF A/S, 0038H/06, 2016-04-29	Bentazonas 480 g/l	2,0-3,0	Žeminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai; rugiai, avižos	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami javų krūmijimosi tarpsnyje	1	
			2,0-3,0	Javai su dobilų įsėliu	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami javų krūmijimosi tarpsnyje, o dobilai turi turėti nors vieną tikrąjį lapelį	1	
			2,0-3,0	Javai su liucernos įsėliu	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami javų krūmijimosi tarpsnyje, o liucerna turi turėti nors 1–2 tikruosius lapelius	1	
			2,0-3,0	Kukurūzai	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai išsiskleidžia 2–5 kukurūzų lapeliai	1	
			2,0-3,0	Linai	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami „eglutės“ tarpsnyje, t.y. 3–8 cm aukščio, o piktžolės išskleidžia 3–5 lapelį	1	
			2,0-3,0	Žirnių-avižų, žirnių-miežių mišiniai grūdams	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai išsiskleidžia 3–6 žirnių lapeliai	1	
			2,0-3,0	Žirniai grūdams	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai išsiskleidžia 3–6 žirnių lapeliai	1	
			2,0-3,0	Vienmetės svidrės	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami svidrėms krūmijantis	1	
			3,0-4,0	Dobilai sėklai	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai dobilai yra 10–15 cm aukščio	1	
			2,0	Liucerna sėjos metais	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai išsiskleidžia bent 1–2	1	

						liucernos lapeliai (BBCH 11–12), o piktžolės yra sudygusios		
			2,0	Liucerna sėklai	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai liucerna yra 10–15 cm aukščio	1	
17.	Barclay Barbarian 360 Barclay Chemicals (R&D) Limited, 0340H/07, 2017-12-17	Glifosatas 360 g/l	3,0	Žieminiai ir vasariniai javai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d.	1	Nenaudoti sėkliniams javų pasėliams
			3,0-4,0	Žirniai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, paruduoja 75% anksčių, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d	1	Nenaudoti sėkliniams žirnių pasėliams. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes.
			3,0-4,0	Linai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 10 d.	1	Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes
			3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d.	1	Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes
			2,0-4,0	Pūdymai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 d. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes
			2,0-4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 d. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes,

					dviskiltės			mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės. Didesnioji – daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės
			2,0-4,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	1-2 metų soduose naudoti tik su specialia kamienų apsauga. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės. Didesnioji – daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės
18.	Barclay Barbarian Biograde 360 Barclay Chemicals (R&D) Limited, 0341H/07, 2017-12-17	Glifosatas 360 g/l	3,0	Žieminiai ir vasariniai javai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d.	1	Nenaudoti sėkliniams javų pasėliams
			3,0-4,0	Žirniai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, paruduoja 75% ankščių, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d	1	Nenaudoti sėkliniams žirnių pasėliams. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės. Didesnioji – daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės.
			3,0-4,0	Linai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 10 d.	1	Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės. Didesnioji – daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės
			3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d.	1	Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės. Didesnioji – daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės
			2,0-4,0	Pūdymai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 d. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametes

								vienaskiltės. Didesnioji – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės
			2,0-4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 d. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės. Didesnioji – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės
			2,0-4,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	1-2 metų soduose naudoti tik su specialia kamienų apsauga. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės. Didesnioji – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės
19.	Barbarian Hi-Aktiv Barclay Chemicals (R&D) Limited, 0339H/07, 2017-12-17	Glifosatas 490 g/l	2,2	Žieminiai ir vasariniai javai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d.	1	Nenaudoti sėkliniams javų pasėliams
			2,2-2,9	Žirniai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, paruduoja 75% anksčiau, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d	1	Nenaudoti sėkliniams žirnių pasėliams. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės. Didesnioji – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės.
			2,2-2,9	Linai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 10 d.	1	Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės. Didesnioji – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės
			2,2-2,9	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d.	1	Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės.

								Didesnioji – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės
			1,5-2,9	Pūdymai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 d. Mažesnioji norma naikina vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės. Didesnioji – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės
			1,5-2,9	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 d. Mažesnioji norma naikina vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės. Didesnioji – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės
			1,5-2,9	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	1-2 metų soduose naudoti tik su specialia kamienų apsauga. Mažesnioji norma naikina vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės. Didesnioji – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės
20.	Belvedere extra Adama Registrations B.V. AS2-14H/2014 2018-07-31	Fenmedifamas + desmedifamas + etofomezatas 150+50+200 g/l		Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai	Vienametės dviskiltės ir kai kurias vienaskiltės	Purkšti po 0,75–1,25 l/ha, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnio, nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo tarpsnio	4	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

								Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra etofomezato, daugiau kaip 1,0 kg/ha per trijų auginimo sezonų laikotarpį. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.
21.	Betanal Expert Bayer Crop Science AG 0113H/09, 2019-02-25	Fenmedifamas + desmedifamas + etofomezatas 91+71+112 g/l	3,0-3,75	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai	Dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Pasėliai purškiami per 3 kartus po 1,0-1,25 l/ha nepriklausimai nuo runkelių vystymosi tarpsnio, o piktžolėms esant skilčialapių tarpsnio, purškiant 2 kartus: pirmą kartą 1,3 l/ha, antrą - 1,7 l/ha, purškiant 1 kartą - 3,0 l/ha, kai runkeliai turi 4 tikrus lapelius.	3	Nenaudoti burokėlių lapų maistui
22.	Betanal Bayer Crop Science AG 0355H/08 2018-10-18	Fenmedifamas 160 g/l	6,0	Derančios braškės	Vienmetės dviskiltės	Purškama po tarpueilių purenimo ant naujai sudygusių piktžolių 3 kartus po 2 l/ha arba 2 kartus po 3 l/ha produkto, kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje	3	
				Naujai įveistas braškynas	Vienmetės dviskiltės	Purškama praėjus vienai savaitei po daigų sodinimo 3 l/ha, purškimą pakartoti pasirodžius naujai piktžolių bangai naudojant 3,0 l/ha		
23.	Betanal MaxxPro OD Bayer Crop Science AG 0452H/13 2019-12-31	Fenmedifamas + desmedifamas + etofomezatas + lenacilas 60 + 47 + 75 + 27 g/l		Cukriniai ir pašariniai runkeliai, raudonieji burokėliai	Dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purškšti per 3 kartus po 1,25–1,5 l/ha, pirmą kartą – cukriniams ir pašariniams runkeliams ar raudoniesiems burokėliams esant skilčialapių tarpsnio	3	Herbicidas klasifikuojamas: Pavojingas. Smarkiai pažeidžia akis. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius

<p>(BBCH 10), piktžolēms taip pat skilčialapių tarpsnio, antrą kartą – sudygus naujoms piktžolėms, t. y. po 5–10 dienų po pirmojo purškimo, trečią kartą – sudygus naujoms piktžolėms, t. y. po 5–10 dienų po antrojo purškimo.</p>	<p>pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus ant odos: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą atiduoti į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 1 l, 5 l, 15 l.</p>
---	---

24.	Betasana SC United Phosphorus Ltd., 0268H/04, 2017-07-31	Fenmedifamas 160 g/l	4,5	Cukriniais ir pašariniai runkeliai	Vienmetės dviskiltės	Purškama 3 kartus po 1,5 l/ha, pirmą kartą, kai piktžolės yra skilčialapių stadijoje, nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo, antrą kartą po 5-8 dienų, trečią kartą po 10-14 dienų po antro purškimo. Per 2 kartus po 2,25 l/ha: pirmą kartą kai piktžolės yra iki 4 lapelių stadijos, o runkeliai turi 2 lapelius, antrą kartą – po 5-10 dienų.	3	
25.	Biathlon 4D BASF A/S, 0467H/13, 2019-11-30	Tritosulfuronas + florasulamas 714 + 54 g/kg	0,055-0,070 + Dash	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, rugiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti pavasarį nuo 3 lapelių iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 13-39)	1	Herbicidas klasifikuojamas: Kenksmingas prarijus. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Prarijus: Pasijutus blogai skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Išskalauti burną. Talpyklą atiduoti į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio
			0,040-0,070 + Dash	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo 3 lapelių tarpsnio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 13-39)	1	

								<p>vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra tritosulfurono dažniau kaip kartą per trejus metus. Pakuotė: 0,1 kg, 0,35 kg, 0,5 kg, 1,05 kg.</p>
26.	Boxer 800 EC Syngenta Crop Protection AG, 0308H/13, 2019-10-31	Prosulfokarbas 800 g/l	2,0-2,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, rugiai	Vienmetės vienskiltės ir dviskiltės	Purkšti po sėjos-iki sudygimo (BBCH 00-10)	1	<p>Herbicidas klasifikuojamas: Pavojaingas. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Laikyti užrakintą. Mūvēti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</p>
			3,0-4,0	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, rugiai	Vienmetės vienskiltės ir dviskiltės	Purkšti pradėjus dygti javams iki krūmijimosi pradžios (BBCH 11-21)		
			4,0-5,0	Žirniai	Vienmetės vienskiltės ir dviskiltės	Purkšti po sėjos-iki sudygimo (BBCH 00-10)	1	
			4,0-5,0	Bulvės	Vienmetės vienskiltės ir dviskiltės	Purkšti po sodinimo-iki sudygimo (BBCH 00-09). Ankstyvosioms bulvėms paskutinis purškimo terminas iki derliaus nuėmimo likus 42 dienoms.	1	
			4,0-5,0	Kmynai	Vienmetės vienskiltės ir dviskiltės	Purkšti po sėjos-iki sudygimo (BBCH 00-10)	1	

								<p>Neskatinti vėmimo.</p> <p>Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.</p> <p>Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.</p> <p>Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą ir akis.</p> <p>Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.</p> <p>Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Talpyklą atiduoti į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.</p> <p>Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l.</p>
27.	Brasan 540 EC Syngenta Crop Protection AG AS2-23H/2014 2019-10-31	Dimetachloras + klomazonas 500+40 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purškama po sėjos iki sudygimo	1	<p>Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai.</p> <p>Kenksmingas prarijus.</p> <p>Dirgina odą.</p> <p>Gali sukelti alerginę odos reakciją.</p> <p>Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>Mūvēti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius.</p> <p>Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.</p>

								<p>Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.</p> <p>Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra dimetachloro ir / arba klomazono dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke.</p> <p>Pakuotė: 5 l, 20 l.</p>
28.	Butisan Avant BASF A/S, AS2-47H/2014 2017-10-31	Metazachloras + dimetenamidas-P +kvinmerakas 300+100 +100	2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės dviskiltės	Purkšti po sėjos iki sudygimo (BBCH00-09) arba skilčialapių-4 lapelių tarpsniu (BBCH 10-14)	1	<p>Herbicido forma: suspoemulsija</p> <p>Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai.</p> <p>Gali sukelti alerginę odos reakciją.</p>

g/l

Įtariama, kad sukelia vėžį.
 Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
 Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius.
 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.
 Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.
 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
 Surinkti ištekėjusią medžiagą.
 Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
 Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
 Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.
 Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
 Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio

								kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metazachloro, dimetenamido-P, kvinmerako, dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke. Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l
29.	Butisan Kombi BASF A/S, AS2-2H/2014 2017-10-31	Metazachloras + dimetenamidas-P 200+200 g/l	2,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti po sėjos iki sudrygimo (BBCH00-09) arba skilčialapių-8 lapelių tarpsniu (BBCH 10-18)	1	Herbicidas klasifikuojamas: Pavojingas. Įtariama, kad sukelia vėžį. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksmingas įkvėpus. Kenksmingas prarijus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Neskatinti vėmimo. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Esant sąlyčiui arba jei numatomas sąlytis: Kreiptis į gydytoją. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

								<p>Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metazachloro ir / arba dimetenamido-P dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke.</p> <p>Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.</p>
30.	Butisan Star BASF A/S, 0293H/06, 2015-04-30	Metazachloras + kvinmerakas 333 + 83 g/l	2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės dviskiltės ir vienaskiltės	Pasėliai purškiami po sėjos iki išsiskleidžia 2 lapeliai, piktžolės neturėtų būti didesnės nei 3–4 lapelių	1	
31.	Butisan 400 BASF A/S, AS2-4H/2014 2020-07-31	Metazachloras 400 g/l	1,875	Žieminiai ir vasariniai rapsai, žieminiai ir vasariniai rapsiukai, garstyčios	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškšti po sėjos iki sudygimo (BBCH 00-09) arba skilčialapių-8 lappelių tarpsniu (BBCH 10-18)	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Kenksmingas prarijus. Įtariama, kad sukelia vėžį. Sudėtyje yra metazachloro. Gali sukelti alerginę reakciją.

			1,875	Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, lapiniai kopūstai, brokoliai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti 7-12 d. po daigų išsodinimo	1	<p>Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.</p> <p>Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius.</p> <p>Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.</p> <p>Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: Kreiptis į gydytoją.</p> <p>Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc. būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metazachloro,</p>
--	--	--	-------	--	--------------------------------------	-------------------------------------	---	---

								dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.
32.	Butoxone Nufarm GmbH & Co.KG, 0402H/11 2021-02-14	MCPB 400 g/l	3,0-4,0	Žirniai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai žirniai turi 3-6 lapelius	1	
33.	Caliban Duo Stahler International GmbH&Co. KG, 0374H/09, 2019-06-15	Propoksikarbazona s + jodosulfuronas 168 + 10 g/kg	0,25	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Dirvinės smilguotės ir vienametės dviskiltės (išskyrus kibiuosius lipikus, jei jie labai išplitę)	Purkšti atsinaujinus vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos (BBCH29)	1	Herbidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Naudoti akių (veido) apsaugos priemonės. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Pakuotė: 1 kg
			0,333	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Paprastieji varpučiai, peliniai pašiaušėliai ir vienametės dviskiltės (išskyrus kibiuosius lipikus, jei jie labai išplitę)	Purkšti atsinaujinus vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos (BBCH29)		
			0,25	Žieminiai rugiai	Dirvinės smilguotės ir vienametės dviskiltės (išskyrus kibiuosius lipikus, jei jie labai išplitę)	Purkšti atsinaujinus vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos (BBCH29)	1	
34.	Calibre 50 SX DuPont Finland Ltd., 0325H/07, 2017-03-22	Tifensulfuronmeti las + tribenuronmetilas 333 + 167 g/kg	0,0225-0,03 + PAM	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, miežiai	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai javai yra nuo antro lapo tarpsnio iki paskutinio lapo pasirodymo		

			0,0225-0,03 + PAM	Vasariniai kviečiai, miežiai	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai javai yra nuo antro lapo tarpsnio iki paskutinio lapo pasirodymo			
			0,0225-0,03 + PAM	Javai su varpinių žolių įsėliu	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai javai yra nuo antro lapo tarpsnio iki paskutinio lapo pasirodymo			
35.	Caribou 50 WG Du Pont Finland Ltd., 0148H/03, 2015-05-31	Triflusulfuron metilas 500 g/kg	0,02-0,03	Cukriniai ir pašariniai runkeliai	Vienametės dviskiltės	Pasėliai purškiami mišiniuose su Betanal Expert 1,0-1,25 l/ha: pirmą kartą - kai sudygę 90% runkelių ir piktžolės yra nuo skilčialapių iki 2 tikrųjų lapelių stadijos, antrą kartą - po 8-10 dienų.	2	Saugoti nuo patekimo į vandens telkinius	
36.	Ceridor MCPA 750 Nufarm GmbH & Co KG 0380H/10 2020-02-08	MCPA 750 g/l	0,7-1,0	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo 3-4 lapelių iki pirmojo bamblio pasirodymo	1		
			0,7-1,0	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo 3-4 lapelių iki pirmojo bamblio pasirodymo	1		
			0,8-1,0	Javai su dobilų įsėliu	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai dobilai yra 1-2 tikrųjų lapelių, o javai – krūmijimosi tarpsnyje	1		
			1,0-1,3	Linai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai linai „eglutės“ tarpsnyje (3-8 cm aukščio)	1		
			1,3-1,7	Pievos, ganyklos	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purškiamos jaunos, aktyviai augančios piktžolės	1		Nešienauti ir neganyti galvijų 4 savaites po purškimo
			1,3-1,7	Varpinės žolės sėklai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purškiama aktyvaus piktžolių augimo metu	1		
37.	Centurion Plus Arysta Life Science S.A.S. AS2-22H/2015 2022-05-31	Kletodimas 120 g/l	1,0-2,0	Braškės	Vienametės ir daugiametės vienskiltės	Purkšti, kai braškės yra 2 pilnų lapelių tarpsnyje iki kol žiedai su vainiklapiais suformuoja vainikėlį (BBCH 12–59) arba po derliaus nuėmimo, kai vienametės vienskiltės piktžolės yra	1	Herbicido forma: koncentruota emulsija. Herbicidas klasifikuojamas: Pavojaingas. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Gali sukelti mieguistumą arba	

					nuo 3 lapelių–iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienskiltės – 15–20 cm aukščio iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.		galvos svaigimą. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra kletodimo. Gali sukelti alerginę reakciją. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir aerozolio. Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Neskatinti vėmimo. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekęs medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 1 l, 5 l.
		1,0-2,0	Bulvės	Vienametės ir daugiametės vienskiltės	Purkšti, kai išsiskleidžia pagrindinio stiebo antras lapas iki kol tarpueiliuose susilieja 30 proc. augalų (BBCH 12–33), vienametės vienskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių–iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienskiltės – 15–20 cm aukščio, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.	1	
		1,0-2,0	Morkos	Vienametės ir daugiametės vienskiltės	Purkšti, kai išsiskleidę du tikrieji lapeliai, kol šaknis padidėja iki 50 proc. būdingo dydžio (BBCH 12–45), vienametės vienskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių–iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienskiltės – 15–20 cm aukščio, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 40 dienų.	1	
		1,0-2,0	Svogūnai	Vienametės ir daugiametės vienskiltės	Purkšti, kai gerai matomas antras lapelis iki svogūnų gumbai yra 50 proc. skersmens (BBCH 12–45), vienametės vienskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių–iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienskiltės – 15–20 cm aukščio, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 56 dienoms.	1	

			1,0-2,0	Baltgūžiai, raudongūžiai, briuseliniai, savojiniai kopūstai	Vienametės ir daugiametės vienskiltės	Purkšti, kai gerai matomas 2 lapelis iki kol augalai pradeda formuoti gūžes (BBCH 12–41), vienametės vienaskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių–iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienaskiltės – 15–20 cm aukščio, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.	1	
			1,0	Pupos	Vienametės ir daugiametės vienskiltės	Purkšti, kai pupos yra 2 tikrųjų lapelių tarpsnyje iki kol išsiskleidžia 9 ar daugiau lapelių (BBCH 12– 19), vienametės vienaskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių–iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienaskiltės – 15–20 cm aukščio, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų.	1	
			1,0	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienskiltės	Purkšti, kai žirniai yra 2 tikrųjų lapelių tarpsnyje iki matomi 9 ar daugiau tarpubamblių (BBCH 12– 39), vienametės vienaskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių–iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienaskiltės – 15–20 cm aukščio, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.	1	
			1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienskiltės	Purkšti, kai rapsai turi 2 lapelius iki stiebo ilgėjimo pradžios (BBCH 12–30), vienametės vienaskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių– iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienaskiltės –	1	

						15–20 cm aukščio, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 90 dienų.		
			1,0-2,0	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, burokėliai	Vienametės ir daugiametės vienskiltės	Purkšti, kai išsiskleidę 2 tikrieji lapeliai, kol lapai uždengia 30 proc. tarpelių (BBCH 12–33), vienametės vienskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių–iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienskiltės – 15–20 cm aukščio, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.	1	
			1,0	Linai	Vienametės ir daugiametės vienskiltės	Purkšti, kol linai pasiekia 20 cm aukščio, vienametės vienskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių–iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienskiltės – 15–20 cm aukščio, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 70 dienų.	1	
38.	Chwastox 750 SL Zakłady Chemiczne „Organika-Sarżyna” S.A. 0378H/10, 2020-02-08	MCPA 750 g/l	1,0	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi metu	1	
			0,75	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi metu	1	
39.	Chwastox 500 SL Zakłady Chemiczne „Organika - Sarżyna” S.A. 0427H/12, 2017-04-30	MCPA 500 g/l	1,5	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti pavasarį, atsinaujinus žieminių javų vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos	1	Pakuotė: 1 l, 5l, 10 l, 20 l
			1,1	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti javų krūmijimosi metu	1	
40.	Dalgis Monsanto Crop Science Denmark A/S,	Glifosatas 360 g/l	3,0	Varpiniai javai	Daugiametės ir vienmetės vienskiltės ir	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra	1	Nenaudoti sėkliniuose javų pasėliuose

0235H/06, 2016-02-09			dviskiltės	mažesnė nei 30%		
	3,0	Žirniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	Nenaudoti sėkliniuose žirnių pasėliuose
	4,0	Žirniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	
	3,0	Linai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose linų pasėliuose
	4,0	Linai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
	3,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose rapsų pasėliuose
	4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
	2,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
	4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	

			2,0	Pūdymai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			4,0	Pūdymai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			2,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
			4,0	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	
41.	Dicoherb super 750 SL Nufarm GmbH&Co KG 0436H/12 2019-12-31	MCPA + dicamba 660 + 90 g/l	1,0	Žieminiai kviečiai, rugiai	Vienametės dviskiltės	Purkšti pavasarį, prasidėjus intensyviai vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 31)	1	Herbicidas klasifikuojamas: Pavojingas. Kenksmingas prarijus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Smarkiai pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerosolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
			1,0	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Vienametės dviskiltės	Purkšti, kai javai yra nuo 3 lapelių iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13-31)	1	

								<p>Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.</p> <p>Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.</p> <p>Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.</p> <p>Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l</p>
42.	DMA 6 2,4-D Retro Dow Agro Sciences Danmark A/S, 0098H/07, 2017-12-17	2,4-dichlorfenoksi acto rūgštis 683 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purškama javų krūmijimosi metu	1	
			1,0-1,2	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purškama javų krūmijimosi metu	1	
			1,0-1,5	Kukurūzai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purškama, kai kukurūzai išleidžia 3-5 lapelius	1	
			0,6	Daugiametės	Vienametės	Purškama daugiamečių	1	

				varpinės žolės	dviskiltės	žolių krūmijimosi metu		
			1,5	Daugiametės varpinės žolės	Daugiametės dviskiltės	Purškama daugiamečių žolių krūmijimosi metu	1	
43.	Dominator Dow Agro Sciences Danmark A/S, 0310H/07, 2016-03-16	Glifosatas 360 g/l	3,0	Varpiniai javai	Vienmetės ir daugiamečių vienskiltės ir dviskiltės	Pasėliai purškiami 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 %	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			2,0-4,0	Žirniai	Vienmetės ir daugiamečių vienskiltės ir dviskiltės	Pasėliai purškiami 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75 % anksčių	1	
			3,0-4,0	Linai	Vienmetės ir daugiamečių vienskiltės ir dviskiltės	Pasėliai purškiami kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 %, ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 10 dienų.	1	
			3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės ir daugiamečių vienskiltės ir dviskiltės	Pasėliai purškiami kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 %, ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 10 dienų.	1	
			2,0-4,0	Pūdymai	Vienmetės ir daugiamečių vienskiltės ir dviskiltės		1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
			3,0-4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės ir daugiamečių vienskiltės ir dviskiltės		1	
			2,0-4,0	Vaismedžių pomedžiams	Vienmetės ir daugiamečių vienskiltės ir dviskiltės	Purškama piktžolių vegetacijos metu	1	Nenaudoto 1-2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
44.	2,4-D Nufarm Nufarm GmbH, 0060H/06, 2016-10-05	2,4-dichlorfenoksi acto rūgštis 600 g/l	1,0	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienametės ir kai kurios daugiamečių dviskiltės	Purkšti pavasarį atsinaujinus vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos	1	
			1,0	Vasariniai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Vienametės ir kai kurios daugiamečių dviskiltės	Purkšti nuo 3 lapelių iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13-29)	1	

			1,5	Pievos, ganyklos	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti vegetacijos metu, kai piktžolės jaunos ir aktyviai auga	1	
			0,8	Baltieji dobilai	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai baltieji dobilai turi 2-3 lapelius	1	
			1,0	Kukurūzai	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai kukurūzai išskleidžia 3-5 lapelius (BBCH 13-15)	1	
45.	Duplosan super Nufarm GmbH & Co KG, 0083H/11, 2021-02-14	Mekopropas-P + MCPA + dichlorpropas-P 130 + 160 + 310 g/l	1,5-2,5	Žieminiai kviečiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki bambėjimo pradžios (BBCH 21-30)	1	Herbicidas klasifikuojamas: Pavoingas. Kenksmingas prarijus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Smarkiai pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerosolio. Mūvēti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į
			1,5-2,5	Vasariniai miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo antro lapo pasirodymo iki bambėjimo pradžios (BBCH 12-30)	1	

								<p>gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Pakuotė: 10 l.</p>
46.	Estet 600 EC Nufarm GmbH & Co KG, 0313H/07, 2017-03-22	2,4 – dichlorfenoksi acto rūgštis 600 g/l	0,5-1,0	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purškiama kai javai yra 4 lapelių – antro bamblio susiformavimo tarpsniuose	1	
			0,5-1,0	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purškiama kai javai yra 4 lapelių – antro bamblio susiformavimo tarpsniuose	1	
			0,5	Kukurūzai	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purškiama iki kukurūzų 6 lapelių tarpsnio	1	
			1,0-2,0	Varpinės žolės	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purškiama pavasarį, krūmijimosi – vamzdelėjimo tarpsnio pradžioje, kai daugiametės dviskiltės piktžolės yra lapų skrotelės vystymosi tarpsnyje	1	
			1,0-2,0	Ganyklos be ankštinių žolių	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purškiama pavasarį, krūmijimosi – vamzdelėjimo tarpsnio pradžioje, kai	1	

						daugiametės dviskiltės piktžolės yra lapų skrotelės vystymosi tarpsnyje		
47.	Ergon Rotam Agrochemical Europe Limited 0384H/10 2020-04-01	Metsulfuron metilas 68 g/kg + tifensulfuron metilas 682 g/kg	15 g/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga	Žieminiai kviečiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi iki antrojo bamblio tarpsnio(BBCH 21-31)	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 120 g, 300 g, 500 g.
			10 g/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga	Vasariniai kviečiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai augalai turi tris lapelius iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 13-31)	1	
48.	Ethofol SC AgroDan A/S, 0172H/08, 2018-04-16	Etofumezatas 500 g/l	1,2	Cukriniai ir pašariniai runkeliai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Pasėliai purškiami Ethofol po 0,4 l/ha mišinyje su Betasana 1,5 l/ha ir alyvos 0,2-0,7 l/ha per 3 kartus.	3	
49.	Ethosat 500 SC Adama Registrations B.V. 0315H/07, 2017-03-22	Etofumezatas 500 g/l	0,8-1,2	Cukriniai ir pašariniai runkeliai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Pasėliai purškiami per 3 kartus po 0,4 l/ha mišinyje su Kontakt 320 SC ir Goltix 700 SC, kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje, nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo	3	

						tarpsnio. Purškiant per 2 kartus po 0,6 l/ha mišinyje su Kontakt 320 SC ir Goltix 700 SC pirmą kartą, kai piktžolės yra iki 4 tikrųjų lapelių augimo tarpsnio.		
50.	Etna AgriChem B.V. 0438H/12, 2016-12-31	Glifosatas 360 g/l	2,0-3,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai, avižos	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniams pasėliams
			2,0-4,0	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai paruduoja 75% ankščių, ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniams pasėliams
			3,0	Pupos	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai paruduoja 75% ankščių, ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniams pasėliams
			1,5 -2,0	Ražienos	Javų pabiros, vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	
			3,0-4,0	Ražienos	Paprastieji varpučiai	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	
			4,0-6,0	Varpinių sėklinių žolių ražienos	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	Didesnė norma naudojama pievinių miglių, raudonųjų eraičinų ražienose, mažesnė – kitų sėklinių žolių ražienose. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.
			3,0-6,0	Pievos, ganyklos numatytos atnaujinti	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles		
			3,0-6,0	Vaismedžių (obelų, kriaušių, vyšnių, slyvų) pomedžiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Mažesnė norma naikina paprastuosius varpučius, kitas vienaskiltės piktžoles, didesnė – daugiametės dviskiltės piktžoles. Nenaudoti 1–2 metų vaismedžių sodų pomedžiams

51.	Fenix Bayer Crop Science AG 0305H/13 2020-07-31	Aklonifenas 600 g/l	2,5 -3,0	Bulvės	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti po galutinio vagų suformavimo (paskutinio bulvių kaupimo), bet ne vėliau kaip 1 savaitė iki bulvių daigų pasirodymo	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Įtariama, kad sukelia vėžį. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra aklonifeno. Gali sukelti alerginę reakciją. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis, kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną, kai naudojimo
			3,0	Žirniai, pupos	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purškiama po sėjos, iki žirnių ar pupų sudygimo	1	
			2,5	Morkos, pastarnokai, šakninės petražolės	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti vieną kartą prieš sudygimą 2,5 l/ha arba purkšti per du kartus: pirmą kartą prieš sudygstant pasėliams 1,5 l/ha, antrą kartą purškiama, kai daržovės turi 2 tikruosius lapelius, o piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje 1,0 l/ha.		
			2,5	Svogūnai, sodinami iš ropelių, česnakai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti vieną kartą prieš sudygimą 2,5 l/ha arba purkšti per du kartus: pirmą kartą iškart po svogūnų pasodinimo 1,5 l/ha, antrą kartą, kai daržovės turi 1-2 lapelius, o piktžolės yra skilčialapių tarpsnio 1,0 l/ha.		
			2,0	Kmynai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti po sėjos iki kmynų sudygimo	1	
			2,5	Lapinės petražolės	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti po sėjos iki lapinių petražolių sudygimo	1	
			2,0-3,0	Krapai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti po sėjos iki krapų sudygimo	1	

			2,5-3,0	Saulėgražos	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti po sėjos, bet ne vėliau kaip savaitė iki saulėgražų sudygimo	1	norma yra 3,0 l/ha arba 2,5 l/ha, ir 10 metrų apsaugos zona, kai naudojimo norma yra 2,0 l/ha arba purškama 2 kartus (1,5 l/ha + 1,0 l/ha), iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l.
			1,5-2,5	Gluosnių šeimos augalai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti po pasodinimo prieš naujų ūglių formavimąsi	1	
52.	Flight BASF A/S, 0291H/06, 2016-03-25	Pendimetalinas + pikolinafenas 330 + 7,5 g/l	2,5	Žieminiai kviečiai	Vienametės dviskiltės ir vienaskiltės piktžolės	Pasėliai purškiami rudenį, kai išsiskleidžia 1–3 žiemių kviečių lapeliai	1	
53.	Flight forte BASF A/S, 0292H/06, 2016-03-25	Pendimetalinas + pikolinafenas 320 + 16 g/l	2,5	Žieminiai kviečiai	Vienametės dviskiltės ir vienaskiltės	Pasėliai purškiami rudenį, kai žieminiai kviečiai turi 1–3 lapelius	1	
54.	Focus ultra BASF A/S, 0103H/07, 2015-05-31	Cikloksidimas 100 g/l	1,5-2,0 l/ha +0,5-1,0 l/ha Dash HC	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės	Purškiant 2 kartus: pirmą kartą 1,0 l/ha Focus ultra +0,5-1,0 l/ha Dash HC, kai piktžolės turi 2-4 lapelius, antrą kartą 1,0 l/ha Focus ultra +0,5-1,0 l/ha Dash HC, kai ataugęs varputis turi 2-3 lapelius. Purškiant per 1 kartą 1,5-2,0 l/ha Focus ultra +0,5-1,0 l/ha Dash HC, kai piktžolės turi 2-4 lapelius	2	
			1,5-2,0 l/ha +0,5-1,0 l/ha Dash HC	Linai, rapsai, bulvės, morkos, gūžiniai ir žiediniai kopūstai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės	Purškiama, kai piktžolės turi 3-5 lapelius	1	
			1,5-2,0 l/ha +0,5-1,0 l/ha Dash HC	Jaunos ir derančios braškės	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės	Purškiama kai piktžolės turi 3-5 lapelius	1	
55.	Fornet 4 OD ISK BioSciences Europe N.V. 0445H/12 2019-12-31	Nikosulfuronas 40 g/l	0,75	Kukurūzai	Kai kurios vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai kukurūzai turi 3-4 lapelius, o vienametės dviskiltės ir vienaskiltės piktžolės turi 2-4 lapelius	1	

56.	Fornet 6 OD ISK BioSciences Europe N.V. 0447H/12 2019-12-31	Nikosulfuronas 60 g/l	0,5	Kukurūzai	Vienametės ir kai kurios daugiametės vienaskiltės ir vienametės dviskiltės	Purkšti, kai kukurūzai turi 3-4 lapelius, dviskiltės ir vienaskiltės piktžolės turi 2- 4 lapelius, o varputis 4-6 lapelius arba yra 15-25 cm aukščio	1	
57.	Fox 480 SC Adama Registrations B.V. 0398H/13 2019-12-31	Bifenoksas 480 g/l	0,75-1,0	Vasariniai rapsai	Vienametės dviskiltės	Purkšti, kai rapsai turi 3-6 lapelius 0,75-1,0 l/ha arba po 0,5 l/ha, kai rapsai turi 3-6 lapelius, kas 7-10 d.		Herbidas klasifikuojamas: Aplinkai pavojingas. Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių. Pakuotė: 5 l.
58.	Foxtrot 69 EW Cheminova A/S 0448H/12 2019-12-31	Fenoxaprop-P- etilas 69 g/l	1,0-1,2	Žieminiai kviečiai, rugiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Vienametės vienaskiltės (dirvinės smilguolės, tuščiosios avižos, paprastosios rietmenės, peliniai	Purkšti, kai javai yra nuo 3 lapelių iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13-32), o piktžolės yra nuo 2 lapelių iki krūmijimosi tarpsnių (BBCH 12-29)	1	

					pašiaušėliai)			
			1,0	Vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai	Vienametės vienaskiltės (dirvinės smilguolės, tuščiosios avižos, paprastosios rietmenės, peliniai pašiaušėliai)	Purkšti, kai javai yra nuo 3 lapelių iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13-32), o piktžolės yra nuo 2 lapelių iki krūmijimosi tarpsnių (BBCH 12-29)	1	
59.	Fiesta T BASF A/S, 0204H/06, 2015-04-30	Chloridazonas + kvinmerakas 360 + 60 g/l	6,0	Cukriniai ir pašariniai runkeliai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Pasėliai purškiami per 3 kartus: pirmą kartą 1,5 l/ha Fiesta T+ Regio 2,0 l/ha+ 1,0 l/ha augalinio aliejaus, kai piktžolės yra skilčialapių - 2 tikrųjų lapelių tarpsnyje, o runkeliai turi gerai išvystytus skilčialapius; antrą - 2,0 l/ha Fiesta T+ 2,0 l/ha Regio+ 1,0 l/ha augalinio aliejaus po 7-12 dienų; trečią - 2,5 l/ha Fiesta T+ 2,0 l/ha Regio+ 1,0 l/ha augalinio aliejaus po 7-12 dienų; per 1 kartą: 5,0 l/ha Fiesta T prieš sėją arba po sėjos - iki sudygimo	3	
60.	Fuego top Adama Registrations B.V. AS2-6H/2015 2022-04-30	Metazachloras + kvinmerakas 375 + 125 g/l	1,75-2,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės dviskiltės ir vienaskiltės piktžolės	Purkšti po sėjos - 3 tikrųjų lapelių tarpsniu (BBCH 00-13)	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sudėtyje yra metazachloro ir 1,2-benzizotiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Įtariama, kad sukelia vėžį. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos

								<p>nurodymus. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metazachloro ir / ar kvinmerako dažniau kaip kartą per trejus metus. Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l</p>
61.	Fusilade forte 150 EC Syngenta Ltd., 0073H/01, 2015-12-31	Fluazifop-P-butilas 150 g/l	1,0-1,5 2,0-3,0	Vaismedžių pomedžiai Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės vienskiltės Daugiametės vienaskiltės	Purškama kai piktžolės išskleidžia 2-4 lapelius Purškama kai piktžolės išskleidžia 4-6 lapelius	1 1	
62.	Galera Dow AgroSciences Denmark A/S, AS2-44H/2014	Klopiralidas + pikloramas 267 + 67 g/l	0,3	Žieminiai rapsai	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti pavasarį nuo stiebo ilgėjimo pradžios iki kol lapai uždengia butonus (BBCH 30-50)	1	Herbicidas klasifikuojamas: Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijas

	2019-04-30		0,3	Vasariniai rapsai	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai vasariniai rapsai yra 2–4 lapelių (BBCH 12–14) tarpsnio	1	nurodymus. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra klopivaldo ir pikloramo, dažniau kaip kartą per dvejus metus.
63.	Glyphogan 360 SL Adama Registrations B.V. 0161H/06, 2016-03-04	Glifosatas 360 g/l	3,0	Varpiniai javai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%. Nenaudoti sėkliniuose javų pasėliuose	1	Herbicido forma: vandeninis tirpalas. Herbidas klasifikuojamas: Pavoingas. Smarkiai pažeidžia akis. Kenksmingas įkvėpus.
			3,0	Žirniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių. Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose	1	Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerosolio.
			4,0	Žirniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių. Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose	1	Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
			3,0	Linai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%. Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose	1	Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.
			4,0	Linai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%.	1	Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į

					Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose		gydytoją. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
		3,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiama 14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%. Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose	1	Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
		4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama 14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.
		2,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, javų pabiros, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	Pakuotė: 5 l, 20 l, 200 l
		4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo	1	
		2,0	Pūdymai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
		4,0	Pūdymai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo	1	
		2,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis. Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos	1	
		4,0	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis. Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios	1	

						kamienų apsaugos		
64.	Glyphomax Dow AgroSciences Danmark A/S, 0199H/06, 2016-03-16	Glifosatas 360 g/l	3,0	Varpiniai javai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama 14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose varpinių javų pasėliuose
			2,0	Žirniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiama 14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose
			4,0	Žirniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama 14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	
			3,0	Linai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose
			4,0	Linai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
			3,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose
			4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
			2,0	Pūdymai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			4,0	Pūdymai	Daugiametės vienaskiltės ir	Purškiamos vegetuojančios piktžolės. Žemę galima	1	

					dviskiltės	pradėti dirbti po 10 dienų		
			3,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, javų pabiros ir mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			2,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
			4,0	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	
65.	Glyphomax 480 Dow AgroSciences Denmark A/S, 0439H/12, 2016-12-31	Glifosatas 480 g/l	1,5-2,25	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai, avižos	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį Nenaudoti sėkliniams pasėliams	1	Herbicido forma: tirpus koncentratas Herbicidas klasifikuojamas: Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodų ar
			1,5-3,0	Žirniai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai paruduoja 70-75% ankščių, ne vėliau kaip 10 dienų iki derliaus nuėmimo, ne daugiau kaip 1 kartą. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nenaudoti sėkliniams	1	

					pasėliams.		nuo kelių). Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l, 640 l
		2,25-3,0	Pupos	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai paruduoja 70-75% ankščių, ne vėliau kaip 10 dienų iki derliaus nuėmimo, ne daugiau kaip 1 kartą. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltės, didesnė – daugiabetes vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės. Nenaudoti sėkliniams pasėliams	1	
		2,25-3,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai sėklų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį Nenaudoti sėkliniams pasėliams	1	
		2,25-4,5	Pūdymai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžolės Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.	1	
		1,125-1,5	Ražienos	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžolės Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.	1	
		2,25-3,0	Ražienos	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžolės Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.		

			2,25-4,5	Sėklinių žolių ražienos	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	
			1,5-4,5	Vaismedžių (obelių, kriaušių, vyšnių, slyvų) pomedžiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis Nenaudoti 1–2 metų vaismedžių sodų pomedžiuose	1	
			0,75-1,5	Plotai prieš sėją	Javų pabiros	Purkšti vegetuojančias piktžoles prieš pavasarinį dirvos dirbimą	1	
			2,25	Plotai prie sėją	Varpučiai	Purkšti vegetuojančias piktžoles prieš pavasarinį dirvos dirbimą		
			1,5-3,0	Sėjant į ražienas	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti po sėjos vegetuojančias piktžoles Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiames vienaskiltes, didesnė – daugiames vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Sėklos turi būti gerai įterptos į dirvą.	1	
66.	Glyphomax Plus Dow AgroSciences Danmark A/S, 0328H/07, 2017-07-27	Glifosatas 360 g/l	3,0	Varpiniai javai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%. Nenaudoti sėkliniuose varpinių javų pasėliuose	1	Herbicido forma: vandeninis tirpalas Herbidas klasifikuojamas: Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
			2,0 – 4,0	Žirniai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai paruduoja 75% ankščių, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d. Mažesnė norma naikina vienames	1	Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų

						<p>vienaskiltes, dviskiltes ir mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnė norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose.</p>		<p>apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Pakuotė: 10 l, 20 l</p>
		3,0-4,0	Linai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 10 d. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes, dviskiltes ir mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnė norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose.	1		
		3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 10 d. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes, dviskiltes ir mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnė norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose	1		

			2,0-4,0	Pūdymai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes, dviskiltes ir mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnė norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.	1	
			3,0-4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes, dviskiltes ir mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnė norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.	1	
			2,0-4,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes, dviskiltes ir mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnė norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nenaudoti 1-2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos	1	

67.	Glyfos Bio 450 SL Cheminova A/S, 0295H/06, 2016-03-25	Glifosatas 450 g/l	2,4	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			2,4	Žirniai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose
			2,4-3,2	Lubiniai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių.	1	Nenaudoti sėklinių lubinų pasėliuose.
			2,4-3,2	Linai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai sėklų drėgmė mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose.
			2,4-3,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai sėklų drėgmė mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose.
			2,4-4,0	Pūdymai, dirvonai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 2 savaitių
			2,4-3,2	Plotai, skirti žemės ūkio augalams sėti ar sodinti	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 2 savaitių
			2,4-3,2	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 2 savaitių
			2,4-4,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	1-2 m. soduose naudoti tik su specialia kamienų apsauga.
68.	Glyfos Bio 360 SL Cheminova A/S, 0294H/06, 2016-03-25	Glifosatas 360 g/l	3,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai ir miežiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0	Žirniai	Vienmetės ir daugiametės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai	1	Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose

					vienaskiltės ir dviskiltės	paruduoja 75% anksčių		
			3,0-4,0	Lubiniai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% anksčių	1	Nenaudoti sėklinių lubinų pasėliuose
			3,0-4,0	Linai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai sėklų drėgmė mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose
			3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai sėklų drėgmė mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose rapsų pasėliuose
			3,0-5,0	Pūdymai, dirvonai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 2 savaitių
			3,0-4,0	Plotai, skirti žemės ūkio augalų sėjai ar sodinimui	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 2 savaitių
			3,0-4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 2 savaitių
			3,0-5,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
69.	Glyfos 360 SL Cheminova A/S, 0095H/06, 2016-03-25	Glifosatas 360 g/l	3,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai ir miežiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0	Žirniai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% anksčių	1	Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose
			3,0-4,0	Lubiniai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% anksčių	1	Nenaudoti sėklinių lubinų pasėliuose

			3,0-4,0	Linai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai sėklų drėgmė mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose
			3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai sėklų drėgmė mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose rapsų pasėliuose
			3,0-5,0	Pūdymai, dirvonai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 2 savaitių
			3,0-4,0	Plotai, skirti žemės ūkio augalams sėti ar sodinti	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 2 savaitių
			3,0-4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 2 savaitių
			3,0-5,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
70.	Glyfos supreme 450 SL Cheminova A/S, 0338H/07, 2017-12-17	Glifosatas 450 g/l	2,4	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			2,4	Žirniai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose
			2,4-3,2	Lubinai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių.	1	Nenaudoti sėklinių lubinų pasėliuose. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes.
			2,4-3,2	Linai	Vienmetės ir daugiametės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai sėklų	1	Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose. Mažesnioji norma naikina

				vienaskiltės ir dviskiltės	drėgmė mažesnė nei 30%		vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes.
		2,4-3,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai sėklų drėgmė mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes.
		2,4-4,0	Pūdymai, dirvonai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes. Žemę galima pradėti dirbti po 2 savaitių
		2,4-3,2	Plotai, skirti žemės ūkio augalams sėti ar sodinti	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes. Žemę galima pradėti dirbti po 2 savaitių
		2,4-3,2	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes. Žemę galima pradėti dirbti po 2 savaitių
		2,4-4,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	1-2 m. soduose naudoti tik su specialia kamienų apsauga. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes.

71.	Glean 75 DF Du Pont Finland Ltd., 0030H/06, 2016-03-23	Chlorsulfuronas 750 g/kg	0,005-0,007+ paviršiaus aktyvioji medžiaga	Linai	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami „eglutės“ stadijoje (3-8 cm aukščio)	1	
72.	Go-Low Power Nufarm Limited 0350H/08 2018-04-11	MCPA 300 g/l	2,0	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti atsinaujinus vegetacijai iki pirmo bamblio susiformavimo tarpsnio (BBCH 13-30)	1	
			2,0	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio susiformavimo tarpsnio (BBCH 21-30)	1	
73.	Goltix 700 SC Adama Registrations B.V. AS2-15H/2015 2020-08-31	Metamitronas 700 g/l	3,0	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, burokėliai	Vienmetės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti, kai runkeliai ar burokėliai yra nuo skilčialapių iki 8 tikrųjų lapelių (BBCH 10–18) tarpsnio, o piktžolės turi 2– 4 tikruosius lapelius: per 2 kartus – po 1,5 l/ha, per 3 kartus – po 1,0 l/ha, per 4 kartus – po 0,75 l/ha, kas 10–15 dienų.	3	Herbicido forma: koncentruota suspensija Herbidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-3(2H)- izotiazolono mišinio su 2-metil- 3(2H)-izotiazolonu. Gali sukelti alerginę reakciją. Kenksminga prarijus. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo ir įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1

								metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Siekiant apsaugoti netikslius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Siekiant apsaugoti gruntinį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metamitrono, dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke. Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l
74.	Goltix Super Adama Registrations B.V. AS2-13H/2015 2017-07-31	Metamitronas + etofumezatas 350+ 150 g/l	3,5-4,5	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, burokėliai	Vienmetės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti vegetacijos metu per 3 kartus: kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnio (nepriklausomai nuo runkelių ar burokėlių augimo tarpsnio): pirmą kartą 1,0 l/ha, antrą kartą 1,0-1,5 l/ha, trečią kartą 1,5-2,0 l/ha	3	Herbicido forma: koncentruota suspensija Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sudėtyje yra 1,2-benzistiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki

								<p>melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metamitrono ir / arba etofomezato dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke, neviršijant 1 kg/ha etofomezato.</p> <p>Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l</p>
75.	<p>Goltix Queen Adama Registrations B.V. AS2-22H/2014 2020-08-31</p>	<p>Metamitronas + kvinmerakas 525+ 40 g/l</p>		<p>Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai</p>	<p>Vienmetės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės</p>	<p>Purkšti po 1,5–2,0 l/ha, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnio, o runkeliai ar burokėliai skilčialapių – devynių lapelių išsivystymo tarpsnio (BBCH 10-19) ne daugiau kaip 3 kartus.</p>	3	<p>Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai.</p> <p>Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius.</p> <p>Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aukštelę, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio</p>

								kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metamitrono ir / arba kvinmerako, daugiau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke. Pakuotė: 5 l.
76.	Granstar Preemia 50 SX Du Pont Finland Ltd., 0278H/05, 2015-11-07	Tribenuron metilas 500 g/kg	0,015–0,0225	Žieminiai kviečiai, rugiai	Dviskiltės piktžolės	Purškama kai piktžolės turi 2–4 lapelius, javai yra nuo 2 lapelių iki paskutinio lapo tarpsnio	1	Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, nenaudoti augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra tribenuron metilas daugiau kaip 1 kartą per sezoną.
			0,015–0,0225	Vasariniai miežiai, kviečiai	Dviskiltės piktžolės	Purškama kai piktžolės turi 2–4 lapelius, javai yra nuo 2 lapelių iki paskutinio lapo tarpsnio	1	
77.	Grodyl Bayer Crop Science AG 0097H/13, 2019-12-31	Amidosulfuronas 750 g/kg	0,020-0,040	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienmetės dviskiltės	Purkšti pavasarį atsinaujinus javų vegetacijai iki vamzdelėjimo tarpsnio pabaigos (BBCH 49)	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 500 g.
			0,020-0,040	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos.	Vienmetės dviskiltės	Purkšti nuo trečiojo lapo pasirodymo iki vamzdelėjimo tarpsnio pabaigos (BBCH 13–49)	1	
			0,020-0,040	Linai	Vienmetės dviskiltės	Purkšti, kai linai yra 3–12 lapelių tarpsnio	1	

78.	Harmony 50 SX Du Pont Finland Ltd, 0300H/06, 2016-06-29	Tifensulfuron metilas 500 g/kg	0,011-0,015 + PAM	Pašariniai kukurūzai	Dviskiltės piktžolės	Pasėliai purškiami kai piktžolės išskleidžia 2, o kukurūzai 3-6 lapelius	1	Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, nenaudoti augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra tifensulfuronmetilo dažniau kaip 1 kartą per sezoną.
			0,023 + PAM	Vasariniai ir žieminiai kviečiai, vasariniai ir žieminiai miežiai, avižos su/be varpinių žolių įsėliu	Dviskiltės piktžolės	Pasėliai purškiami kai piktžolės išskleidžia 2, o žieminiai javai yra nuo krūmijimosi iki antro bamblio tarpsnio, vasariniai – išskleidę 1-4 lapelius	1	
			0,015 + PAM	Vasariniai ir žieminiai kviečiai, vasariniai ir žieminiai miežiai, avižos su liucernos įsėliu	Dviskiltės piktžolės	Pasėliai purškiami kai piktžolės išskleidžia 2, o žieminiai javai yra nuo krūmijimosi iki antro bamblio tarpsnio, vasariniai – išskleidę 1-4 lapelius, liucerna turi 1 tikrąjį lapelį	1	
			0,03-0,038 + PAM	Varpinių žolių pievos ir ganyklos	Dviskiltės piktžolės	Purškama 2-3 savaitės po šienavimo, kai piktžolės intensyviai atauga. Didesnę normą naudoti rūgštyinėms naikinti	1	
79.	Herbaflex Stahler International GmbH & Co KG 0353H/08 2018-07-17	Izoproturonas+ beflubutamidas 500+85 g/l	2,0	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kviatrugiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purškšti pavasarį, atsinaujinus vegetacijai	1	Žieminiuose rugiuose naudoti iki BBCH 25 tarpsnio, žieminiuose kviečiuose, miežiuose, kviatrugiuose – iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 29)
80.	Hussar Activ OD Bayer Crop Science AG 0344H/08 2018-02-20	Natrio metil- jodsulfuronas+ 2,4-D 2- etilheksilo esteris 10+377 g/l	0,75-1,0	Žieminiai kviečiai, kviatrugiai, rugiai	Vienmetės vienaskiltės bei kai kurios daugiametės dviskiltės	Purškama nuo javų trečio lapo išsiskleidimo iki antro bamblio pasirodymo (BBCH 13-32)	1	Herbidas klasifikuojamas: Pavojingas. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Smarkiai pažeidžia akis. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina

								<p>vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.</p> <p>Mūvēti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.</p> <p>Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.</p> <p>Neskatinti vėmimo.</p> <p>Patekus į akis: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</p> <p>Jeigu sudirginama oda arba ją išberia, kreiptis į gydytoją.</p> <p>Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Talpyklą atiduoti į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l.</p>
81.	Jablo Monsanto Crop Science Danmark A/S,	Glifosatas 360 g/l	3,0	Varpiniai javai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra	1	Nenaudoti sėkliniuose javų pasėliuose

0302H/06, 2016-08-24			dviskiltės	mažesnė nei 30%		
	3,0	Žirniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	Nenaudoti sėkliniuose žirnių pasėliuose
	4,0	Žirniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių		
	3,0	Linai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose linų pasėliuose
	4,0	Linai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%		
	3,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose rapsų pasėliuose
	4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%		
	2,0	Pūdymai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
	4,0	Pūdymai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų		
	2,0	Laukai po derliaus	Vienmetės	Purškiamos vegetuojančios	1	

				nuėmimo	vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų		
			4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų		
			2,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti 1-2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
			4,0	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis		
82.	Kalif 360 CS Adama Registrations B.V. 0421H/12 2019-10-31	Klomazonas 360 g/l	0,2-0,33	Žieminiai rapsai	Kai kurios dviskiltės ir vienaskiltės	Purkšti ne vėliau kaip 3 dienos po sėjos	1	Herbicidas klasifikuojamas: Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybių ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų
			0,15-0,25	Vasariniai rapsai	Kai kurios dviskiltės ir vienaskiltės	Purkšti ne vėliau kaip 3 dienos po sėjos	1	
			0,2-0,25	Bulvės	Kai kurios dviskiltės ir vienaskiltės	Purkšti pasodinus bulves, ne vėliau kaip 5 dienos iki sudygimo	1	

								apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra klomazono, dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke. Pakuotė: 1 l, 5 l.
83.	Kalif mega Adama Registrations B.V. 0456H/13 2020-07-31	Metazachloras + klomazonas 250+ 33 g/l	2,5-3,0	Žieminiai rapsai	Dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti pirmas 3 dienas po sėjos	1	Herbicidas klasifikuojamas: Kenksmingas. Aplinkai pavojingas. Įtariama, kad gali sukelti vėžį. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti patekimo ant odos. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti požeminį
			2,5	Vasariniai rapsai	Dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti pirmas 3 dienas po sėjos	1	

								<p>vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra klorozonono ir / ar metazachloro dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke.</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, iki paviršinio vandens telkinių būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.</p>
84.	Kernel 480 SL Cheminova A/S, 0296H/06, 2016-03-25	Glifosatas 480 g/l	2,3	Žieminiai ir vasariniai kviečiai ir miežiai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiami 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			2,3	Žirniai	Vienmetės ir daugiamečių vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiami 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	Nenaudoti sėkliniuose žirnių pasėliuose
			2,3-3,0	Lubiniai	Vienmetės ir daugiamečių vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiami 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	Nenaudoti sėkliniuose lubinų pasėliuose
			2,3-3,0	Linai	Vienmetės ir daugiamečių vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiami 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė sėklų drėgmė mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose linų pasėliuose
			2,3-3,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės ir daugiamečių vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiami 14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė sėklų drėgmė mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose rapsų pasėliuose
			2,3-3,8	Pūdymai, dirvonai	Vienmetės ir daugiamečių vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiami vegetacijos metu	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
			2,3-3,0	Plotai, skirti žemės ūkio augalų sėjai	Vienmetės ir daugiamečių	Purškiami vegetacijos metu	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų

				ar sodinimui	vienaskiltės ir dviskiltės			
			2,3-3,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų
			2,3-3,8	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama vegetacijos metu	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
85.	Klinik 360 SL Nufarm UK Ltd., 0233H/06, 2016-02-09	Glifosatas 360 g/l	3,0	Varpiniai javai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose mažesnė nei 30% ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 14 d.	1	Nenaudoti sėkliniuose varpinių javų pasėliuose
			3,0	Žirniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 14 d.	1	Nenaudoti sėkliniuose žirnių pasėliuose
			4,0	Žirniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 14 d.	1	
			3,0	Linai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiama kai vidutinė sėklų drėgmė mažesnė nei 30% ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 10 d.	1	Nenaudoti sėkliniuose linų pasėliuose
			4,0	Linai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama kai vidutinė sėklų drėgmė ne mažesnė kaip 30% ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 10 d.	1	
			3,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios	Purškiama kai vidutinė sėklų drėgmė mažesnė nei 30% ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 10	1	Nenaudoti sėkliniuose rapsų pasėliuose

					daugiametės vienaskiltės	d.		
			4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama kai vidutinė sėklų drėgmė ne mažesnė kaip 30% ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 10 d.	1	
			2,0	Pūdymai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			4,0	Pūdymai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			2,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo	1	
			4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo	1	
			2,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	1–2 metų soduose nenaudoti be specialios kamienų apsaugos
			4,0	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	
86.	Kyleo Nufarm GmbH & Co KG, AS2-11H/2014 2016-12-31	Glifosatas + 2,4-D 240+160 g/l	3,0-5,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienametės dviskiltės	Purškama vegetacijos metu apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų. Pastaba: mažesnė norma naudojama, kai piktžolės	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir

					nedidelės ir mažai išplitusios, didesnė – kai piktžolės didelės ir labai išplitusios.		aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvēti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia, kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 0,25 l, 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l, 220 l, 640 l, 1000 l.
		4,0-5,0	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės dviskiltės ir vienametės vienaskiltės	Purškama vegetacijos metu apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų Pastaba: mažesnė norma naudojama, kai piktžolės nedidelės ir mažai išplitusios, didesnė – kai piktžolės didelės ir labai išplitusios.	1	
		5,0	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės	Purškama vegetacijos metu apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų	1	
		2,0-3,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienametės dviskiltės	Purkšti vegetacijos metu. Pastaba: mažesnė norma naudojama, kai piktžolės nedidelės ir mažai išplitusios, didesnė – kai piktžolės didelės ir labai išplitusios.	1	
		3,0-5,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės dviskiltės	Purkšti vegetacijos metu. Pastaba: mažesnė norma naudojama, kai piktžolės nedidelės ir mažai išplitusios, didesnė – kai piktžolės didelės ir labai išplitusios.	1	
		3,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienametės vienaskiltės	Purkšti vegetacijos metu	1	
		5,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės vienaskiltės	Purkšti vegetacijos metu	1	
		2,0-3,0	Pūdymai, dirvonai	Vienametės dviskiltės	Purkšti vegetacijos metu. Pastaba: mažesnė norma naudojama, kai piktžolės nedidelės ir mažai	1	

						išplitusios, didesnė – kai piktžolės didelės ir labai išplitusios.		
			3,0-5,0	Pūdymai, dirvonai	Daugiametės dviskiltės	Purkšti vegetacijos metu. Pastaba: mažesnė norma naudojama, kai piktžolės nedidelės ir mažai išplitusios, didesnė – kai piktžolės didelės ir labai išplitusios.	1	
			3,0	Pūdymai, dirvonai	Vienametės vienaskiltės	Purkšti vegetacijos metu	1	
			5,0	Pūdymai, dirvonai	Daugiametės vienaskiltės	Purkšti vegetacijos metu	1	
			2,0-3,0	Laukams prieš javų sėją	Vienametės dviskiltės	Purkšti vegetacijos metu. Pastaba: mažesnė norma naudojama, kai piktžolės nedidelės ir mažai išplitusios, didesnė – kai piktžolės didelės ir labai išplitusios.	1	
			3,0-5,0	Laukams prieš javų sėją	Daugiametės dviskiltės	Purkšti vegetacijos metu. Pastaba: mažesnė norma naudojama, kai piktžolės nedidelės ir mažai išplitusios, didesnė – kai piktžolės didelės ir labai išplitusios.	1	
			3,0	Laukams prieš javų sėją	Vienametės vienaskiltės	Purkšti vegetacijos metu	1	
			5,0	Laukams prieš javų sėją	Daugiametės vienaskiltės	Purkšti vegetacijos metu	1	
87.	Komplet Bayer Crop Science AG 0408H/11 2018-12-31	Flufenacetatas + diflufenikanas 280+280 g/l	0,4-0,5	Žieminiai kviečiai, rugiai,, kvietrugiai, miežiai	Dirvinė smilguolė, dviskiltės piktžolės	Purkšti rudenį, kai sudygs javai, iki trijų lapelių išsiskleidimo (BBCH 11-13) tarpsnio	1	Herbicido forma: vandeninė koncentruota suspensija Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Kenksmingas prarijus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali pakenkti nervų sistemai, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai prarijus. Labai toksiškas vandens organizmam

								<p>sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Pasijutus blogai: Kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskirti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. Pakuotė: 1 l, 5 l, 15 l</p>
88.	Kontakt 320 SC Adama Registrations B.V. 0316H/07, 2017-03-22	Fenmedifamas 320 g/l	1,5-3,0	Cukriniai ir pašariniai runkeliai	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami per 3 kartus po 0,5 l/ha mišiniuose su Ethosat ir Goltix , kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje, nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo	3	

						<p>tarpsnio arba pirmą kartą Kontakt 320 SC 0,75 l/ha mišiniuose su Goltix , antrą kartą - Kontakt 320 SC 0,75 l/ha mišiniuose su Goltix, trečią kartą - Kontakt 320 SC 1,0 l/ha mišiniuose su Ethosat. Purškiant per 2 kartus: pirmą kartą, kai piktžolės yra iki 4 tikrųjų lapelių augimo tarpsnio Kontakt 320 SC 0,75 l/ha mišiniuose su Ethosat ir Goltix, antrą kartą 5-10 dienų po pimojo purškimo Kontakt 320 SC 0,75 l/ha mišiniuose su Ethosat ir Goltix.</p>		
89.	<p>Legacy Pro Adama Registrations B.V. 0432H/12 2019-12-31</p>	<p>Diflufenikanas + pendimetalinas + chlorotoluronas 40+300+250 g/l</p>	2,0	<p>Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, miežiai</p>	<p>Vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės</p>	<p>Purkšti rudenį, kai javai turi 1-3 lapelius (BBCH 10-13)</p>	1	<p>Herbicido forma: koncentruota suspe Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sudėtyje yra pendimetalino ir 1,2-b 3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Įtariama, kad sukelia vėžį Įtariama, kad kenkia negimusiam vai Labai toksiškas vandens organizm ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikata keliamos rizikos, būtina vykdyt instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instr Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėt drabužius. Esant poveikiui arba jeigu numanor Kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius te reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos jo pakuote (neplauti purškimo įrengir paviršinio vandens telkinių / vengti ta</p>

								drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizm išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki p vandens telkinių ir 1 metro – iki meli griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis vandens telkinių yra didesnis nei 2 pr išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, ap daugiametėmis augalais. Siekiant apsaugoti netikslinius augalu išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki n paskirties žemės. Pakuotė: 5 l, 10 l, 20
90.	Legacy 500 SC Adama Registrations B.V. AS2-24H/2014 2019-12-31	Diflufenikanas 500 g/l	0,15-0,2 arba 0,20-0,25 arba 0,15-0,20	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti po sėjos iki dviejų lapelių tarpsniu (BBCH 00- 12) arba purkšti 3-4 lapelių tarpsniu (BBCH 13-14) arba purkšti pavasarį, atsinaujinus vegetacijai iki pirmojo bamblio tarpsnio (iki BBCH 31)	1	Herbidas klasifikuojamas: Atsargiai. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą atiduoti į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.
			0,15-0,20	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti po sėjos iki pirmojo bamblio tarpsnio (BBCH 00- 31)	1	
91.	Leopard Adama Registrations B.V. 0450H/13 2020-11-30	Kvizalofop-P- etilas 50 g/l	1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai, cukriniai ir pašariniai	Vienametės vienaskiltės, javų pabiros	Purkšti, kai piktžolės turi 2- 4 lapelius	1	Herbido forma: koncentruota emulsija Herbidas klasifikuojamas: Pavojingas.

			runkeliai, morkos, bulvės, gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, Briuselio kopūstai, brokoliai, svogūnai, česnakai, žirniai, pupos, lubinai, linai				Įtariama, kad sukelia vėžį. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Neskatinėti vėmimo. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
		2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai, cukriniai ir pašariniai runkeliai, morkos, bulvės, gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, Briuselio kopūstai, brokoliai, svogūnai, česnakai, žirniai, pupos, lubinai, linai	Daugiametės vienaskiltės	Purkšti, kai piktžolės turi 4-6 lapelius	1	
		2,0-2,5	Obelių pomedžiai, dekoratyviniai augalai	Daugiametės ir vienametės vienaskiltės	Purkšti, kai piktžolės turi 4-6 lapelius	1	

								Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 5 l, 10 l
92.	Lentagran WP Belchim Crop Protection NV 0367H/09 2019-04-04	Piridatas 45%	1,5-2,0	Garbanotieji, raudongūžiai, baltagūžiai, žiediniai kopūstai, brokoliai	Vienametės dviskiltės	Purkšti po sudygimo, kai kopūstai turi 6 lapelius arba 3-4 savaitės po daigų pasodinimo, kai kopūstai turi mažiausiai 6 lapelius	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. L abai toksiškas vandensorganismams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybu ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti produkto dirvožemiuose su mažu organinės medžiagos kiekiu. Pakuotė: 1 kg
			1,5-2,0	Briuseliniai kopūstai	Vienametės dviskiltės	Purkšti 3-4 savaitės po daigų pasodinimo, kai kopūstai turi mažiausiai 6 lapelius	1	
			1,0-1,5	Svogūnai auginami iš sėklų arba iš sėjinukų	Vienametės dviskiltės	Purkšti po sudygimo nuo 2 lapelių tarpsnio po 0,5 kg/ha kas 10-12 dienų 2-3 kartus	3	
			1,5-2,0	Porai	Vienametės dviskiltės	Purkšti po sudygimo, nuo 2-3 lapelių tarpsnio arba po daigų pasodinimo (BBCH 13)	1	
93.	Lintur 70 WG Syngenta Crop Protection AG, 0140H/05, 2015-12-31	Triasulfuronas + dikamba 41 + 659 g/kg	0,15-0,18	Žieminiai kviečiai, rugiai	Dviskiltės piktžolės	Pasėliai purškiami nuo 3-4 lapelių iki krūmijimosi pabaigos	1	
			0,12-0,15	Vasariniai kviečiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Pasėliai purškiami nuo 2 lapelių iki krūmijimosi pabaigos	1	

94.	Lingo Belchim Crop Protection NV 0432H/12 2016-07-31	Linuronas + klorazonas 240+45 g/l	2,0	Bulvės, pupos, žirniai	Vienmetės piktžolės	Purkšti iki augalų sudygimo	1	<p>Herbicidas klasifikuojamas: Pavojingas.</p> <p>Įtariama, kad sukelia vėžį.</p> <p>Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui.</p> <p>Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.</p> <p>Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.</p> <p>Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.</p> <p>Neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.</p> <p>Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.</p> <p>Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro apsaugos zoną iki melioracijos griovių.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p>
-----	--	---	-----	---------------------------	------------------------	-----------------------------	---	---

								Pakuotė: 1 l, 5 l
95.	Logran 20 WG Syngenta Crop Protection AG, 0265H/04, 2015-12-31	Triasulfuronas 200 g/kg	0,025-0,04	Žieminiai kviečiai, vasariniai miežiai	Vienmetės dviskiltės piktžolės	Pasėliai purškiami, kai javai yra nuo 2 lapelių iki krūmijimosi pabaigos	1	
96.	Lontrel 72 SG Dow AgroSciences Denmark A/S, 0043H/11 2021-06-06	Klopiralidas 720 g/kg	0,125-0,165	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai yra krūmijimosi- paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 21- 37) tarpsnio	1	Herbicido forma: vandenyje tirpiosios granulės Herbidas klasifikuojamas: Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodyby ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Pakuotė: 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg
			0,125-0,165	Vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai yra krūmijimosi- paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 21- 37) tarpsnio	1	
			0100-0,165	Žieminiai rapsai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai rapsų 1 tarpubamblis ištįsęs- žali butonai matosi iš viršaus (BBCH 31-51)	1	
			0100-0,165	Vasariniai rapsai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai rapsų išsivystęs antras lapas – žali butonai matosi iš viršaus (BBCH 12- 51)	1	
			0,165	Kukurūzai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai kukurūzai turi 3-6 lapelius (BBCH 13-16)	1	
			0125-0,165	Cukriniai, pašariniai runkeliai, burokėliai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai cukriniai ir pašariniai runkeliai arba burokėliai turi 2-4 tikruosius lapelius (BBCH 12-15). Usnims esant 15-20 cm aukščio naudoti 0,165 kg/ha normą	1	
			0,165	Braškės	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuėmus braškių derlių	1	
			0,125-0,165	Varpinės žolės sėklai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai varpinės žolės sėklai yra krūmijimosi- paskutinio lapo pasirodymo	1	

			0,125-0,165	Ganyklos	Dviskiltės piktžolės	(BBCH 21-37) tarpsnio Purkšti, kai ganyklos yra krūmijimosi–paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 21–37) tarpsnio	1	
			0,125	Linai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai linai yra pirmųjų tikrųjų lapelių–eglutės (BBCH 12-19) tarpsnio, o piktžolės – skrotelės tarpsnio	1	
			0,125-0,165	Gūžiniai, žiediniai kopūstai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai kopūstai yra vėlesnio nei dviejų tikrųjų lapelių tarpsnio (>BBCH 12), o piktžolės – skrotelės tarpsnio	1	
			0,125-0,165	Juodieji ir raudonieji serbentai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti serbentų pokrūmius, apsaugant žaliąsias serbentų dalis, kai piktžolės yra skrotelės tarpsnio	1	
97.	Maister OD Bayer Crop Science AG 0363H/09 2019-02-25	Foramsulfuronas + natrio metil jodosulfuronas 30 g/l + 1 g/l	1,5	Kukurūzai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai kukurūzai turi 2–6, o piktžolės 2–3 lapelius	1	
98.	Maister WG Bayer Crop Science atstovybė Baltijos šalims, 0287H/06, 2016-03-23	Foramsulfuronas + natrio metil jodosulfuronas 300 g/l + 10 g/l	0.15 + 2,0 l/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos	Kukurūzai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama kai kukurūzai turi 2–6, o piktžolės 2–3 lapelius	1	
99.	MCPA 750 Nufarm GmbH & Co KG 0116H/10, 2020-02-08	MCPA 750 g/l	0,7-1,0	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo 3-4 lapelių tarpsnio iki pirmojo bamblio pasirodymo	1	Nešienauti ir neganyti galvijų 4 savaites po purškimo
			0,7-1,0	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo 3-4 lapelių tarpsnio iki pirmojo bamblio pasirodymo	1	
			0,8-1,0	Javai su dobilų įsėliu	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai dobilai yra 1-2 tikrųjų lapelių, o javai - krūmijimosi tarpsnyje	1	
			1,0-1,3	Linai	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai linai „eglutės“ tarpsnyje (3-8 cm aukščio)	1	

			1,3-1,7	Pievos, ganyklos	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purškiamos jaunos, aktyviai augančios piktžolės	1		
100.	MCPA Super Nufarm GmbH & Co KG 0118H/10, 2020-02-08	MCPA 500 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo 3-4 lapelių tarpsnio iki pirmojo bamblio pasirodymo	1		
			1,0-1,5	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo 3-4 lapelių tarpsnio iki pirmojo bamblio pasirodymo	1		
			0,8-1,2	Javai su dobilų įsėliu	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai dobilai yra 1-2 tikrųjų lapelių, o javai - krūmijimosi tarpsnyje	1		
			2,0	Bulvės	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti iki bulvių sudygimo vegetuojančias piktžoles	1		
			1,0	Bulvės	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai bulvės yra 3-8 cm aukščio	1		
			1,5-2,0	Pievos ir ganyklos	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai piktžolės jaunos ir aktyviai auga	1		Nešienauti ir neganyti galvijų 4 savaites po purškimo
			0,8-1,2	Raudonieji dobilai sėklai	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti sėklų nuėmimo metais nuo atžėlimo pradžios 2-3 savaitių laikotarpyje	1		Kūlenas gyvuliams šerti galima naudoti tik praėjus 45 dienoms po purškimo
101.	Metazamix Dow Agro Sciences Denmark A/S AS2-21H/2015 2019-12-31	Pikloramas + aminopiraldas + metazachloras 13,3 + 5,3 + 500 g/l	0,8	Žieminiai rapsai	Dviskiltės ir vienametės miglės	Purkšti nuo skilčialapių iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 10–14)	1	Herbicido forma: koncentruota suspensija. Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Įtariama, kad sukelia vėžį. Sudėtyje yra metazachloro, pikloramo monoetanolamino druskos ir 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines /	
			1,0	Vasariniai rapsai	Dviskiltės ir vienametės miglės	Purkšti po sėjos iki sudygimo (BBCH 00–09)	1		

								<p>dėvėti apsauginius drabužius. Esant poveikiui arba jei numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l.</p>
102.	<p>Metric Belchim Crop Protection NV 0385H/10 2020-04-07</p>	<p>Klomazonas + metribuzinas 60 + 233 g/l</p>	1,0-1,5	Bulvės	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti iki piktžolių ir bulvių sudygimo	1	<p>Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai.</p> <p>Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote</p>

								(neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro apsaugos zoną iki melioracijos griovių. Pakuotė: 5 l
103.	Mezzo WG Nufarm GmbH & Co KG 0351H/08 2018-04-11	Metsulfuron metilas 200 g/kg	15 g/ha	Žieminiai kviečiai	Trumpaamžės dviskiltės	Purkšti su paviršiaus aktyviąja medžiaga 0,05% tirpalo kiekio javų krūmijimosi-stiebo augimo tarpsniuose (BBCH 21-32), esant palankioms augimo sąlygoms ir vyraujant 2-4 lapelių dydžio jautrioms piktžolių rūšims	1	
			30 g/ha	Žieminiai kviečiai	Trumpaamžės dviskiltės	Purkšti su paviršiaus aktyviąja medžiaga 0,05% tirpalo kiekio javų krūmijimosi-paskutinio lapo tarpsniuose (BBCH 21-39), mažiau palankiomis augimo sąlygomis ir vyraujant daugiau kaip 4 lapelių dydžio piktžolėms	1	
			10 g/ha	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Trumpaamžės dviskiltės	Purkšti su paviršiaus aktyviąja medžiaga 0,05% tirpalo kiekio javų dviejų lapelių – krūmijimosi tarpsniuose (BBCH 12-25), esant palankioms augimo sąlygoms ir vyraujant 2-4 lapelių dydžio jautrioms piktžolių rūšims		
			20 g/ha	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Trumpaamžės dviskiltės	Purkšti su paviršiaus aktyviąja medžiaga 0,05% tirpalo kiekio javų krūmijimosi-paskutinio lapo		

						tarpsniuose (BBCH 21-39), mažiau palankiomis augimo sąlygomis ir vyraujant daugiau kaip 4 lapelių dydžio piktžolėms		
104.	Milagro 4 OD ISK BioSciences Europe N.V. 0270H/12, 2019-12-31	Nikosulfuronas 40 g/l	0,75	Kukurūzai	Kai kurios vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai kukurūzai turi 3- 4 lapelius, o vienametės dviskiltės ir vienaskiltės piktžolės turi 2–6 lapelius	1	<p>Herbicidas klasifikuojamas: Dirginantis. Aplinkai pavojingas. Dirgina odą. Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mėvėti tinkamas pirštines. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra nikosulfurono dažniau kaip kartą per trejus metus. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti lengvos mechaninės sudėties dirvožemiuose.</p>

								<p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną apželdintą daugiamečiais augalais / daugiametėmis žolėmis iki paviršinio vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 5 l.</p>
105.	<p>Milagro extra 6 OD ISK BioSciences Europe N.V. 0440H/12, 2019-12-31</p>	<p>Nikosulfuronas 60 g/l</p>	0,5	Kukurūzai	<p>Vienametės ir kai kurias daugiametės vienaskiltės ir vienametės dviskiltės</p>	<p>Purkšti, kai kukurūzai turi 3- 4 lapelius, o dviskiltės ir vienametės vienaskiltės piktžolės turi 2–6 lapelius, varputis 4–6 lapelius arba yra 15–25 cm aukščio</p>	1	<p>Herbicidas klasifikuojamas: Kenksmingas. Aplinkai pavojingas. Kenksmingas įkvėpus. Dirgina akis. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos</p>

								<p>duomenų lapais).</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra nikosulfurono dažniau kaip kartą per trejus metus.</p> <p>Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti lengvos mechaninės sudėties dirvožemiuose.</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną apželdintą daugiamečiais augalais / daugiametėmis žolėmis iki paviršinio vandens telkinių.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Pakuotė: 5 l.</p>
106.	Mustang Dow AgroSciences Danmark A/S, 0212H/06, 2016-06-22	Florasulamas + 2,4-D 2- etiloheksilo esteris 6,25 + 452,5 g/l	0,4-0,6	Žieminiai kviečiai	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius, o žieminiai kviečiai - 2 lapelius, iki kol susiformuoja antras bamblys. Didesniąją normą naudoti, kai pasėlyje želia raudonžiedė notrelė, dirvinė usnis.	1	Herbicido forma: koncentruota suspe Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Kenksmingas prarijus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
			0,4-0,6	Vasariniai kviečiai, miežiai	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius, o javai - 2 lapelius, iki kol susiformuoja antras bamblys. Didesniąją normą naudoti, kai pasėlyje želia	1	Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

						raudonžiedė dirvinė usnis	notrelė,		Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Pakuotė: 5 l
107.	Mustang forte Dow AgroSciences Danmark A/S, 0373H/09, 2016-06-30	Aminopiralidas + Florasulamas + 2,4-D etilheksilo esteris 10 + 5 + 180 g/l	0,8-1,0	Žieminiai kviečiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 21-32)	1	Herbicido forma: suspoemulsija. Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai.	
			0,6-0,8	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 21-32)	1	Kenksmingas prarijus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą.	

								<p>Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.</p> <p>Pakuotė: 2 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l, 210 l</p>
108.	<p>Nicogan Adama Registrations B.V. AS2-38H/2014 2019-12-31</p>	Nikosulfuronas 40 g/l	0,75	Kukurūzai	Kai kurios vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai kukurūzai yra 2-8 lapelių tarpsnio	1	<p>Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvēti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia, kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Siekiant apsaugoti požeminį</p>

								<p>vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra nikosulfurono, daugiau kaip 30 g/ha nikosulfurono per trijų auginimo sezonų laikotarpį.</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais / daugiametėmis žolėmis, iki paviršinio vandens telkinių.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l.</p>
109.	Nimbus SE BASF A/S AS2-5H/2014 2019-10-31	Metazachloras + klomazonas 250 + 33,3 g/l	2,0-3,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės dviskiltės ir vienaskiltės	Purkšti 3 dienos po sėjos (BBCH 00-09)	1	<p>Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai.</p> <p>Įtariama, kad sukelia vėžį.</p> <p>Gali sukelti alerginę odos reakciją.</p> <p>Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.</p> <p>Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.</p> <p>Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: Kreiptis į gydytoją.</p> <p>Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius.</p> <p>Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.</p> <p>Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.</p> <p>Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Talpyklą šalinti atiduodant į</p>

								<p>pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metazachloro, dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.</p>
110.	Nortron Bayer Crop Science AG 0036H/07, 2017-03-22	Etofumezatas 500 g/l	0,4	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai	Vienmetės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purškama mišinyje su Betanal Expert per 2 kartus po 0,2 l/ha, kai piktžolės yra skilčialapių stadijoje, nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo stadijos; per 2 kartus po 0,2l/ha, pirmą kartą, kai piktžolės yra iki 4 lapelių stadijos, runkeliai dviejų lapelių stadijoje, antrą - po 5-10 dienų; per 1 kartą 0,4 l/ha, kai runkeliai yra 4 lapelių stadijoje	3	

111.	Nuance 75 WG Cheminova A/S 0441H/12 2017-02-28	Tribenuron metilas 750 g/kg	0,01 + paviršiaus aktyvioji medžiaga Lip Top	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai.	Dviskiltės	Purkšti pavasarį, atsinaujinus javų vegetacijai iki paskutiniojo lapo tarpsnio (iki BBCH39)	1	Herbicido forma: vandenyje disperguojančios granules. Herbidas klasifikuojamas: Atsargiai. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra tribenuronmetilo. Gali sukelti alerginę reakciją. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šarminės reakcijos (pH > 7) dirvožemiuose. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir iki melioracijos griovių. Pakuotė: 0,1 kg, 0,25 kg, 0,5 kg
			0,0075 + paviršiaus aktyvioji medžiaga Lip Top	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Dviskiltės	Purkšti, kai javai yra 4 lapelių- matomo trečiojo šoninio ūglio (BBCH14-23) tarpsniuose	1	
112.	Nufarm MCPA Nufarm GmbH & Co KG 0064H/10, 2020-02-08	MCPA 750 g/l	1,0-1,3	Linai	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai linai „eglutės“ tarpsnyje (3-8 cm aukščio)	1	
			0,7-1,0	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo 3-4 lapelių iki pirmo bamblio pasirodymo	1	

			0,7-1,0	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo 3-4 lapelių iki pirmo bamblio pasirodymo	1	
			0,8-1,0	Javai su dobilų įsėliu	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai dobilai yra 1-2 tikrųjų lapelių, o javai krūmijimosi tarpsnyje	1	
			1,3-1,7	Pievos ir ganyklos	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purškiamos jaunos, aktyviai augančios piktžolės	1	Nešienauti ir neganyti galvijų 4 savaites po purškimo
113.	Nuflon 450 SC Belchim crop Protection NV 0430H/12 2016-07-31	Linuronas 450 g/l	1,5-2,0	Bulvės	Dviskiltės piktžolės	Purkšti piktžolėms sudygus, kai jos yra skilčialapių tarpsnyje iki bulvių sudygimo	1	Herbidas klasifikuojamas: Pavojingas. Kenksmingas prarijus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Įtariama, kad sukelia vėžį. Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui. Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinais. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Neįkvėpti rūko / garų / aerozolių. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Esant poveikiui arba jei numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų
			1,0-1,5	Žirniai, pupos, pastarnokai, šakninės petražolės	Dviskiltės piktžolės	Purkšti piktžolėms sudygus, kai jos yra skilčialapių tarpsnyje prieš 3 dienas iki žirnių, pupų, pastarnokų, šakninių petražolių sudygimo	1	
			1,0-1,5	Morkos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti prieš piktžolių ir morkų sudygimą arba po sudygimo – kai sudygsta piktžolės, o morkos turi 2-3 tikruosius lapelius	1	

								apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro apsaugos zoną iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. Pakuotė: 1 l, 5 l.
114.	Optica Trio Nufarm GmbH & Co KG 0197H/11 2021-02-14	Mekopropas-P + dichlorpropas-P + MCPA 130+310+160 g/l	1,5-2,5	Žieminiai kviečiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki bambulėjimo pradžios (BBCH 21-30)	1	Herbicidas klasifikuojamas: Pavojingas. Kenksmingas prarijus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Smarkiai pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į
			1,5-2,5	Vasariniai miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo antro lapo pasirodymo tarpsnio iki bambulėjimo pradžios (BBCH 12-30)	1	

								<p>gydytoją. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Pakuotė: 10 l.</p>
115.	Ouragan with system 4 Syngenta Ltd., 0244H/06, 2016-03-04	Glifosatas 360 g/l	3,0	Laukai, skirti žemės ūkio augalų sėjai ar sodinimui	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo.	1	
			5,0	Laukai, skirti žemės ūkio augalų sėjai ar sodinimui	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo.	1	
			4,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	

					vienaskiltės			
			5,0	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	
			3,0	Žieminiai kviečiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniams žieminių kviečių pasėliams
			4,0	Žieminiai kviečiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%	1	
			3,0	Bulvės	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 2–3 dienos iki bulvių sudygimo	1	
			4,0	Bulvės	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2–3 dienos iki bulvių sudygimo	1	
			2,0	Grikliai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama iki grikių sėjos	1	
			3,0	Grikliai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama iki grikių sėjos	1	
			3,0	Pūdymai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų

					vienaskiltės			
			5,0	Pūdymai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	
116.	Quick 5% EC Sharda Europe b.v.b.a. 0464H/13 2020-11-30	Kvizalofop-P-etilas 50 g/l	1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės vienaskiltės	Purkšti, kai piktžolės yra dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsnių (BBCH 12–29)	1	Herbicidas klasifikuojamas: Pavojingas. Gali dirginti kvėpavimo takus. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Smarkiai pažeidžia akis. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Neskatinti vėmimo. Įkvėpus: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir
			2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Paprastieji varpučiai	Purkšti, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio	1	

								<p>padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti užrakintą.</p> <p>Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Pakuotė: 5 l.</p>	
117.	Pantera 40 EC Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Ltd, AS2-18H/2014 2020-11-30	Kvizalofop-P- tefurilas 40 g/l	0,6	Žieminiai rapsai	Javų pabiros	Purkšti, kai javų pabiros yra 2-5 lapelių tarpsnio	1	<p>Herbicidas klasifikuojamas: Pavojingas.</p> <p>Smarkiai pažeidžia akis. Gali sukelti alerginę odos reakciją.</p> <p>Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui.</p> <p>Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus.</p> <p>Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.</p> <p>Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.</p> <p>Mūvėti apsaugines pirštines /</p>	
			1,0	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai, žieminiai ir vasariniai rapsai, linai, bulvės, pupos, žirniai, morkos	Vienmetės vienskiltės (tuščiosios avižos, paprastosios rietmenės, tikrosios soros)		Purkšti, kai piktžolės yra nuo 2 lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos		1
			1,0–1,5	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai, žieminiai ir vasariniai rapsai, linai, bulvės, pupos, žirniai,	Varpučiai		Purkšti, kai varpučiai yra 4–6 lapelių tarpsnio iki stiebo augimo pradžios (mažiausiai 10-15 cm aukščio)		1

				morkos				dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Neskatinti vėmimo. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aukšteį, pagal nacionalinių teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.
			1,75	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai, žieminiai ir vasariniai rapsai, linai, bulvės, pupos, žirniai, morkos	Varpučiai, kai jų >50 vnt./m ²	Purkšti, kai varpučiai yra nuo 4 lapelių tarpsnio, kol pirmas bamblys pakyla daugiau kaip 1 cm	1	
118.	Powertwin 400 SC Adama Registrations B.V. 0348H/08 2018-02-20	Fenmedifamas + etofumezatas 200+200 g/l	4,5-5,0	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, raudonieji burokėliai	Dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Kai purškama per 3 kartus, naudojama po 1,5 – 1,65 l/ha: pirmą kartą – kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnio	3	Herbicido forma: koncentruota suspensija Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Gali sukelti alerginę odos reakciją.

<p>(nepriklausomai nuo runkelių ar burokėlių augimo tarpsnio); antrą kartą - praėjus 5-10 dienų po pirmojo purškimo, trečią - 5-10 dienų po antrojo purškimo. Kai purškiama per 2 kartus, naudojama po 2,0 - 2,5 l/ha: pirmą kartą - runkeliams turint 2 tikruosius lapelius (kai piktžolės turi ne daugiau kaip 2 lapelius); antrą kartą - sudygus naujoms piktžolėms (praėjus 5-10 dienų po pirmojo purškimo). Kai purškiama tik 1 kartą, naudojama 4,5 – 5,0 l/ha herbicido runkeliams ar burokėliams turint 4 tikruosius lapelius (kai piktžolės turi 2 ir daugiau lapelių).</p>	<p>Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti <i>Powertwin 500 SC</i> ar kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra etofomezato, daugiau kaip 1,0 kg/ha etofomezato per sezoną arba 2,0 kg/ha per trijų auginimo sezonų laikotarpį. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pavojingas bitėms, jei naudojama 5,0 l/ha <i>Powertwin 500 SC</i>. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto augalų žydėjimo metu. Pakuotė: 1 l, 5 l</p>
--	---

119.	Primus Dow AgroSciences Denmark A/S, 0198H/06, 2016-01-19	Florasulamas 50 g/l	0,075-0,1	Žieminiai kviečiai, rugiai	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Pasėliai purškiami krūmijimosi – bamblių tarpsnyje	1	
			0,075	Vasariniai kviečiai, miežiai	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Pasėliai purškiami nuo 3 lapelio iki bamblių pabaigos	1	
			0,1	Varpinės žolės, taip pat auginamos sėklai	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Pasėliai purškiami prasidėjus vegetacijai iki bamblių pabaigos	1	
120.	Primus XL Dow AgroSciences Denmark A/S, AS2-15H/2014 2016-12-31	Florasulams + fluroksipiras 5 + 100 g/l	0,75-1,0	Vasariniai kviečiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 20– 39)	1	Herbicidas klasifikuojamas: Pavojingas. Degus skystis ir garai. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. Nerūkyti. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į
			0,75-1,0	Avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmojo bamblio tarpsnio (BBCH 20–31)	1	
			0,75-1,0	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 20– 39)	1	

								<p>gydytoją. Neskatinti vėmimo. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l.</p>
121.	Protugan super Adama Registrations B.V. 0459H/13, 2019-12-31	Izoproturonas + bifenoksas + mekopropas-P 300+150+145 g/l	2,5-3,0	Žieminiai kviečiai	Vienametės dviskiltės ir vienaskiltės	Purkšti pavasarį, iki krūmijimosi pabaigos (BBCH29)	1	Herbicido forma: koncentruota suspe Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai.
			2,5-3,0	Vasariniai kviečiai, miežiai	Vienametės dviskiltės ir vienaskiltės	Purkšti, kai javai yra nuo trečiojo lapo iki krūmijimosi pabaigos (BBCH13-29)	1	Sukelia smarkų akių dirginimą. Įtariama, kad sukelia vėžį. Labai toksiškas vandens organizm ilgalaikius pakitimus. Prieš naudojimą gauti specialias instr Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti drabužius ir naudoti akių (veid priemones. Esant poveikiui arba jeigu numano Kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreipti Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius te reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugo jo pakuote (neplauti purškimo įr paviršinio vandens telkinių / veng drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

								<p>Siekiant apsaugoti vandens organiai išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną vandens telkinių ir 1 metro – ikriovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis vandens telkinių yra didesnis nei 2, išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną daugiamečiais augalais.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti apsaugos zoną iki ne žemės ūkio pasiekiamos zonos.</p> <p>Siekiant apsaugoti grunto vandens sunkiuose moliuose dirvožemiuose užmirkinti.</p> <p>Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l</p>
122.	Puma universal Bayer Crop Science AG AS2-40H/2014 2019-12-31	Fenoksaprop-P- etilas 69 g/l	1,0-1,2 l/ha	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai	Vienmetės vienaskiltės (ypač dirvinės smilguolės, tuščiosios avižos, peliniai pašiaušėliai)	Purškiama kai javai yra trijų lapelių-antrojo bamblio tarpsniuose (BBCH 13-32), o piktžolės yra dviejų lapelių-krūmijimosi tarpsniuose	1	<p>Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai.</p> <p>Gali sukelti alerginę odos reakciją. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.</p>
			0,8-1,0	Žieminiai miežiai	Vienmetės vienaskiltės (ypač dirvinės smilguolės, tuščiosios avižos, peliniai pašiaušėliai)	Purškiama kai javai yra trijų lapelių iki bamblėjimo pradžios (BBCH 13-30), o piktžolės yra dviejų lapelių- krūmijimosi tarpsniuose	1	<p>Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.</p> <p>Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.</p>
			0,8-1,0	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai	Vienmetės vienaskiltės (ypač dirvinės smilguolės, tuščiosios avižos, peliniai pašiaušėliai)	Purškiama kai javai yra trijų lapelių-antrojo bamblio tarpsniuose (BBCH 13-32), o piktžolės yra dviejų lapelių-krūmijimosi tarpsniuose	1	<p>Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų</p>

								apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 5 l, 15 l.
123.	Python Dow AgroSciences Denmark A/S AS2-25H/2014 2017-07-31	Florasulamas 16,7 g/l + mezotrionas 267 g/l	0,3	Kukurūzai	Vienametės dviskiltės piktžolės	Purškama, kai pasirodo pirmasis lapas iki šeštojo lapo tarpsnio (BBCH 10-16) arba po 0,15 l/ha pirmą kartą, kai pasirodo pirmasis lapas iki antrojo lapo tarpsnio (BBCH 10-12), antrą kartą – kai išsiskleidžia penktas lapas iki šeštojo lapo tarpsnio (BBCH 15-16)	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1,0 l, 2,0 l, 3,0 l, 5,0 l.
124.	Ranger Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0234H/06,	Glifosatas 360 g/l	3,0	Varpiniai javai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose javų pasėliuose

2016-02-09	3,0	Žirniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	Nenaudoti sėkliniuose žirnių pasėliuose
	4,0	Žirniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	
	3,0	Linai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose linų pasėliuose
	4,0	Linai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
	3,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose rapsų pasėliuose
	4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
	2,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
	4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	

			2,0	Pūdymai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			4,0	Pūdymai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			2,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
			4,0	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	
121	Ranger XL Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-33H/2014 2016-12-31	Glifosatas 360 g/l	3,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%, ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens
			3,0 - 4,0	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiami 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.	1	
			3,0 - 4,0	Linai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.	1	
			3,0–4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.	1	

			2,0–4,0	Pūdymai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias . Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltes, didesnė – daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.	1	organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 20 l.
			2,0–4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias . Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltes, didesnė – daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.	1	
			2,0–4,0	Vaismedžių (obelų, kriaušių, vyšnių) pomedžiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles,apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltes, didesnė – daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nenaudoti 1–2 metų vaismedžių sodų pomedžiams	1	
122.	Rodeo Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0184H/06, 2016-02-09	Glifosatas 360 g/l	3,0	Varpiniai javai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose javų pasėliuose
			3,0	Žirniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	Nenaudoti sėkliniuose žirnių pasėliuose

					vienaskiltės			
			4,0	Žirniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	
			3,0	Linai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose linų pasėliuose
			4,0	Linai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
			3,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose rapsų pasėliuose
			4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
			2,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			2,0	Pūdymai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	

					vienaskiltės			
			4,0	Pūdymai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			2,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
			4,0	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	
123.	Rodeo XL Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-31H/2014 2016-12-31	Glifosatas 360 g/l	3,0 l/ha	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Talpyklą šalinti pagal
			3,0 - 4,0	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.	1	
			3,0 - 4,0	Linai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.	1	
			3,0–4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės	Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė	1	

					vienaskiltės ir dviskiltės	nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose		nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybu ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 20 l.
			2,0–4,0	Pūdymai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias . Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltės, didesnė – daugiabetes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	1	
			2,0–4,0	Laukams po derliaus nuėmimo	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias . Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltės, didesnė – daugiabetes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.	1	
			2,0–4,0	Vaismedžių (obelių, kriaušiu, vyšnių) pomedžiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles,apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltės, didesnė – daugiabetes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles. Nenaudoti 1–2 metų vaismedžių sodų pomedžiams	1	
124.	Rosate 36 Albaugh UK Limited 0393H/10	Glifosatas 360 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai	Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%, ne vėliau nei iki	1	Nenaudoti sėkliniuose kviečių, miežių, avižų pasėliuose.

2020-10-22		vasariniai miežiai, avižos	išplitusios daugiametės vienaskiltės	derliaus nuėmimo likus 10 dienų		
	4,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, avižos	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės			
	3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 14 dienų	1	Nenaudoti sėkliniuose rapsų pasėliuose
	3,0-4,0	Garstyčios	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė garstyčių sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 10 dienų	1	Nenaudoti sėkliniuose garstyčių pasėliuose
	3,0-4,0	Žirniai, lauko pupos	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai grūdų drėgmė yra mažesnė nei 30% ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 10 dienų	1	Nenaudoti sėklinių žirnių ar pupų pasėliuose
	3,0-4,0	Linai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 14 dienų	1	Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose
	3,0-4,0	Ražienos, laukai prieš sėją ar sodinimą, išskyrus sodus	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
	3,0	Plotai žalienoms atsėti, augalams sodinti arba sėti	Trumpos sėjomainos svidrės, vienametės piktžolės	Purkšti vegetuojančias piktžoles, žalienas	1	
	4,0		2-4 metų žalienos, kuriose vyrauja daugiametės vienaskiltės			
	5,0		4-7 metų			

					žalios, kuriose vyrauja daugiametės dviskiltės			
			6,0		Ilgalaikės ganyklos			
			4,0	Plotai, kuriuose bus sodinami sodai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės ariamoje žemėje	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	Nesodinti medelių 7 dienas po purškimo
			5,0		Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės pievose arba ganyklose	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	
			5,0	Obelių, kriaušių, slyvų, vyšnių sodai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, šaknų atžalos	Purkšti, kai vaismedžiai (obelys, kriaušės) numeta lapus rudenį arba pavasarį iki žaliojo pumpuro tarpsnio arba iki vyšnių, slyvų baltojo pumpuro tarpsnio piktžolių vegetacijos metu	1	Nenaudoti jaunesniuose nei 2 metų soduose
125.	Roundup Bio Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0173/06, 2016-02-09	Glifosatas 360 g/l	3,0	Varpiniai javai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose javų pasėliuose
			3,0	Žirniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	Nenaudoti sėkliniuose žirnių pasėliuose
			4,0	Žirniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	
			3,0	Linai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose linų pasėliuose

					vienaskiltės			
			4,0	Linai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
			3,0-	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose rapsų pasėliuose
			4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
			2,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			2,0	Pūdymai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			4,0	Pūdymai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			2,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos

					vienaskiltės			
			4,0	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	
126.	Roundup Bioactive Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0433H/12, 2016-12-31	Glifosatas 360 g/l	3,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0-4,0	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai paruduoja 75% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0-4,0	Linai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			2,0-4,0	Pūdymai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės, didesnė – daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės
			2,0-4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės, didesnė – daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės
			2,0-4,0	Vaismedžių (obelų, kriaušių, vyšnių) pomedžiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti 1-2 metų vaismedžių sodų pomedžiuose. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai išplitusias daugiametes

								vienaskiltės, didesnė – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės
127.	Roundup Classic Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0013H/06, 2016-02-09	Glifosatas 360 g/l	3,0	Varpiniai javai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose javų pasėliuose
			3,0	Žirniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	Nenaudoti sėkliniuose žirnių pasėliuose
			4,0	Žirniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	
			3,0	Linai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose linų pasėliuose
			4,0	Linai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
			3,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose rapsų pasėliuose
			4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
			2,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	

			4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			2,0	Pūdymai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			4,0	Pūdymai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			2,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
			4,0	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	
128.	Roundup Classic XL Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-32H/2014 2016-12-31	Glifosatas 360 g/l	3,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	1	Herbidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų
			3,0 - 4,0	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	1	
			3,0 - 4,0	Linai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	1	

			3,0–4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	1	apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybu ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 15 l.
			2,0–4,0	Pūdymai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias . Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltes, didesnė – daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.	1	
			2,0–4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias . Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltes, didesnė – daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.	1	
			2,0–4,0	Vaismedžių (obelų, kriaušių, vyšnių) pomedžiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles,apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltes, didesnė – daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nenaudoti 1–2 metų vaismedžių sodų pomedžiams	1	
129.	Roundup Flex	Glifosatas 480 g/l	2,25-3,0	Žieminiai ir	Vienametės ir	Purkšti, kai grūdų drėgmė	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose

	Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0423H/12, 2016-12-31			vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai	daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienių prieš pjūtį		
			2,25-3,0	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai paruduoja 75% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			2,25-3,0	Linai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienių prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			2,25-3,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienių prieš pjūtį		Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			2,25-3,75	Pūdymai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienių.
			2,25-3,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienių.
			2,25-3,75	Vaismedžių pomedžiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti 1-2 metų vaismedžių sodų pomedžiuose
130.	Roundup Ace Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0245H/06, 2016-02-09	Glifosatas 450 g/l	2,4	Varpiniai javai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose javų pasėliuose
			2,4	Žirniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	Nenaudoti sėkliniuose žirnių pasėliuose
			3,2	Žirniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	
			2,4	Linai	Vienmetės vienaskiltės ir	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai	1	Nenaudoti sėkliniuose linų pasėliuose

					dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%		
		3,2	Linai		Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
		2,4	Žieminiai ir vasariniai rapsai		Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose rapsų pasėliuose
		3,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai		Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
		1,6	Laukai po derliaus nuėmimo		Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, javų pabiros, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
		3,2	Laukai po derliaus nuėmimo		Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo	1	
		1,6	Pūdymai		Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
		3,2	Pūdymai		Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	
		1,6	Vaismedžių pomedžiai		Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos

					vienaskiltės			
			3,2	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	
123.	Roundup ACE ST Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-29H/2014 2016-12-31	Glifosatas 450 g/l	2,4	Varpiniai javai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 20 l.
			2,4–3,2	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių. .Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės, didesnė – daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	1	
			2,4–3,2	Linai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	1	
			2,4–3,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.	1	
			1,6–3,2	Pūdymai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškšti vegetuojančias piktžoles . Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai	1	

						išplitusias daugiameses vienaskiltės, didesnė – daugiameses vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.		
			1,6–3,2	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškšti vegetuojančias piktžolės. Mažesnė norma naikina vienametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltės, didesnė – daugiameses vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.	1	
			1,6–3,2	Vaismedžių (obelų, kriaušių, vyšnių) pomedžiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškšti vegetuojančias piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis. Mažesnė norma naikina vienametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltės, didesnė – daugiameses vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės. Nenaudoti 1–2 metų vaismedžių sodų pomedžiams	1	
131.	Roundup Gold ST Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0285H/06, 2016-02-09	Glifosatas 450 g/l	2,4	Varpiniai javai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškžiama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose javų pasėliuose
			2,4	Žirniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškžiama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	Nenaudoti sėkliniuose žirnių pasėliuose

			3,2	Žirniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	
			2,4	Linai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose linų pasėliuose
			3,2	Linai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
			2,4	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose rapsų pasėliuose
			3,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
			1,6	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, javų pabiros, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
			3,2	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo	1	
			1,6	Pūdymai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
			3,2	Pūdymai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	

			1,6	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
			3,2	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	
132.	Roundup FL 360 Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0284H/06, 2016-02-09	Glifosatas 360 g/l	3,0	Varpiniai javai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose javų pasėliuose
			3,0	Žirniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	Nenaudoti sėkliniuose žirnių pasėliuose
			4,0	Žirniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	
			3,0	Linai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose linų pasėliuose
			4,0	Linai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
			3,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose rapsų pasėliuose
			4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Daugiametės vienaskiltės ir	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai	1	

					dviskiltės	rapšų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%		
			2,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			2,0	Pūdymai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1	
			2,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
			4,0	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	
133.	Roundup FL 540 Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0289H/06, 2016-03-04	Glifosatas 540 g/l	2,0	Varpiniai javai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose javų pasėliuose
			2,0	Žirniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	Nenaudoti sėkliniuose žirnių pasėliuose
			2,7	Žirniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	
			2,0	Linai	Vienmetės vienaskiltės ir	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai	1	Nenaudoti sėkliniuose linų pasėliuose

					dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%		
		2,7	Linai		Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
		2,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai		Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose rapsų pasėliuose
		2,7	Žieminiai ir vasariniai rapsai		Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
		1,3	Pūdymai		Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
		2,7	Pūdymai		Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	
		1,3	Laukai po derliaus nuėmimo		Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, javų pabiros, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
		2,7	Laukai po derliaus nuėmimo		Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo	1	
		1,3	Vaismedžių pomedžiai		Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos

					vienaskiltės			
			2,7	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	
134.	Roundup Max Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0381H/10, 2020-03-04	Glifosatas 680 g/kg	1,6	Varpiniai javai, išskyrus žieminius rugius	Daugiametės ir vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%	1	Purkšti ne vėliau kaip 10-14 d. prieš derliaus nuėmimą. Nepurkšti sėklinių javų plotų
			1,6	Pūdymai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 d.
			2,1	Pūdymai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 d.
			1,6	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 d.
			2,1	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 d.
135.	Samson 4 OD ISK BioSciences Europe N.V. 0446H/12 2019-12-31	Nikosulfuronas 40 g/l	0,75	Kukurūzai	Kai kurios vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai kukurūzai turi 3-4 lapelius, o vienametės dviskiltės ir vienaskiltės piktžolės turi 2-6 lapelius	1	
136.	Samson 6 OD ISK BioSciences Europe N.V. 0444H/12 2019-12-31	Nikosulfuronas 60 g/l	0,5	Kukurūzai	Vienametės ir kai kurios daugiametės vienaskiltės ir vienametės dviskiltės	Purkšti, kai kukurūzai turi 3-4 lapelius, vienametės dviskiltės ir vienaskiltės piktžolės turi 2-6 lapelius, o varputis 4-6 lapelius arba yra 15-25 cm aukščio	1	
137.	Saracen Cheminova A/S AS2-45H/2014	Florasulamas 50 g/l	0,075	Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai	Vienametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi metu (BBCH 20-29)	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Labai toksiškas vandens

	2016-12-31		0,1	Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai	Vienametės dviskiltės	Purkšti bamblėjimo metu (BBCH 30-39)	1	<p>organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.</p> <p>Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Pakuotė: 0,5 l.</p>
			0,075	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Vienametės dviskiltės	Purkšti dviejų lapelių - krūmijimosi metu (BBCH 12-29)		
			0,1	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Vienametės dviskiltės	Purkšti bamblėjimo metu (BBCH 30-39)		
			0,075	Sėklinės varpinės žolės	Vienametės dviskiltės	Purkšti dviejų lapelių - krūmijimosi metu (BBCH 12-29)		
			0,15	Sėklinės varpinės žolės	Vienametės dviskiltės	Purkšti bamblėjimo metu (BBCH 30-39)		
			0,075	Ganyklos	Vienametės dviskiltės	Purkšti dviejų lapelių - krūmijimosi metu (BBCH 12-29)		
			0,15	Ganyklos	Vienametės dviskiltės	Purkšti bamblėjimo metu (BBCH 30-39)		
			0,15	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai	Dviskiltės	Pasėliai purškiami javų vegetacijos metu nuo trečiojo lapo tarpsnio iki paskutiniojo lapo		

			0,1-0,15	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai	Dviskiltės	pasirodymo (BBCH 13-37) Pasėliai purškiami javų vegetacijos metu nuo trečiojo lapo tarpsnio iki paskutiniojo lapo pasirodymo (BBCH 13-37)	1	<p>Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.</p> <p>Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.</p> <p>Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.</p> <p>Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.</p> <p>Jeigu sudirginama oda arba ją išberia, kreiptis į gydytoją.</p> <p>Jeigu akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.</p> <p>Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.</p> <p>Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.</p> <p>Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.</p> <p>Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Pakuotė: 1 l, 5 l</p>
--	--	--	----------	---	------------	--	---	--

139.	Symbol United Phosphorus Ltd. 0407H/11 2016-02-09	Glifosatas 360 g/l	3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc	1	Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo 10 dienų.
			2,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles po derliaus nuėmimo	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
			4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles po derliaus nuėmimo	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
			2,0	Pūdymai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles po derliaus nuėmimo	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
			4,0	Pūdymai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles po derliaus nuėmimo	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
			2,0	Obelių ir kriaušių pomedžiai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis po derliaus nuėmimo, arba pavasarį prieš žiedynų pasirodymą	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
			4,0	Obelių ir kriaušių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis po derliaus nuėmimo, arba pavasarį prieš žiedynų pasirodymą	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
			2,0	Vyšnių ir slyvų pomedžiai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės	Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vyšnių ir slyvų dalis po derliaus nuėmimo, arba pavasarį prieš butonų	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos

			4,0	Vyšnių ir slyvų pomedžiai	vienaskiltės Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	pabalimą Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vyšnių ir slyvų dalis po derliaus nuėmimo, arba pavasarį prieš butonų pabalimą	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
140.	Starane XL Dow AgroSciences Denmark A/S, 0323H/07, 2015-12-31	Fluroksipiras + florasulamas 100 + 2,5 g/l	1,0-1,2	Žieminiai rugiai, kviečiai, miežiai, kvietrugiai ir žieminiai javai su varpinių žolių įsėliu	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi – stiebo augimo metu (BBCH 20-39)	1	Herbicido forma: koncentruota emulsija Herbidas klasifikuojamas: Atsargiai. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
			0,8-1,0	Vasariniai miežiai, kviečiai, kvietrugiai ir vasariniai javai su varpinių žolių įsėliu	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi – stiebo augimo metu (BBCH 20-39)	1	
			1,5-1,8	Varpinės žolės, ganyklos ir silosui skirtos žolės	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi – stiebo augimo metu (BBCH 20-39)	1	

								Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Pakuotė: 5 l
141.	Starane 180 Dow AgroSciences Denmark A/S, 0143H/04, 2015-12-31	Fluroksipiras 180 g/l	0,6 0,4	Žieminiai kviečiai Vasariniai miežiai	Vienmetės dviskiltės (ypač kibiejai lipikai) o taip pat daugiametės šakniaatžalinės	Purškiama, kai piktžolės aktyviai auga	1	
			1,5-2,0	Kultūrinės pievos ir ganyklos	Rūgštinės, dilgėlės, kiaulpienės, trikertės žvaginės, dirvinės nemiršėlės, daržinės žliūgės, gysločiai, vėdrynai	Purškiama, kai piktžolės aktyviai auga	1	
142.	Stomp BASF A/S, 0012H/08, 2018-06-02	Pendimetalinas 330 g/l	3,0-5,0	Svogūnai, česnakai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Sėjant iš sėklų - purškiama tuoj po sėjos prieš sudygimą, sodinant ropelėmis – prieš ropelių išsodinimą	1	
			4,0	Porai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama tuoj po sėjos – prieš sudygimą	1	
			4,0	Šakninės petražolės, morkos	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama prieš morkų ir petražolių sudygimą	1	
			3,0-5,0	Kopūstai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama prieš kopūstų daigų išsodinimą	1	

			4,0	Kukurūzai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti po kukurūzų sėjos iki 4 lapelių tarpsnio (BBCH 14)	1	
			4,0-5,0	Žieminiai kviečiai, rugiai, miežiai, kvietrugiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti javams turint 1-3 lapelius ir ne vėliau, kaip piktžolėms turint 2 lapelius	1	
			2,0	Dobilų/liucernos/v arpinių žolių pasėliai ir jų įsėliai vasariniuose kviečiuose arba vasariniuose miežiuose	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai ankštinės žolės ką tik sudygusios mišiniuose su 1,0-2,0 l/ha Basagran 480	1	
			2,0	Vasariniai kviečiai arba vasariniai miežiai su raudonųjų dobilų įsėliais	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai dobilai turi 1-2 lapelius mišiniuose su 2,0 l/ha Basagran 480	1	
			2,0	Vasariniai kviečiai arba vasariniai miežiai su liucernos/baltųjų dobilų įsėliais	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai liucerna ar dobilai turi 1-2 lapelius mišiniuose su 1,0- 2,0 l/ha Basagran 480		
			4,0	Žirniai ir žirnių-javų mišiniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti prieš žirnių ir mišinių sudygimą	1	
			4,0	Pupos	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti prieš pupų sudygimą	1	
			2,0	Raudonieji, baltieji dobilai ir liucerna sėklai sėjos metais	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama anksti pavasarį, kai piktžolės turi 1-2 lapelius mišiniuose su 1,0 - 2,0 l/ha Basagran 480	1	
			4,0-6,0	Bulvės	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama iki sudygimo, po paskutinio kaupimo-akėjimo	1	
143.	Stomp CS BASF A/S, 0443H/12, 2017-07-31	Pendimetalinas 455 g/l	2,9	Kukurūzai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti po kukurūzų sėjos, iki 4 lapelių tarpsnio (BBCH 14)	1	
			2,9	Žirniai ir žirnių-javų mišiniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti tuoj po sėjos, prieš žirnių ir žirnių-javų sudygimą	1	

2,9	Pupos	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti tuoj po sėjos, prieš pupų sudygimą	1
0,88	Vasariniai kviečiai, miežiai su dobilų, liucernos arba varpinių žolių įsėliais	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai tik sudygsta dobilai ar liucerna mišiniuose su 1,0-2,0 l/ha Basagran 480	1
0,88	Dobilų, liucernos arba varpinių žolių pasėliai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai tik sudygsta dobilai ar liucerna mišiniuose su 1,0-2,0 l/ha Basagran 480	1
0,88	Vasariniai kviečiai, miežiai su raudonųjų dobilų įsėliais	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai dobilai turi 1-2 lapelius mišiniuose su 2,0 l/ha Basagran 480	1
0,88	Vasariniai kviečiai, miežiai su liucernos, baltųjų dobilų įsėliais	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai dobilai ar liucerna turi 1-2 lapelius mišiniuose su 1,0-2,0 l/ha Basagran 480	1
0,88	Raudonieji, baltieji dobilai, liucerna sėklai sėjos metais	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti anksti pavasarį, kai piktžolės turi 1-2 lapelius	1
2,9-4,35	Bulvės	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti po paskutinio kaupimo, akėjimo, ne vėliau kaip 7 dienos iki bulvių sudygimo	1
2,18-3,6	Svogūnai, česnakai auginami iš sėklų	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti tuoj po sėjos, prieš sudygimą	1
2,18-3,6	Svogūnai, česnakai auginami iš ropelių	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti prieš ropelių išsodinimą	1
2,9	Porai auginami iš sėklų	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti tuoj po sėjos, iki sudygimo	1
2,9	Morkos, šakninės petražolės	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti tuoj po sėjos iki sudygimo	1
2,18-3,6	Gūžiniai kopūstai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti prieš kopūstų daigų išsodinimą	1

144.	Sultan 500 SC Adama Registrations B.V. AS2-5H/2014 2020-07-31	Metazachloras 500 g/l	1,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės dviskiltės	Purškama po sėjos – iki rapsų sudygimo (BBCH 00-09)	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Įtariama, kad sukelia vėžį. Kenksmingas prarijus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Mūvēti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlyčiui: Kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą
------	---	--------------------------	-----	-----------------------------------	-------------------------	--	---	--

								<p>daugiamečiais augalais. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metazachloro dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke. Pakuotė: 5 l, 20 l.</p>
145.	Sultan super Adama Registrations B.V. 0460H/13, 2022-04-30	Metazachloras 375 g/l + kvinmerakas 125 g/l	1,75-2,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės dviskiltės ir vienaskiltės	Purkšti po sėjos-3 tikrųjų lapelių tarpsniu (BBCH 00– 13)	1	<p>Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sudėtyje yra metazachloro ir 1,2-benzizotiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Įtariama, kad sukelia vėžį. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro - iki</p>

								<p>melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metazachloro ir / ar kvinmerako dažniau kaip kartą per trejus metus.</p> <p>Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l.</p>
146.	Supero Sharda Europe b.v.b.a. AS2-10H/2015 2020-11-30	Kvizalofop-P- etilas 50 g/l	1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės vienaskiltės piktžolės	Purkšti, kai piktžolės yra dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsnio (BBCH 12–29)	1	<p>Herbicidas klasifikuojamas: Pavoingas.</p> <p>Gali dirginti kvėpavimo takus. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Smarkiai pažeidžia akis. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.</p> <p>Stengtis neįkvėpti aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti</p>
			2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Paprastieji varpučiai	Purkšti, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio	1	

								<p>kontaktinius lešius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.</p> <p>Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.</p> <p>Neskatinti vėmimo.</p> <p>Įkvėpus: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti užrakintą.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Pakuotė: 5 l</p>
147.	Taifun B Adama Registrations B.V. 0261H/06, 2016-02-09	Glifosatas 360 g/l	3,0	Pūdymai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
			6,0	Pūdymai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	
			3,0	Ražienos	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	

					daugiametės vienaskiltės			
			6,0	Ražienos	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	
			3,0	Varpiniai javai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% iki derliaus nuėmimo likus 14 d.	1	Nenaudoti sėkliniams varpinių javų ir salyklinių miežių pasėliams
			3,0-4,0	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai paruduoja 75% anksčių iki derliaus nuėmimo likus 14 d.	1	Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliams
			3,0 – 4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% iki derliaus nuėmimo likus 14 d.	1	Nenaudoti sėklinių rapsams pasėliams
			4,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiami piktžolių vegetacijos metu iki derliaus nuėmimo likus 14 d.	1	Nenaudoti 1-2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
148.	Targa super Bayer Crop Science AG 0405F/11 2021-03-30	Kvizalofopo –P- etilas 50 g/l	0,75-1,25	Žieminiai rapsai	Vienametės vienaskiltės (išskyrus vienametes migles)	Purkšti rudenį arba pavasarį, kai piktžolės yra dviejų lapelių-krūmijimosi tarpsnyje (BBCH 12-29)	1	
			0,75	Vasariniai rapsai, cukriniai ir pašariniai runkeliai, bulvės	Vienametės vienaskiltės (išskyrus vienametes migles)	Purkšti pavasarį, kai piktžolės yra dviejų lapelių-krūmijimosi tarpsnyje (BBCH 12-29)	1	
			1,5-2,0	Žieminiai rapsai	Paprastieji varpučiai	Purkšti rudenį arba pavasarį, kai paprastieji varpučiai yra 10-15 cm aukščio	1	
			1,5-2,0	Vasariniai rapsai, cukriniai ir pašariniai runkeliai, bulvės	Paprastieji varpučiai	Purkšti pavasarį, kai paprastieji varpučiai yra 10-15 cm aukščio	1	

149.	Teridox 500 EC Syngenta Crop Protection AG, AS2-21H/2014 2020-12-31	Dimetachloras 500 g/l	2,0	Žieminiai rapsai	Vienmetės dviskiltės, kai kurios vienaskiltės	Purkšti po sėjos iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00– 14)	1	<p>Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto,</p>
			2,0	Vasariniai rapsai	Vienmetės dviskiltės, kai kurios vienaskiltės	Purkšti po sėjos iki sudygimo (BBCH 00–09)	1	

								kurio sudėtyje yra dimetachloro dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke. Pakuotė: 5 l, 20 l.
150.	Titus 25 DF Du Pont Finland Ltd., 0032H/11, 2018-01-31	Rimsulfuronas 250 g/kg	0,05 + 200 ml/ha paviršiaus aktyvio- sios medžiagos Trend	Bulvės	Dviskiltės ir varpučiai	Purkšti 1 kartą 0,05 +200 ml/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos, kai dviskiltės piktžolės yra nuo skilčialapių iki 2–4 lapelių tarpsnio, varpučiai 10–15 cm aukščio arba purkšti per 2 kartus, po 0,025 kg/ha + 200 ml/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos Trend, pirmą kartą, kai dviskiltės piktžolės yra nuo skilčialapių iki 2–4 lapelių tarpsnio, antrą kartą po 7–10 dienų.		Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc. būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra veikiosios medžiagos rimsulfurono, dažniau kaip kartą per dvejus metus (purškiant 1 kartą 0,050 kg/ha norma arba per 2 kartus po
			0,05 + 200 ml/ha paviršiaus aktyvio- sios medžiagos Trend	Kukurūzai	Dviskiltės ir varpučiai	Purkšti 1 kartą 0,05 kg/ha + 200 ml/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos Trend, kai kukurūzai turi 3–4 lapelius, dviskiltės piktžolės yra nuo skilčialapių iki 2–4 lapelių tarpsnio, varpučiai 10–15 cm aukščio ne daugiau kaip 1 kartą arba purkšti per 2 kartus, po 0,025 kg/ha + 200 ml/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos Trend, pirmą kartą, kai kukurūzai turi 3–4 lapelius, dviskiltės piktžolės yra nuo skilčialapių iki 2–4 lapelių tarpsnio, antrą kartą po 7–		

						10 dienų.		0,025 kg/ha) tame pačiame lauke. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos rimsulfurono, lengvos mechaninės sudėties dirvožemiuose. Pakuotė: 100 g HDPE buteliukai, 50 g (5x10 g vandenyje tirpiuose pakeliuose, supakuoti į laminuotus maišelius)
151.	Tombo Dow Agro Sciences Denmark A/S 0359H/08 2016-06-30	Piroksulamas + florasulamas + aminopiraldas 50 +25+50 g/kg	0,15-0,2 + 0,5 l/ha Dassoil	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai	Vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai javai yra krūmijimosi- antrojo bamblio formavimosi tarpsniuose (BBCH 21-32)	1	Herbicido forma: vandenyje dispersiškios granulės. Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai.
			0,15 + 0,5 l/ha Dassoil	Vasariniai kviečiai	Vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai javai yra krūmijimosi- antrojo bamblio formavimosi tarpsniuose (BBCH 21-32)	1	Sudėtyje yra klokvintocet-meksilo ir piroksulamo. Gali sukelti alerginę reakciją. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Siekiant apsaugoti netikslinius

								augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg.
152.	Tomigan 180 Makhteshim-Agan Holland B.V., 0238H/07, 2015-12-21	Fluroksipiras 180 g/l	0,6	Žieminiai kviečiai	Vienmetės dviskiltės (ypač kibiejai lipikai), daugiametės šakniaatžalinės	Purškiama, kai piktžolės aktyviai auga	1	
			0,4	Vasariniai miežiai	Vienmetės dviskiltės (ypač kibiejai lipikai), daugiametės	Purškiama, kai piktžolės aktyviai auga	1	
			1,5-2,0	Kultūrinės pievos ir ganyklos	Rūgštinės, dielgėlės, kiaulpienės, trikertės žvaginės, dirvinės nemiršėlės, daržinės žliūgės, gysločiai, vėdrynai	Purškiama, kai piktžolės aktyviai auga	1	
153.	Tooler BASF A/S 0399H/10 2020-11-09	Tritosulfuronas 714 g/kg	50-70 g/ha	Žieminiai kviečiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki bambėjimo pabaigos (BBCH 21-39)	1	Purškiant Tooler pridėti paviršiaus aktyviosios medžiagos
			50 g/ha	Vasariniai miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai turi 3 lapelius iki bambėjimo pabaigos	1	
			50 g/ha	Vasariniai kviečiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai turi 3 lapelius iki bambėjimo pabaigos	1	
154.	Trimmer 50 SG Du Pont Finland Ltd. 0360H/08 2015-11-07	Tribenuron metilas 500 g/kg	15-22,5 g/ha	Žieminiai kviečiai, rugiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai yra nuo 2 lapelių iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 12-39), o piktžolės turi 2-4 lapelius	1	Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, nenaudoti augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra tribenuron metilas daugiau kaip 1 kartą per sezoną.
			15-22,5 g/ha	Vasariniai kviečiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai yra nuo 2 lapelių iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 12-39), o piktžolės turi 2-4 lapelius	1	
155.	Trimmer 500 WG Adama Registrations B.V.	Tribenuron metilas 500 g/kg	15-22,5 g/ha + PAM	Žieminiai ir vasariniai kviečiai,	Dviskiltės piktžolės	Purkšti pavasarį, kai javai yra nuo 2 lapelių iki	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai.

	AS2-7H/2015 2018-10-31			žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, žieminiai rugiai		paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 12-39)		<p>Sudėtyje yra tribenuronmetilo. Gali sukelti alerginę reakciją.</p> <p>Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1 l didelio tankio polietileno (DTPE) buteliai.</p>
156.	U 46D Nufarm GmbH&Co KG, 0099H/08, 2018-05-23	2,4-dichlorfenoksi acto rūgštis 500 g/l	1,5	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purškama atsinaujinus vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos	1	
			1,5	Vasariniai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Vienametės ir kai kurios daugiametės	Purkšti, kai javai yra nuo 3 lapelių iki krūmijimosi pabaigos (BBCh 13-29)	1	

					dviskiltēs		
			1,0-1,5	Kukurūzai	Vienametēs ir kai kurios daugiametēs dviskiltēs	Purkšti, kai kukurūrai išskleidžia 3-5 lapelius (BBCH 13-15)	1
			0,75-1,0	Baltieji dobilai	Vienametēs ir kai kurios daugiametēs dviskiltēs	Purkšti baltiesiems dobilams turint 2-3 lapelius	1
			2,0	Pievos ir ganyklos	Vienametēs ir kai kurios daugiametēs dviskiltēs	Purkšti kai piktžolės jaunos ir aktyviai auga	1