

INSEKTICIDAI (augalų apsaugos produktai kenkėjams naikinti)

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Augalų apsaugos produkto paskirtis	Naudojimo reglamentai			Pastabos
					preparato kiekis ml,g/10 l vandens	Karencijos laikotarpis	Didžiausias apdorojimų skaičius	
1.	Decis mega Bayer CropScience AG 0336I/07 2017-12-17	Deltametrinas 50 g/l	Žirniai, pupos	Žirniniai amarai, pupiniai amarai, žirniniai vaisėdžiai, gumbeliniai straubliukai	4 ml/10 l vandens	20	2	
			Bulvės	Kolorado vabalai	4 ml/10 l vandens	20	2	
			Gūžiniai ir žiediniai kopūstais, brokoliai, griežčiai	Baltukai, kryžmažiedės spragės, kopūstinius pelėdgalvius, amarus	4 ml/10 l vandens	14	2	
			Morkos	Morkinės musės	4 ml/10 l vandens	30	2	
			Dekoratyviniai augalai	Cikadelės, amarai	4 ml/10 l vandens		2	
			Obelys, kriaušės	Amarai, lapsukiai, obeliniai žiedgraužiai, obuoliniai vaisėdžiai, pjūkleliai	4 ml/10 l vandens	30	2	
			2.	NeemAzal T/S Trifolio M GmbH, 0240I/02, 2015-05-31	Azadirachtinas A 10 g/l	Pomidorai šiltnamiuose	Purškama prieš amarus, tripsus, baltasparnius, voratinklines erkes	Purškama 0,5% tirpalu
Agurkai paprika, dekoratyviniai	Purškama prieš amarus, tripsus, baltasparnius,	Purškama 0,5% tirpalu					3	

			augalai šiltnamiuose	voratinklines erkes				
			Kopūstai	Purškiama prieš baltukus, pelėdgalvius	Purškiama 0,5% tirpalu		3	
3.	Mavrik 2F Adama Registrations B.V. 0330I/07 2015-05-31	Tau- fluvalinatas 240 g/l	Bulvės	Naikina kolorado vabalų lervas	5 ml/10 l vandens	14	1	
			Morkos	Naikina morkines blakutes	5 ml/10 l vandens	14	2	

FUNGICIDAI (augalų apsaugos produktai augalų ligoms naikinti)

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Augalų apsaugos produkto paskirtis	Naudojimo reglamentai			Pastabos
					preparato kiekis ml,g/10 l vandens	Karencijos laikotarpis	Didžiausias apdorojimų skaičius	
1.	Champion 50 WP Nufarm UK Limited, 0262F/04, 2015-05-31	Vario hidroksidas 77% (500 g/kg vario)	Obelys	Purškiama prieš rauples. Ankstyvasis sodų purškimas iki vegetacijos pradžios prieš pumpurų brinkimą.	50 g preparato 10 l vandens (0,5% tirpalu)	7	1	
			Bulvės	Purškiama prieš bulvių marą, sausligę	63 g preparato 10 l vandens (1 arui bulvių nupurkšti reikia 25 g preparato, 4 l tirpalo)	7	4	

2.	Gloria Bayer CropScience AG , 0290F/06, 2016-03-25	Fenamidonas+ propamokarbo hidrochloridas 75 + 375 g/l	Bulvės	Purškiamos vegetacijos metu, kai susidaro palankios sąlygos marui, sausligei plisti, bet ne vėliau kaip pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams	20 ml/a	7	3	Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sudėtyje yra propamokarbo hidrochlorido ir 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 3 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos fenamidono, dažniau kaip kas dvejus metus tame pačiame lauke. Pakuotė: 40 ml, 100ml, 200 ml
3.	Infinito Bayer Crop Science AG 0337F/12,	Propamokarbo hidrochloridas + fluopikolidas 625 + 62,5 g/l	Bulvės	Purškiamas vegetacijos metu nuo maro	30-40 ml/10 l vandens, ir nupurkšti 250 m ²	7	2	Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Gali sukelti alerginę odos reakciją.

	2021-05-31		Svogūnai	Purškiama vegetacijos metu nuo netikrosios miltligės	30 ml/10 l vandens ir nupurkšti 200 m ²	7	1	<p>Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.</p> <p>Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.</p> <p>Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.</p> <p>Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti produkto rūgščiuose dirvožemiuose.</p> <p>Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, naudoti produktą pagal nurodytus naudojimo reglamentus ne dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke.</p> <p>Pakuotė: 30 ml, 50 ml, 100 ml, 300 ml, 500 ml</p>
			Agurkai, auginami šiltnamiuose	Purškiama vegetacijos metu nuo netikrosios miltligės 0,14% tirpalo	14 ml/ 10 l vandens	3	2	
			Gūžiniai, žiediniai, Briuselio kopūstai, brokoliai	Purškiama vegetacijos metu nuo netikrosios miltligės	30 ml/10 l vandens ir nupurkšti 200 m ²	14	1	
			Porai	Purškiama vegetacijos metu nuo netikrosios miltligės	30 ml/10 l vandens ir nupurkšti 170 m ²	14	1	
4.	Previcur 607 SL	Propamokarbas 607 g/l	Kompostas ir kiti substratai	Dezinfekcija prieš pašaknio ir šaknų puvinį	300-400 ml preparato 20 l vandens 1 m ³ substrato			

Bayer Crop Science atstovybė Baltijos šalims, 0065F/06, 2016-03-25	Agurkų, pomidorų ir kopūstų daigai	Laistoma 0,15% tirpalu prieš pašaknio ir šaknų puvinius			
	Auginiai	Mirkoma 0,15 % tirpale 15–20 minučių prieš pašaknio ir šaknų puvinius			
	Gėlių svogūneliai	Mirkoma 0,3 % tirpale 15–20 minučių prieš pašaknio ir šaknų puvinius			
	Spygliuočių ir lapuočių medžių sodmenys	Laistoma 0,15–0,3 % tirpalu prieš infekcinį nykimą			
	Agurkai šiltnamiuose	Purškama prieš netikrąją miltligę 0,25% tirpalu		3	3
	Agurkai lauke	Purškama prieš netikrąją miltligę	20-40 ml 1 arui (išpurškiant 810 litrų tirpalo 1 arui)	5	3
	Pomidorai šiltnamiuose	Purškama prieš marą 0,25% tirpalu		5	2
	Dekoratyviniai augalai	Laistoma 0,15-0,3% tirpalu nuo pašaknio ir šaknų puvinų			
	Dekoratyviniai augalai	Purškama pasirodžius pirmiesiems netikrosios miltligės požymiams 0,15% tirpalu			3

5.	Previcur Energy Bayer CropScience AG 0356F/08 2018-10-17	Propamokarbas 530 g/l + fosetilas 310 g/l	Substratas daržovių, dekoratyvinių augalų auginimui	Naudojamas 1,25 % (2,5 ml/200 ml vandens) tirpalas. Saugo nuo šaknų puvinio (Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phoma spp., Phytophthora spp., Alternaria spp)			1	Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia:	
			Agurkų, pomidorų, paprikos, gūžinių ir žiedinių kopūstų, brokolių, briuselinių kopūstų, salotų daigai	Laistoma 0,15% tirpalu. Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinio sukėlėjų (Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.)	15 ml/10 l vandens ir palaistyti 5 m ²			2	Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodų ar nuo kelių).
			Dekoratyviniai augalai	Laistoma 0,2% tirpalu. Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinio sukėlėjų (Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.)	20ml/10 l vandens ir palaistyti 5 m ²			2	Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Pakuotė: 15 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml
			Dekoratyviniai augalai	Saugo nuo netikrosios miltligės (Peronospora spp., Bremia spp.)	25 ml/100 m ²			2	
6.	Revus 250 SC Syngenta Crop Protection AG 0345F/08 2015-12-31	Mandipropamidas 250 g/l	Bulvės	Saugo bulves nuo maro	6 ml/a	3	3		
			Pomidorai auginami lauke ir šiltnamiuose	Saugos pomidorus nuo maro	6 ml/a	3	3		

7.	Score 250 EC (A7402T) Syngenta Crop Protection AG, 0047F/13 2019-12-31	Difenkonazolas 250 g/l	Obelys, kriaušės	Purškiama prieš rauples, miltligę apsaugos iš dalies	2 (0,02 proc. tirpalo koncentracija)	21	2	
			Slyvos, vyšnios	Moniliozė	2 (0,02 proc. tirpalo koncentracija)	14	2	
8.	Topas 100 EC (A6209G) Syngenta Polska Sp.zo.o., AS2-20F/2015 2020-12-31	Penkonazolas 100 g/l	Agurkai, arbūzai, cukinijos, melionai, moliūgai lauke	Purškiama prieš miltligę	5 ml	3	1	Fungicido forma: koncentruota emulsija. Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuokelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Pakuotė: 5 ml, 10 ml, 100 ml.
			Agurkai, arbūzai, cukinijos, melionai, moliūgai šiltnamiuose	Purškiama prieš miltligę	5 ml	3	2	
			Pomidorai lauke ir šiltnamiuose	Purškiama prieš miltligę	5 ml	3	1	
			Juodieji, raudonieji serbentai, agrastai	Purškiama prieš tamsiąją miltligę	5 ml	20	1	
			Vynuogės	Purškiama prieš miltligę	3 ml	28	1	
			Dekoratyviniai augalai lauke ir šiltnamiuose	Purškiama prieš miltligę	5 ml	-	1	

			Dekoratyviniai augalai	Purškama prieš miltligę ligai pasireiškus	5 (0,05%)		2	
--	--	--	------------------------	-------------------------------------------	-----------	--	---	--

HERBICIDAI (augalų apsaugos produktai piktžolėms naikinti)

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Augalų apsaugos produkto paskirtis	Naudojimo reglamentai			Pastabos
					preparato kiekis ml, g/10 l vandens	Karencijos laikotarpis	Didžiausias apdorojimų skaičius	
1.	Banvel 4S Syngenta Crop Protection AG, AS2-28H/2014 2019-12-31	Dikamba 480 g/l	Naujai įrengtos vejos	Purškti pavasarį–vasarą, kai vejų žolės turi 3 lapelius, o vienametės piktžolės yra ne aukštesnės kaip 15 cm. Naikina vienametes ir daugiametes dviskiltes piktžoles.	100 ml / 200 m ²		1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Naudoti akių (veido) apsaugos priemonės. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus,
			Senos vejos	Purškti pavasarį–vasarą, kai daugiametės piktžolės intensyviai auga, bet ne vėliau žiedinio pumpuro pasirodymo. Naikina vienametes ir daugiametes dviskiltes piktžoles.	100 ml / 100 m ²			

			Plotai, skirti sodų ir uogynų įveisimui	Naikina daugiameses ir vienmeses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai jos turi 3-4 lapus arba yra 10-12 cm aukščio	150-200 ml apdorojant 500 m ²		1	<p>Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti šaltu vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir išplauti. Galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</p> <p>Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.</p> <p>Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.</p> <p>Talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalinti vandens telkinių / vengti taršos per drenus ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, bent 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens melioracijos griovių.</p> <p>Pakuotė: 50 ml, 100 ml.</p>
			Gėlynai, vejos	Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų.	1 dalis Dalgis ir 3 dalys vandens		1	
			Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui	Purškama po derliaus nuėmimo. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai varpučiai 10-20 cm aukščio, o usnys ir kitos daugiamesės dviskiltės - skrotelės stadijoje. Po purškimo 5 dienas nepradėti žemės dirbimo.	150 ml apdorojant 500 m ²		1	
			Plotai prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varpučiai 10 cm aukščio, daugiamesės dviskiltės - skrotelės stadijoje, pavasarį 5 dienas prieš sėją, sodinimą. Nepurkšti šalnų metu!	100 ml apdorojant 500 m ²		1	
4.	Ecoplug AB Ecoplug Sweden 0406H/11 2020-03-04	Glifosatas 204 g/l	Nepageidaujami medžiai ir krūmai	Kapsulės įkalamos į kelmą, atsižvelgus į kelmo diametrą. Stabdo nepageidaujamą medžių ir krūmų atžėlimą iš kelmų ir šaknų				

6.	Glyfos Bio 360 SL Cheminova A/S, 0294H/06, 2016-03-25	Glifosatas 360 g/l	Vaismedžių pomedžiai	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės pavasarį, vasarą arba rudenį. Purškiant saugoti, kad herbicidas nepatektų ant vaismedžių žaliųjų dalių	150 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1	
			Plotai, skirti sodams ir uogynams veisti	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai išsprogsta 3–4 lapai arba kai išauga iki 10–12 cm aukščio	150–200 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1	
			Plotai, skirti kitų metų augalams auginti	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės po derliaus nuėmimo: varpučiui esant 10–20 cm aukščio, usnims ir kitoms daugiametėms plačialapėms piktžolėms – skrotelės tarpsnyje	150 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1	
			Plotai, prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varputis yra 10 cm aukščio, daugiametės plačialapės piktžolės – skrotelės stadijos	120 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²	5		

			Gėlynai, vejos	Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu	1 dalis Glyfos Bio 360 SL ir 3 dalys vandens (1:3)		
7.	Glyfos 360 SL Cheminova A/S, 0095H/06, 2016-03-25	Glifosatas 360 g/l	Vaismedžių pomedžiai	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės pavasarį, vasarą arba rudenį. Purškiant saugoti, kad herbicidas nepatektų ant vaismedžių žaliųjų dalių	150 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1
			Plotai, skirti sodams ir uogynams veisti	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai išsprogsta 3–4 lapai arba kai išauga iki 10–12 cm aukščio	150–200 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1
			Plotai, skirti kitų metų augalams auginti	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės po derliaus nuėmimo:	150 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1
				varpučiui esant 10–20 cm aukščio, usnims ir kitoms daugiametėms plačialapėms piktžolėms – skrotelės tarpusnyje			

			Plotai, prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varputis yra 10 cm aukščio, daugiametės plačialapės piktžolės – skrotelės stadijos	120 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²	5	
			Gėlynai, vejos	Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu	1 dalis Glyfos 360 SL ir 3 dalys vandens (1:3)		
8.	Glyfos Bio 450 SL Cheminova A/S, 0295H/06, 2016-03-25	Glifosatas 450 g/l	Vaismedžių pomedžiai	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės pavasarį, vasarą arba rudenį. Purškiant saugoti, kad herbicidas nepatektų ant vaismedžių žaliųjų dalių	120 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1
			Plotai, skirti sodams ir uogynams veisti	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai išsprogsta 3–4 lapai arba kai išauga iki 10–12 cm aukščio	120–160 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1

			Plotai, skirti kitų metų augalams auginti	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės po derliaus nuėmimo: varpučiui esant 10–20 cm aukščio, usnims ir kitoms daugiametėms plačialapėms piktžolėms – skrotelės tarpsnyje	120 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1	
			Plotai, prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varputis yra 10 cm aukščio, daugiametės plačialapės piktžolės – skrotelės stadijos	100 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²	5	1	
			Gėlynai, vejos	Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu	1 dalis Glyfos Bio 450 SL ir 4 dalys vandens (1:4)			
9.	Glyfos supreme 450 SL Cheminova A/S, 0338H/07, 2017-12-17	Glifosatas 450 g/l	Vaismedžių pomedžiai	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės pavasarį, vasarą arba rudenį. Purškiant saugoti, kad herbicidas nepatektų ant vaismedžių žaliųjų dalių	120 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1	

			Plotai, skirti sodams ir uogynams veisti	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai išsprogsta 3–4 lapai arba kai išauga iki 10–12 cm aukščio	120–160 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1	
			Plotai, skirti kitų metų augalams auginti	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės po derliaus nuėmimo: varpučiui esant 10–20 cm aukščio, usnims ir kitoms daugiametėms plačialapėms piktžolėms – skrotelės tarpsnyje	120 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1	
			Gėlynai, vejos	Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu	1 dalis Glyfos supreme 450 SL ir 4 dalys vandens (1:4)			
			Plotai, prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varputis yra 10 cm aukščio, daugiametės plačialapės piktžolės – skrotelės stadijos	100 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²	5	1	

10.	Glyphomax Dow AgroSciences Danmark A/S, 0199H/06, 2016-03-16	Glifosatas 360 g/l	Vaismedžių, uogakrūmių pomedžiai	Naikina daugiameses ir vienmeses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės pavasarij, vasarą arba rudeni, apsaugant vaismedžius ir uogakrūmius	150 ml apdorojant 500 m ²		1	
			Plotai, skirti sodų ir uogynų jveisimui	Naikina daugiameses ir vienmeses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai jos turi 3-4 lapus arba yra 10-12 cm aukščio	150 ml apdorojant 500 m ²		1	
			Gėlynai, vejos	Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarij arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų.	1 dalis Glyphomax ir 3 dalys vandens		1	
			Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui	Purškiamas po derliaus nuėmimo. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai varpučiai 10- 20 cm aukščio, o usnys ir kitos daugiamesės dviskiltės - skrotelės stadijoje	150 ml apdorojant 500 m ²		1	
			Plotai prieš bulvių, kopūstų sodinimą, morkų sėją	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varpučiai 10 cm aukščio, daugiamesės dviskiltės - skrotelės stadijoje, pavasarij 5 dienas prieš sėją, sodinimą. Nepurkšti šalnų metu!	100 ml apdorojant 500 m ²		1	

11.	MCPA 750 Nufarm GmbH&Co KG 0116H/03, 2020-02-08	MCPA 750 g/l	Vejos	Naikina vienametes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles. Purškiama, kai kiaulpienės yra pilnos rozetės stadijoje, bet prieš žiedinio pumpuro susidarymą, kai vejoje vyrauja herbicidui jautrios piktžolės	70 ml/ 10 litrų vandens, nupurškiant 300m ² vejos		1	
12.	Kernel 480 SL Cheminova A/S, 0296H/06, 2016-03-25	Glifosatas 480 g/l	Vaismedžių pomedžiai	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiant saugoti, kad herbicidas nepatektų ant vaismedžių ir uogakrūmių žaliųjų dalių	113 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1	
			Plotais, skirti vaismedžiams ir uogynams veisti	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai išsprogsta 3–4 lapai arba kai jos išauga iki 10–12 cm aukščio	113–150 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²		1	
			Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai išsprogsta 3–4 lapai arba kai jos išauga iki 10–12 cm aukščio	113-150 ml apdorojant 500 m ²		1	
			Plotai prieš bulvių kopūstų sodinimą, morkų sėją	Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varputis yra 10 cm aukščio, daugiametės plačialapės piktžolės – skrotelės stadijos	90 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ²	5	1	

			Gėlynai, vejos	Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu	1 dalis Kernel 480 SL ir 4 dalys vandens (1:4)			
13.	Klinik 360 SL Nufarm GmbH&Co KG 0233H/06 2016-02-09	Glifosatas 360 g/l	Plotai kitų metų augalams auginti, plotai, skirtiems vaismedžiams ir uogakrūmiams įveisti	Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purkšti piktžolių aktyvaus augimo metu pavasarį, vasarą arba rudenį.	150 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ² .			Žemę galima pradėti dirbti 10 dienų po purškimo
			Vaismedžių ir uogakrūmių pomedžiai	Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių ir	150 ml 10 l vandens, apdorojant 500 m ² .			
				uogakrūmių dalis, aktyvaus jų augimo metu pavasarį, vasarą arba rudenį.				
			Gėlynai, vejos	Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Tepti aukštaūges piktžoles jų aktyvaus augimo metu pavasarį arba vasarą. Tepant šepetėliai turi būti žemiau kaip 10 cm iki kultūrinių augalų viršūnių.	1 dalis Klinik 360 SL ir 3 dalys vandens			

14.	Nufarm MCPA Nufarm GmbH&Co KG 0064H/10 2020-02-08	MCPA 750 g/l	Vejos	Naikina vienmetes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles. Purkšti jaunas, aktyviai augančias piktžoles	70 ml/ 10 litrų vandens, nupurškiant 300m ² vejos		1	
15.	Ouragan with system 4 Syngenta Ltd., 0244H/06, 2016-03-04	Glifosatas 360 g/l	Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui	Naikina daugiameses ir vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo	150-200 ml apdorojant 500 m ²		1	
			Vaismedžių pomedžiai	Naikina daugiameses ir vienameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	150-200 ml apdorojant 500 m ²		1	
			Bulvės iki sudygimo	Naikina daugiameses ir vienameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės 2-3 dienos iki bulvių sudygimo	150-200 ml apdorojant 500 m ²		1	
			Plotai iki grikių sėjos	Naikina daugiameses ir vienameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės iki grikių sėjos	150-200 ml apdorojant 500 m ²		1	
20.	Roundup Express Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0442H/12, 2020-08-31	Glifosatas + pelargono rūgštis 7,2+20,4 g/l	Piktžolių naikinimas tarp šaligatvio plytelių, pakelėse, sodo takeliuose, palei tvorą, sienas	Purkšti vegetacijos metu. Naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes, ir vienameses vienaskiltes ir dviskiltes	2 l paruošto naudoti herbicido Roundup Express 1 arui nupurkšti		1	Herbicido forma: vandeninis tirpalas Herbicidas klasifikuojamas: Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti tik originalioje talpykloje.

								<p>Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.</p> <p>Pavojingas bitėms. Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu.</p> <p>Pakuotė: 1 l, 2,5 l, 3 l, 5 l</p>
22.	Starane 180 Dow AgroSciences Danmark A/S, 0143H/04, 2015-12-31	Fluroksipiras 180 g/l	Vejos	Naikina rūgštynes, dilgėles, kiaulpienes trikertes žvagine, dirvines nemiršėles, daržines žliūges, gysločius, vėdrynus. Purškiama, kai piktžolės aktyviai auga.	15-20 ml/100 m ² tirpalo norma - 24 l m ² vejos		2	
23.	Taifun B Feinchemie Schwebda GmbH, 0261H/06, 2016-02-09	Glifosatas 360 g/l	Vaismedžių (obelų, kriaušių) pomedžiai	Daugiametės ir vienametės vienaskiltės ir dviskiltės. Purkšti, kai piktžolės aktyviai auga pavasarį, vasarą arba rudenį, apsaugant vaismedžius	200 ml apdorojant 500 m ²		1	
			Plotai, skirti sodams ir uogynams įveisti	Daugiametės ir vienametės vienaskiltės ir dviskiltės. Purkšti, kai piktžolės aktyviai auga, turi 3-4 lapelius arba yra 10-12 cm aukščio	150-200 ml apdorojant 500 m ²		1	
			Gėlynai, vejos	Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų!	1 dalis Taifun ir 3 dalys vandens			Aplikatoriaus šepetėliai turi būti ne arčiau kaip 10 cm iki kultūrinių augalų viršūnių. Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų!

			Plotai skirti kitų metų augalų auginimui	Daugiametės ir vienametės vienaskiltės ir dviskiltės. Purkšti po derliaus nuėmimo, kai piktžolės aktyviai auga, t.y. varpučiai yra 10-12 cm aukščio, o usnys ir kitos daugiametės piktžolės skrotelės tarsnyje	150 ml apdorojant 500 m ²		1	
--	--	--	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	--	---	--

Moliuskocidai

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Augalų apsaugos produkto paskirtis	Naudojimo reglamentai		
					Preparato kiekis g/ m ²	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pakuotė
1	Ferramol W.Neudorff GmbH KG, 0428M/12, 2016-12-31	Geležies fosfatas 9,9 g/kg	Uogynai, lauko ir uždaro grunto daržovės, dekoratyviniai augalai	Naudoti pastebėjus šliužų ir sraigių pakenkimus	2 ,5-5	4	200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg

Repelentai

1. Plantskydd Plantskydd AB 0329R/07 2015-08-31	Kraujo miltai 99%	Lapuočių, spygliuočių sodinukai, dekoratyviniai augalai	Apsaugo nuo kiškių, stirnų, elnių ir briedžių apgraužimo	1,1 kg 1000 augalų.	Augalai apipurškiami arba aptepami nuo rugsėjo iki kovo mėn.
2. Trico Garden Kwizda Agro GmbH 0461R/13 2020-08-31	Avių riebalai 65 g/l	Spygliuočiams ir lapuočiams, dekoratyviniams augalams	Apsaugo nuo elnių, stirnų, briedžių apgraužimo	10-20 ml/10 m ²	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus

