

AUGALŲ AUGIMO REGULIATORIAI

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Apdorojimo laikas	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
1.	Calma Adama Registrations B.V. AS2-60AR/2015 2018-04-30	Trineksapak etilas 175 g/l	0,4	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Purkšti bambklėjimo tarpsnyje (BBCH 30–37)		1	Saugo nuo išgulimo
			0,2–0,5	Žieminiai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)		1	Saugo nuo išgulimo
			0,2-0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)		1	Saugo nuo išgulimo
2.	Caryx BASF A/S 0466AR/13 2020-02-28	Mepikvat chloridas + metkonazolas 210+30 g/l	0,7-1,4	Žieminiai rapsai	Purkšti rudenį, kai 3 lapas išsivystęs-iki šoninių ūglių formavimosi (BBCH 13-20)		1	Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.
			0,7-1,4	Žieminiai rapsai	Purkšti pavasarį, kai susiformuoja 1 šoninis ūglis-iki matomo pirmieji žiedlapiai, tačiau žiedpumpuriai vis dar neišsiskleidę (BBCH 21-59)		1	
			0,7-1,4	Vasariniai rapsai	Purkšti nuo pirmojo tarpubamblio iki pagrindinio žiedyno butonų išsiskirstymo, tačiau kol jie dar neišsiskleidę (BBCH 31–55)		1	
3.	Cerone Bayer CropScience AG 0146R/05, 2019-07-31	Etefonas 480 g/l	0,5	Žieminiai kviečiai	Purškama nuo paskutinio lapo pasirodymo iki vamzdelėjimo vidurio		1	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l
			0,75-1,0	Žieminiai rugiai	Purškama nuo paskutinio lapo pasirodymo iki pirmųjų akuotų pasirodymo		1	
			0,5	Vasariniai kviečiai	Purškama nuo paskutinio lapo pasirodymo iki vamzdelėjimo vidurio		1	

			0,5	Vasariniai miežiai	Purškama nuo antrojo bamblio susiformavimo iki pirmųjų akuotų pasirodymo		1	
4.	Cycocel 750 BASF A/S, AS2-26AR(2016), 2020-11-30	Chlormekvatchloridas 750 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai	Purkšti krūmijimosi tarpsnio viduryje iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25–32)		1	Pakuotė: 10 l.
			0,8–1,25	Vasariniai kviečiai	Purkšti krūmijimosi tarpsnio viduryje iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25–32)		1	
			1,0–1,5	Žieminiai kvietrugiai	Purkšti krūmijimosi tarpsnio viduryje iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25–32)		1	
			1,0–2,0	Žieminiai rugiai	Purkšti krūmijimosi tarpsnio viduryje iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25–32)		1	Didesnę normą naudokite aukštaūgėms rugių veislėms ir gerai įtręštiems, daug maisto medžiagų turintiems dirvožemiams, mažesnę normą naudokite lengvoms, mažai tręštomis dirvoms ir žemaūgėms rugių veislėms.
			1,0-1,5	Vasariniai miežiai	Purkšti krūmijimosi tarpsnio viduryje iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 25-32)		1	Pagerina krūmijimąsi ir šaknijimąsi
			1,0-1,5	Avižos	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30–37)		1	
			1,2 – 2,0	Raudonieji eraičinai	Purkšti krūmijimosi viduryje – iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 25-32)		1	
5.	CCC Nufarm GmbH & Co KG, AS2-31AR(2016) 2020-11-30	Chlormekvatchloridas 750 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	
			0,6	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	ankstyvas miežių purškimas nesutrumpina stiebų, bet pagerina šaknų sistemos išsivystymą ir krūmijimąsi.
			0,9-1,0	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	
			1,5-2,0	Rugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	
			1,0-1,5	Avižos	Purkšti nuo pirmo bamblio		1	

					pasirodymo iki matomi pirmieji akuotai (BBCH 31–49)			
6.	Cuadro NT Cheminova A/S, AS2-28AR(2016) 2019-04-30	Trineksapak etilas 250 g/l	0,2-0,4	Žieminiams kviečiams, žieminiams ir vasariniams miežiams, rugiams, kvietrugiams	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-39)		1	
			0,2-0,3	Vasariniams kviečiams	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-39)		1	
			0,4-0,8	Varpinėms žolėms, auginamoms sėklai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-39)		1	
7.	Medax Max BASF A/S AS2-40AR(2016) 2019-04-30	Trineksapak etilas 75 g/kg + kalcio proheksadionas 50 g/kg	0,3-0,75	Žieminiai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 29–39)		1	Saugo nuo išgulimo
			0,3-0,5	Žieminiai kviečiai	Purkšti nuo paskutinio lapo tarpsnio iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (BBCH 39–49)		1	
			0,3-0,5	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio bamblio tarpsnio (BBCH 29–33)		1	
			0,3	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo paskutinio bamblio tarpsnio iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 33–39)		1	
		0,5-1,0	Žieminiai miežiai, rugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 29–39)		2	Saugo nuo išgulimo, purkšti ne daugiau kaip 2 kartus po 0,5 l/ha	
		0,5-0,75	Žieminiai miežiai, rugiai	Purkšti nuo paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (BBCH 39–49)		2	Saugo nuo išgulimo, purkšti ne daugiau kaip 2 kartus po 0,5 l/ha	

			0,3-0,5	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 29–39)		1	Saugo nuo išgulimo
			0,5-0,75	Žieminiai kvietrugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 29–39)		2	Saugo nuo išgulimo, purkšti ne daugiau kaip 2 kartus po 0,5 l/ha
			0,5	Žieminiai kvietrugiai	Purkšti nuo paskutinio lapo tarpsnio iki vamzdelėjimo pabaigos, prieš pasirodant akuotams (BBCH 39–49)		2	Saugo nuo išgulimo, purkšti ne daugiau kaip 2 kartus po 0,5 l/ha
			0,3-0,5	Vasarinės avžos	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki ketvirto bamblio tarpsnio (BBCH 29–34)		1	Saugo nuo išgulimo
8.	Medax Top BASF A/S AS2-6AR(2017) 2020-02-28	Mepikvatchloridas + kalcio proheksadionas 300 + 50 g/l.	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Purkšti bamblių tarpsniu (BBCH 30-39)		1 arba 2 x 0,75 l/ha	Saugo nuo išgulimo
			1,0-1,5	Vasariniai miežiai	Purkšti bamblių tarpsniu (BBCH 30-39)		1 arba 2 x 0,75 l/ha	Saugo nuo išgulimo
			0,5-1,0	Vasariniai kviečiai, avžos	Purkšti bamblių tarpsniu (BBCH 30-39)		1 arba 2 x 0,5 l/ha	Saugo nuo išgulimo
			1,0-1,5	Varpinės žolės sėklai	Purkšti bamblių tarpsniu (BBCH 30-39)		1 arba 2 x 0,75 l/ha	Saugo nuo išgulimo
9.	Moddus 250 EC (A7725M) Syngenta Crop Protection AG, 0219R/11, 2021-02-14	Trineksapak etilas 250 g/l	0,3-0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-34)		1	Saugo javus nuo išgulimo
			0,2-0,3	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-32)		1	
			0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30-33)		1	
10.	Moddus Start (A17600C) Syngenta Polska Sp. z o.o., AS2-33AR/2015, 2019-04-30	Trineksapak etilas 250 g/l	0,3	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi vidurio–kol paskutinis lapas visiškai išsiskleidžia (BBCH 25–39)		1 arba 2x 0,15 l/ha	Saugo javus nuo išgulimo
			0,5	Žieminiai rugiai	Purkšti nuo krūmijimosi vidurio–kol paskutinis lapas visiškai išsiskleidžia (BBCH 25–39)		1 arba 2x 0,25 l/ha	

			0,5	Žieminiai kvietrugiai	Purkšti nuo krūmijimosi vidurio–kol paskutinis lapas visiškai išsiskleidžia (BBCH 25–39)		1 arba 2x 0,25 l/ha	
			0,8	Varpinės žolės sėklai: paprastosios šunažolės, raudonieji eraičinai, daugiametės svidrės, pievinės miglės	Purkšti bambliųjimo–vamzdelėjimo metu (BBCH 30–49)		1 arba 2x 0,4 l/ha	
			0,6	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi vidurio–kol paskutinis lapas visiškai išsiskleidžia (BBCH 25–39)		1 arba 2x 0,3 l/ha	
11.	Moxa Globachem NV AS2-42AR(2016) 2019-04-30	Trineksapak etilas 250 g/l	0,2-0,4	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		1	Saugo nuo išgulimo
			0,15	Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		2	
			0,4-0,6	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		1	
			0,3	Žieminiai ir vasariniai miežiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		2	
			0,5-0,6	Žieminiai rugiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		1	
			0,25	Žieminiai rugiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		2	
			0,4-0,6	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		1	
			0,25	Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 25–39)		2	
			0,3	Avižos	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki antras bamblys pakyla daugiau kaip		1	

					2 cm nuo pirmojo bamblio (BBCH 25–32)			
			0,15	Avižos	Purkšti nuo matomo 5 šoninio ūglio iki antras bamblys pakyla daugiau kaip 2 cm nuo pirmojo bamblio (BBCH 25–32)		2	
			0,4-0,8	Varpinės žolės (tikrieji eraičinai, raudonieji eraičinai, daugiametės svidrės, pašariniai motiejukai) sėklai	Purkšti nuo pirmojo bamblio tarpsnio iki matomi pirmieji akuotai (BBCH 31–49)		1	
			0,4	Varpinės žolės (tikrieji eraičinai, raudonieji eraičinai, daugiametės svidrės, pašariniai motiejukai) sėklai	Purkšti nuo pirmojo bamblio tarpsnio iki matomi pirmieji akuotai (BBCH 31–49)		2	
12.	Optimus Adama Registrations B.V. 0413R/11 2018-04-30	Trineksapak etilas 175 g/l	0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 31–37)		1	Saugo javus nuo išgulimo
			0,4	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30–37)		1	
			0,2-0,5	Žieminiai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)		1	
			0,2-0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)		1	
13.	Regalis Plus BASF A/S AS2-5AR/2016 2022-12-31	Kalcio proheksadionas 100 g/kg	3,0 (per sezoną)	Obelys, kriaušės	Purkšti vegetacijos metu: purškiant BBCH 60–69 purškimo norma 0,5–2,5 kg/ha, neviršijant 2,5 kg/ha, purškiant BBCH 71–75 purškimo norma 0,5–1,5 kg/ha, neviršijant 1,5 kg/ha.			Maksimali produkto norma per sezoną negali viršyti 3,0 kg/ha.
14.	Stabilan 750 Nufarm GmbH & Co KG, AS2-32AR(2016)	Chlormekvatchloridas 750 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	
			0,6	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi		1	ankstyvas miežių purškimas

	2020-11-30				pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)			nesutrumpina stiebų, bet pagerina šaknų sistemos išsivystymą ir krūmijimąsi
			0,9-1,0	Vasariniai kviečiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	
			1,5-2,0	Rugiai	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio pasirodymo (BBCH 21–31)		1	
			1,0-1,5	Avižos	Purkšti nuo pirmo bamblio pasirodymo iki matomi pirmieji akuotai (BBCH 31–49)		1	
15.	Terpal BASF A/S, AS2-17AR/2015, 2018-07-31	Mepikvatchloridas + etefonas 305 +155 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai	Purkšti vegetacijos metu. Saugo nuo išgulimo		1	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.
			1,0-1,5	Žieminiai rugiai	Purkšti vegetacijos metu. Saugo nuo išgulimo		1	
			1,0	Vasariniai miežiai	Purkšti vegetacijos metu. Saugo nuo išgulimo		1	
16.	Toprex 375 SC (A14049A) Syngenta Crop Protection AG AS2-26F/2014 2019-12-31	Paklobutrazolas 125 g/l + difenokonazolas 250 g/l	0,35	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Purkšti pavasarį nuo stiebo ilgėjimo pradžios, kol išsiskirsto, tačiau neišsiskleidžia pagrindinio žiedyno butonai (BBCH 31-55)		1	Saugo nuo fomezės, juodosios dėmėligės, šviesmargės, taip pat nuo augalų ištįsimo ir išgulimo. Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l.
17.	Trimaxx Adama Registrations B.V. 0412R/11 2018-04-30	Trineksapak etilas 175 g/l	0,4	Žieminiai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 31–37)		1	Saugo javus nuo išgulimo
			0,4	Vasariniai kviečiai	Purkšti bamblių tarpsnyje (BBCH 30–37)		1	
			0,2-0,5	Žieminiai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)		1	
			0,2-0,4	Vasariniai miežiai	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo pasirodymo tarpsnio (BBCH 29–37)		1	

DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS

Preparato pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Apdorojimas	Kenksmingi organizmai	Pastabos
1. Menno Florades Menno Chemie-Vertriebs Ges.m.b.H, 0257/05, 2018-01-31	Benzoinė rūgštis 90 g/l	Paviršių, vazonėlių šiltnamiuose dezinfekcijai	Dezinfekuojama 1–4% tirpalu/ 16 valandų	Virusai	Gali pagreitinti metalų koroziją
			Dezinfekuojama 1 % tirpalu/ 16 valandų	Bakterijos, grybai	
		Peilių, įrangos, naudojamos šiltnamiuose, dezinfekcijai	Dezinfekuojama 2–3 % tirpalu/ 3 minutes	Virusai	
			Dezinfekuojama 1 % tirpalu/ 3 minutes	Bakterijos, grybai, viroidai	
		Dėžės, padėklai, sandėliai, transporteriai, transporto priemonės, pakrovimo vietos, techninė įranga naudojama bulvių auginimo technologijose	Dezinfekuojama 2 % tirpalu	Virusai, bakterijos, grybai, viroidai	