

INSEKTICIDAI (augalų apsaugos produktai kenkėjams naikinti)

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Augalų apsaugos produkto paskirtis	Naudojimo reglamentai			Pastabos
					preparato kiekis ml,g/10 l vandens	Karencijos laikotarpis	Didžiausias apdorojimų skaičius	
1.	NeemAzal T/S Trifolio M GmbH, AS2-52I/2016, 2022-05-31	Azadirachtinas A 10 g/l	Prieskoniniai augalai, auginami šiltnamiuose	Saugo nuo čiulpiančių, griaužiančių, lapus minuojančių vabzdžių	0,6 proc. tirpalas (30 ml/arui)	14	3	Nenaudoti laiškiniams česnakams.
			Pomidorai, agurkai, paprikos, cukinijos, baklažanai, moliūgai, auginami šiltnamiuose	Saugo nuo čiulpiančių, griaužiančių, lapus minuojančių vabzdžių	0,3 proc. tirpalas (20-30 ml/arui).	3	3	
			Dekoratyvinių augalų daigams, auginamiems šiltnamiuose	Saugo nuo daiginių uodelių	0,5 proc. tirpalas.		4	Nenaudoti dekoratyviniams spygliuočiams.
			Dekoratyviniai augalai, auginami šiltnamiuose	Saugo nuo čiulpiančių, griaužiančių, lapus minuojančių vabzdžių	0,15 proc. tirpalas (30 ml/arui).		4	Nenaudoti dekoratyviniams spygliuočiams.
2.	Karate Spray Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-53I(2017) 2018-07-31		Bulvės	Naikina kolorado vabalus, amarus	300–1000 ml/10 m ²	14	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
			Morkos, pastarnokai, ropės	Naikina morkines blakutes, muses, amarus	300–1000 ml/10 m ²	14	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų

Burokėliai	Naikina runkelines muses, amarus	300–1000 ml/10 m ²	3	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
Salierai	Naikina morkines blakutes, muses, amarus.	300–1000 ml/10 m ²	14	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
Ridikėliai	Naikina kryžmažiedines sprages.	300–1000 ml/10 m ²	7	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
Pomidorai lauke ir šiltnamiuose	Naikina šiltnaminius baltasparnius, amarus, kandis, paprastąsias voratinklines erkes	300–1000 ml/10 m ²	3	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
Baklažanai šiltnamiuose.	Naikina šiltnaminius baltasparnius, amarus, kandis, paprastąsias voratinklines erkes	300–1000 ml/10 m ²	3	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
Paprikos šiltnamiuose	Naikina šiltnaminius baltasparnius, amarus, paprastąsias voratinklines erkes	300–1000 ml/10 m ²	3	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
Agurkai, cukinijos lauke	Naikina tripsus, amarus, kandis	300–1000 ml/10 m ²	5	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
Agurkai, cukinijos šiltnamiuose	Naikina šiltnaminius baltasparnius, tripsus,	300–1000 ml/10 m ²	3	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų

	amarus, kandis.				
Gūžiniai, žiediniai, briuseliniai kopūstai	Naikina kopūstinius baltukus, kandis, amarus	300–1000 ml/10 m ²	7	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
Salotos	Naikina tripsus, amarus, kandis	300–1000 ml/10 m ²	7	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
Pupos	Naikina gumbelinius straubliukus, pupinius amarus, tripsus, žirinius vaisėdžius	300–1000 ml/10 m ²	7	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
Žirniai	Naikina gumbelinius straubliukus, žirinius amarus, tripsus, žirinius vaisėdžius	300–1000 ml/10 m ²	3	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
Braškės, vynuogės.	Naikina paprastąsias voratinklines erkes, amarus, pjūklelius, lapsukius	300–1000 ml/10 m ²	7	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
Juodieji serbentai, raudonieji serbentai, agrastai	Naikina paprastąsias voratinklines erkes, amarus, pjūklelius, lapsukius.	300–1000 ml/10 m ²	14	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
Avietės, gervuogės	Naikina paprastąsias voratinklines erkes, amarus,	300–1000 ml/10 m ²	28	2	Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų

				pjūklelius, lapsukius					
			Dekoratyvieniai augalai	Naikina amarus, blakes, erkutes, cikadeles	300–1000 ml/10 m ²		2		Purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų
3.	Mavrik Vita ADAMA Registrations B.V., AS2-45I(2017), 2022-05-31	Tau-fluvalinatas 240 g/l	Žirniai (žalieji)	Saugo nuo sitonų, tripsų, žirninių, pupinių amarų, žirninių drugių.	0,05 proc. tirpalas (5 ml/10 l vandens).	7	1		
			Žirniai (grūdams)	Saugo nuo sitonų, tripsų, žirninių, pupinių amarų, žirninių drugių.	0,05 proc. tirpalas (5 ml/10 l vandens).	14	1		
			Pupos (grūdams)	Saugo nuo sitonų, amarų.	0,05 proc. tirpalas (5 ml/10 l vandens).	14	1		
			Bulvės	Saugo nuo kolorado vabalų, bulvių amarų, cikadelių.	0,05 proc. tirpalas (5 ml/10 l vandens).	7	2		Minimalus intervalas tarp purškimų – 14 dienų.
			Morkos	Saugo nuo morkinės blakutės, morkinės musės.	0,05 proc. tirpalas (5 ml/10 l vandens).	30	2		Minimalus intervalas tarp purškimų – 14 dienų.
			Žiediniai kopūstai, brokoliai, gūžiniai ir briuseliniai kopūstai	Saugo nuo kopūstinių amarų, kopūstinių baltukų, griežtinių baltukų, kopūstinių pelėdgalvių, kopūstinių	0,05 proc. tirpalas (5 ml/10 l vandens).	7	1		

				kandžių, kopūstinių musių, kryžmažiedinių spragių.				
			Dekoratyviniai augalai	Saugo nuo amarų, vabalų, blakučių.	0,05 proc. tirpalas (5 ml/10 l vandens).		2	Minimalus intervalas tarp purškimų – 7-14 dienų.

FUNGICIDAI (augalų apsaugos produktai augalų ligoms naikinti)

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Augalų apsaugos produkto paskirtis	Naudojimo reglamentai			Pastabos
					preparato kiekis ml,g/10 l vandens	Karencijos laikotarpis	Didžiausias apdorojimų skaičius	
1.	Gloria Bayer AG, 0290F/06, 2019-10-31	Fenamidonas+ propamokarbo hidrochloridas 75 + 375 g/l	Bulvės	Purškiamos vegetacijos metu, kai susidaro palankios sąlygos marui, sausligei plisti, bet ne vėliau kaip pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams	20 ml/a	7	3	Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sudėtyje yra propamokarbo hidrochlorido ir 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki

								<p>paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 3 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos fenamidono, dažniau kaip kas dvejus metus tame pačiame lauke.</p> <p>Pakuotė: 40 ml, 100ml, 200 ml</p>
2.	Infinito Bayer AG 0337F/12, 2021-05-31	Propamokarbo hidrochloridas + fluopikolidas 625 + 62,5 g/l	Bulvės	Purškama vegetacijos metu nuo maro	30-40 ml/10 l vandens, ir nupurkšti 250 m ²	7	2	Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodų ar nuokelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10
			Svogūnai	Purškama vegetacijos metu nuo netikrosios miltligės	30 ml/10 l vandens ir nupurkšti 200 m ²	7	1	
			Agurkai, auginami šiltnamiuose	Purškama vegetacijos metu nuo netikrosios miltligės 0,14% tirpalo	14 ml/ 10 l vandens	3	2	
			Gūžiniai, žiediniai, Briuselio kopūstai, brokoliai	Purškama vegetacijos metu nuo netikrosios miltligės	30 ml/10 l vandens ir nupurkšti 200 m ²	14	1	
			Porai	Purškama vegetacijos metu nuo netikrosios miltligės	30 ml/10 l vandens ir nupurkšti 170 m ²	14	1	

								metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti produkto rūgščiuose dirvožemiuose. Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, naudoti produktą pagal nurodytus naudojimo reglamentus ne dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke. Pakuotė: 30 ml, 50 ml, 100 ml, 300 ml, 500 ml
3.	Previcur Energy Bayer AG 0356F/08 2018-10-17	Propamokarbas 530 g/l + fosetilas 310 g/l	Substratas daržovių, dekoratyvinių augalų auginimui	Naudojamas 1,25 % (2,5 ml/200 ml vandens) tirpalas. Saugo nuo šaknų puvinų (Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phoma spp., Phytophthora spp., Alternaria spp)			1	Fungicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia:
			Agurkų, pomidorų, paprikos, gūžinių ir žiedinių kopūstų, brokolių, briuselinių kopūstų, salotų daigai	Laistoma 0,15% tirpalu. Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjų (Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.)	15 ml/10 l vandens ir palaistyti 5 m ²		2	Kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
			Dekoratyviniai augalai	Laistoma 0,2% tirpalu. Saugo nuo pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjų (Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.)	20ml/10 l vandens ir palaistyti 5 m ²		2	Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Pakuotė: 15 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml
			Dekoratyviniai augalai	Saugo nuo netikrosios miltligės (Peronospora spp., Bremia spp.)	25 ml/100 m ²		2	

4.	Revus 250 SC Syngenta Polska Sp. z o.o. AS2-13F/2016 2024-07-31	Mandipropamidaz 250 g/l	Bulvės	Saugo bulves nuo maro	6 ml/a	3	3	
			Pomidorai auginami lauke ir šiltnamiuose	Saugo pomidorus nuo maro	6 ml/a	3	3	
			Baklažanai auginami šiltnamiuose	Saugo baklažanus nuo maro	6 ml/a	3	3	
			Salotos, špinatai, mangoldai, pipirės, prieskoniniai augalai auginami šiltnamiuose	Saugo nuo netikrosios miltligės	6 ml/a	7	1	
5.	Score 250 EC (A7402T) Syngenta Crop Protection AG, 0047F/13 2019-12-31	Difenkonazolas 250 g/l	Obelys, kriaušės	Purškiama prieš rauples, miltligę apsaugos iš dalies	2 (0,02 proc. tirpalo koncentracija)	21	2	
			Slyvos, vyšnios	Moniliozė	2 (0,02 proc. tirpalo koncentracija)	14	2	

1.	Banvel 4S Syngenta Crop Protection AG, AS2-28H/2014 2019-12-31	Dikamba 480 g/l	Naujai įrengtos vejos	Purkšti pavasarį–vasarą, kai vejų žolės turi 3 lapelius, o vienametės piktžolės yra ne aukštesnės kaip 15 cm. Naikina vienametes ir daugiametes dviskiltes piktžoles.	10 ml / 200 m ²		1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Naudoti akių (veido) apsaugos priemonės. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia
			Senos vejos	Purkšti pavasarį–vasarą, kai daugiametės piktžolės intensyviai auga, bet ne vėliau žiedinio pumpuro pasirodymo. Naikina vienametes ir daugiametes dviskiltes piktžoles.	10 ml / 100 m ²			

								paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Pakuotė: 5 ml, 10 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml.
2.	Betanal Bayer AG 0355H/08 2018-10-17	Fenmedifamas 160 g/l	Derančios braškės	Purkšti anksti pavasarį iki braškių žydėjimo, po tarpueilių purenimo, ant ką tik sudygusių piktžolių arba po derliaus nuėmimo, po tarpueilių purenimo ant naujai sudygusių piktžolių 3 kartus po 20 ml/arui arba 2 kartus po 30 ml/arui produkto, kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje.	60 ml/arui		3	
			Naujai įveistos braškės	Purkšti praėjus vienai savaitei po daigų pasodinimo 30 ml/arui, purškimą pakartoti pasirodžius naujai piktžolių bangai, naudojant 30 ml/arui.	60 ml/arui		2	

4. Dalgis XL Monsanto Crop Science Denmark A/S AS2-23H/2016 2018-12-31	Vaismedžių pomedžiai, aplink dekoratyvinius krūmus	Naikina vienametes vienaskiltes piktžolesw, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltespiktžoles. Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių ir dekoratyvinių krūmų dalis	20 ml 5 l vandens, apdorojant 100 m ²	14	1	
	Vaismedžių pomedžiai, aplink dekoratyvinius krūmus	Naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių ir dekoratyvinių krūmų dalis	40 ml 5 l vandens, apdorojant 100 m ²	14	1	
	Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui	Naikina vienametes vienaskiltes piktžolesw, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltespiktžoles. Purkšti vegetuojančias piktžoles	20 ml 5 l vandens, apdorojant 100 m ²		1	
	Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui	Naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purkšti vegetuojančias piktžoles	40 ml 5 l vandens, apdorojant 100 m ²		1	
	Plotai, kur augalai nepageidaujami: ant takelių, namų kiemuose, prie tvorų, vejų pakraščiuose	Naikina vienametes vienaskiltes piktžolesw, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltespiktžoles. Purkšti vegetuojančias piktžoles	30 ml 5 l vandens, apdorojant 100 m ²		1	
	Plotai, kur augalai nepageidaujami: ant takelių, namų kiemuose,	Naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purkšti vegetuojančias piktžoles	60 ml 5 l vandens, apdorojant 100 m ²		1	

			prie tvorų, vejų pakraščius					
7.	MCPA 750 Nufarm GmbH&Co KG 0116H/10, 2020-02-08	MCPA 750 g/l	Vejos	Naikina vienametes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles. Purškiama, kai kiaulpienės yra pilnos rozetės stadijoje, bet prieš žiedinio pumpuro susidarymą, kai vejoje vyrauja herbicidui jautrios piktžolės	70 ml/ 10 litrų vandens, nupurškiant 300m ² vejos		1	
9.	Nufarm MCPA Nufarm GmbH&Co KG 0064H/10 2020-02-08	MCPA 750 g/l	Vejos	Naikina vienametes ir kai kurias daugiameses dviskiltes piktžoles. Purškiama jaunas, aktyviai augančias piktžoles	70 ml/ 10 litrų vandens, nupurškiant 300m ² vejos		1	
10.	Ouragan with system 4 Syngenta Ltd., 0244H/06, 2018-12-31	Glifosatas 360 g/l	Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui	Naikina daugiameses ir vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo	150-200 ml apdorojant 500 m ²		1	
			Vaismedžių pomedžiai	Naikina daugiameses ir vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	150-200 ml apdorojant 500 m ²		1	
			Bulvės iki sudygimo	Naikina daugiameses ir vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės 2-3 dienas iki bulvių sudygimo	150-200 ml apdorojant 500 m ²		1	

			Plotai iki grikių sėjos	Naikina daugiametes ir vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės iki grikių sėjos	150-200 ml apdorojant 500 m ²		1	
11	Roundup 60 Monsanto Crop Science Denmark A/S AS2-21H/2017 2018-06-30	Glifosatas 60 g/l	Sodai, ant takelių, namų kiemai, prie tvorų, vejų pakraščiai, plotai, skirti kitų metų augalų auginimui.	Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purkšti ne aukštesnes nei 10–15 cm piktžoles	20 ml 0,5 l vandens, apdorojant 10 m ²		3	
			Sodai, ant takelių, namų kiemai, prie tvorų, vejų pakraščiai, plotai, skirti kitų metų augalų auginimui.	Naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purkšti vegetuojančias piktžoles	30 ml 0,5 l vandens, apdorojant 10 m ²		3	
			Sodai, ant takelių, namų kiemai, prie tvorų, vejų pakraščiai, plotai, skirti kitų metų augalų auginimui.	Naikina barščius, didžiąsias dilgeles, paprastąją garšvą. Purkšti vegetuojančias piktžoles.	40 ml 0,5 l vandens, apdorojant 10 m ²		3	
			Vejos atnaujinimas	Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles	20 ml 1,5 l vandens, apdorojant 30 m ²		3	
12.	Roundup B Monsanto Crop Science Denmark A/S AS2-6H/2016 2018-12-31	Glifosatas 360 g/l	Sodai, ant takelių, namų kiemai, prie tvorų, vejų pakraščiai, plotai, skirti kitų	Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purkšti ne aukštesnes nei 10–15 cm piktžoles	10 ml 1,5 l vandens, apdorojant 30 m ²		3	

		metų augalų auginimui.					
		Sodai, ant takelių, namų kiemai, prie tvorų, vejų pakraščiai, plotai, skirti kitų metų augalų auginimui.	Naikina daugiamešes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purkšti vegetuojančias piktžoles	15 ml 1,5 l vandens, apdorojant 30 m ²		3	
		Sodai, ant takelių, namų kiemai, prie tvorų, vejų pakraščiai, plotai, skirti kitų metų augalų auginimui.	Naikina barščius, didžiąsias dilgeles, paprastąją garšvą. Purkšti vegetuojančias piktžoles.	20 ml 1,5 l vandens, apdorojant 30 m ²		3	
		Vejos atnaujinimas	Naikina vienametes ir daugiamešes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles	20 ml 1,5 l vandens, apdorojant 30 m ²		3	
		Medžių kelmiai, krūmai, krūmokšniai	Nupjovus medį ar krūmą iš karto tirpalu užtepti visą kelmo paviršių	20 ml 80 ml vandens			Saugoti, kad nepatektų ant šalia augančių augalų.
		Piktžolės su tuščiaviduriais stiebais	Nupjovus stiebus, paliekant 20 cm virš žemės, 5–10 ml <i>Roundup B</i> įpilti į tuščiavidurį stiebą.	20 ml 80 ml vandens			

13. **Roundup Biactive**
Monsanto Crop Science Denmark
A/S
AS2-8H/2016
2018-06-30

Vaismedžių pomedžiai, aplink dekoratyvinius krūmus	Naikina vienametes vienaskiltes piktžolesw, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltespiktžoles. Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių ir dekoratyvinių krūmų dalis	20 ml 5 l vandens, apdorojant 100 m ²	14	1	
Vaismedžių pomedžiai, aplink dekoratyvinius krūmus	Naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių ir dekoratyvinių krūmų dalis	40 ml 5 l vandens, apdorojant 100 m ²	14	1	
Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui	Naikina vienametes vienaskiltes piktžolesw, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltespiktžoles. Purkšti vegetuojančias piktžoles	20 ml 5 l vandens, apdorojant 100 m ²		1	
Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui	Naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purkšti vegetuojančias piktžoles	40 ml 5 l vandens, apdorojant 100 m ²		1	
Plotai, kur augalai nepageidaujami: ant takelių, namų kiemuose, prie tvorų, vejų pakraščiuose	Naikina vienametes vienaskiltes piktžolesw, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltespiktžoles. Purkšti vegetuojančias piktžoles	30 ml 5 l vandens, apdorojant 100 m ²		1	

			Plotai, kur augalai nepageidaujami: ant takelių, namų kiemuose, prie tvorų, vejų pakraščiuos	Naikina daugiamečių vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purkšti vegetuojančias piktžoles	60 ml 5 l vandens, apdorojant 100 m ²		1	
14.	Roundup Express Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0442H/12, 2020-08-31	Glifosatas + pelargonio rūgštis 7,2+20,4 g/l	Piktžolių naikinimas tarp šaligatvio plytelių, pakelėse, sodo takeliuose, palei tvorą, sienas	Purkšti vegetacijos metu. Naikina daugiamečių vienaskiltes ir dviskiltes, ir vienametes vienaskiltes ir dviskiltes	2 l paruošto naudoti herbicido Roundup Express 1 arui nupurkšti		1	
15.	Roundup G Monsanto Crop Science Denmark A/S AS2-7H/2016 2018-12-31	Glifosatas 120 g/l	Sodai, ant takelių, namų kiemai, prie tvorų, vejų pakraščiai, plotai, skirti kitų metų augalų auginimui.	Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purkšti ne aukštesnes nei 10–15 cm piktžoles	20 ml 1,0 l vandens, apdorojant 20 m ²		3	
			Sodai, ant takelių, namų kiemai, prie tvorų, vejų pakraščiai, plotai, skirti kitų metų augalų auginimui.	Naikina daugiamečių vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purkšti vegetuojančias piktžoles	30 ml 1,0 l vandens, apdorojant 20 m ²		3	
			Sodai, ant takelių, namų kiemai, prie tvorų, vejų pakraščiai, plotai, skirti kitų metų augalų auginimui.	Naikina barščius, didžiąsias dilgeles, paprastąją garšvą. Purkšti vegetuojančias piktžoles.	40 ml 1,0 l vandens, apdorojant 20 m ²		3	

			Vejos atnaujinimas	Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles	40 ml 1,0 l vandens, apdorojant 20 m ²		3	
			Medžių kelmai, krūmai, krūmokšniai	Nupjovus medį ar krūmą iš karto tirpalu užtepti visą kelmo paviršių	60 ml 40 ml vandens			Saugoti, kad nepatektų ant šalia augančių augalų.
			Piktžolės su tuščiaiduriais stiebais	Nupjovus stiebus, paliekant 20 cm virš žemės, 5–10 ml <i>Roundup G</i> įpilti į tuščiaidurį stiebą.	60 ml 40 ml vandens			
16..	Roundup Gel Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-2H/2016 2018-12-31,	Glifosatas 7,2 g/l	Piktžolių naikinimas soduose, vejose, gėlynuose, aplink dekoratyvinius augalus, ant takelių, namų kiemuose, plotuose, skirtuose kitų metų augalų auginimui.	Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles	Tepti piktžolių lapų paviršių (30 proc.),		2	
17.	Roundup Gel Max Monsanto Crop Science Denmark A/S,	Glifosatas 72 g/l	Piktžolių naikinimas soduose, vejose, gėlynuose, aplink	Naikina daugiametes dviskiltes piktžoles	2,5 ml/m ²		1	Tepkite lapo paviršių (30 proc.) Saugokite, kad nepatektų ant šalia augančių augalų

	AS2-59H(2017) 2018-12-15		dekoratyvinius augalus, ant takelių, namų kiemuose, plotuose, skirtuose kitų metų augalų auginimui.					
			Piktžolių naikinimas soduose, vejose, gėlynuose, aplink dekoratyvinius augalus, ant takelių, namų kiemuose, plotuose, skirtuose kitų metų augalų auginimui.	Naikina sumedėjusias piktžoles	5 ml/m ²		1	Tepkite lapo paviršių (30 proc.) Saugokite, kad nepatektų ant šalia augančių augalų
			Medžių kelmams, krūmams, krūmokšniams	Saugo nuo atžėlimo.	2,5 ml/2–4 cm ² kelmo ploto			Nupjovus medį ar krūmą, iš karto užtepkite visą kelmo paviršių
18.	Taifun B Feinchemie Schwebda GmbH, 0261H/06, 2018-06-30	Glifosatas 360 g/l	Vaismedžių (obelų, kriaušių) pomedžiai	Daugiametės ir vienametės vienaskiltės ir dviskiltės. Purkšti, kai piktžolės aktyviai auga pavasarį, vasarą arba rudenį, apsaugant vaismedžius	200 ml apdorojant 500 m ²		1	
			Plotai, skirti sodams ir uogynams įveisti	Daugiametės ir vienametės vienaskiltės ir dviskiltės. Purkšti, kai piktžolės aktyviai auga, turi 3-4 lapelius arba yra 10-12 cm aukščio	150-200 ml apdorojant 500 m ²		1	

			Gėlynai, vejos	Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų!	1 dalis Taifun ir 3 dalys vandens			Aplikatoriaus šepetėliai turi būti ne arčiau kaip 10 cm iki kultūrinių augalų viršūnių. Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų!
			Plotai skirti kitų metų augalų auginimui	Daugiametės ir vienametės vienaskiltės ir dviskiltės. Purkšti po derliaus nuėmimo, kai piktžolės aktyviai auga, t.y. varpučiai yra 10-12 cm aukščio, o usnys ir kitos daugiametės piktžolės skrotelės tarsnyje	150 ml apdorojant 500 m ²		1	

Moliuskocidai

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Apdorojami augalai	Augalų apsaugos produkto paskirtis	Naudojimo reglamentai			
					Preparato kiekis g/m ²	Didžiausias apdorojimų skaičius	Karencijos laikotarpis	Pakuotė
1	Ferramol W.Neudorff GmbH KG, AS2-58M/2016 2031-12-31	Geležies fosfatas 9,9 g/kg	Uogynai, lauko ir uždaro grunto daržovės, dekoratyviniai augalai	Naudoti pastebėjus šliužų ir sraigčių pakenkimus	1,25–2,5	4		200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg
2.	Gusto Adama Registrations B.V., AS2-17M/2016, 2022-05-31	Metaldehidai 30 g/kg	Braškėms, auginamoms lauke ir šiltnamiuose	Naudoti pastebėjus šliužus ar jų pažeidimus ant augalų	60	2	ne vėliau nei pradeda formuotis dukteriniai augalai	0,25 kg, 0,5 kg, 0,75 kg, 1,0 kg, 5,0 kg.
			Bulvėms	Naudoti pastebėjus šliužus ar jų pažeidimus ant augalų	60	2	3 d.	

Morkoms, burokėliams, salierams, svogūnams, „shallot“ svogūnams, česnakams; pomidorams, baklažanams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose	Naudoti pastebėjus šliužus ar jų pažeidimus ant augalų	60	2	ne vėliau kaip iki matomi 9 augalo lapeliai
Žiediniams kopūstams	Naudoti pastebėjus šliužus ar jų pažeidimus ant augalų	60	2	ne vėliau kaip iki žiedynai pasiekia būdingą dydį ir formą
Gūžiniams kopūstams	Naudoti pastebėjus šliužus ar jų pažeidimus ant augalų	60	2	ne vėliau kaip iki gūžė pasiekia būdingą formą ir standumą
Lapiniams kopūstams	Naudoti pastebėjus šliužus ar jų pažeidimus ant augalų	60	2	ne vėliau kaip iki lapai pasiekia veislei būdingą dydį
Salotoms, špinatams, šviežiems prieskoniniams augalams, auginamiems lauke ir šiltnamiuose.	Naudoti pastebėjus šliužus ar jų pažeidimus ant augalų	60	2	ne vėliau kaip iki išsiskleidžia 9 tikrieji lapeliai
Šparaginėms pupelėms	Naudoti pastebėjus šliužus ar jų pažeidimus ant augalų	60	2	ne vėliau kaip iki pasirodant pirmiesiems pumpurams
Žirniams, pupelėms	Naudoti pastebėjus šliužus ar jų pažeidimus ant augalų	60	2	ne vėliau kaip iki išsiskleidžia

					9 tikrieji lapeliai
		Dekoratyviams augalams	Naudoti pastebėjus šliužus ar jų pažeidimus ant augalų	60	2

Repelentai

1. Cervacol extra Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG , AS2-58R(2017), 2020-08-31	Kvarcinis smėlis 251 g/kg	3,0-4,0 kg/1000 augalų	Lapuočių ir spygliuočių želdiniai	Saugo nuo stirnų ir elnių nugraužimo	Tepti lapuočių ir spygliuočių viršūninio ūglio 5-10 cm rudenį pasibaigus vegetacijai
2. Plantskydd Plantskydd AB AS2-61R(2016) 2020-08-31	Kraujo miltai 990 g/kg	Lapuočių, spygliuočių sodinukai, dekoratyviniai augalai	Apsaugo nuo kiškių, stirnų, elnių ir briedžių.	0,8-1,6 kg/1000 augalų.	Augalus apipurkšti arba aptepti nuo rugsėjo iki kovo mėnesio.
3. Trico Garden Kwizda Agro GmbH 0461R/13 2020-08-31	Avių riebalai 65 g/l	Spygliuočiams ir lapuočiams, dekoratyviams augalams	Apsaugo nuo elnių, stirnų, briedžių apgraužimo	10-20 ml/10 m ²	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus
3. WAM Extra Witasek Pflanzenschutz GmbH AS2-48R/2015 2020-08-31	Kvarcinis smėlis 300 g/kg	Lapuočių ir spygliuočių želdiniams	Apsaugo nuo kanopinių gyvūnų apgraužimo	2,5-4,0 kg/1000 augalų	Tepti lapuočių ir spygliuočių viršūtinio ūglio 5-10 cm rudenį, pasibaigus vegetacijai