

Eil.Nr.	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai	Piktžolės	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
1.	2,4-D Nufarm Nufarm GmbH & Co KG AS2-66H(2017) 2031-12-31	2,4-D 600 g/l	0,6-0,75	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29) arba	1	Naudoti produktą tik 1 kartą per auginimo sezoną	
			1,0-1,25	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti bamblėjimo pradžios–antrojo bamblio susidarymo tarpsniu (BBCH 30–32)	1		
			0,6–1,25	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi–antrojo bamblio susidarymo tarpsniu (BBCH 20–32)	1		
2.	Agroxone 75 Nufarm GmbH & Co KG 0131H/10 2020-02-08	MCPA 750 g/l	0,7-1,0	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo 3-4 lapelių iki pirmojo bamblio pasirodymo	1		
			0,7-1,0	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo 3-4 lapelių iki pirmojo bamblio pasirodymo	1		
			0,8-1,0	Javai su dobilų įsėliu	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai dobilai yra 1-2 tikrųjų lapelių, o javai – krūmijimosi tarpsnyje	1		
			1,0-1,3	Linai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai linai „eglutės“ tarpsnyje (3-8 cm aukščio)	1		
			1,3-1,7	Pievos, ganyklos	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purškiamos jaunos, aktyviai augančios piktžolės	1		Nešienauti ir neganyti galvijų 4 savaites po purškimo
			1,3-1,7	Varpinės žolės sėklai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purškiama aktyvaus piktžolių augimo metu	1		
3.	Accurate 200 WG Cheminova A/S AS2-23H(2017) 2024-03-31	Metsulfuron metilas 200 g/kg	10 g/ha	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29)	1	Per auginimo sezoną galima naudoti tik 1 kartą	
			20 g/ha	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai,	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki antrojo bamblio	1		

				miežiai		tarpsnio (BBCH 30–32)		
			10 g/ha	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo trečiojo šoninio lapo iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13–29)	1	
			20 g/ha	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo bamblių pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30–32)	1	
4.	Activus 330 EC Adama Registrations B.V. 0387H/10 2020-04-07	Pendimetalinas 330 g/l	4,0	Vasariniai miežiai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti po sėjos iki sudygimo arba sudygus, kai miežiai yra 1-3 lapelių tarpsnyje, iki kol piktžolės yra dviejų lapelių tarpsnio	1	
			4,0	Vasariniai miežiai su dobilų įsėliu	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti po sėjos iki sudygimo arba sudygus, kai miežiai yra 1-3 lapelių tarpsnyje, iki kol piktžolės yra dviejų lapelių tarpsnio. Purškiant po sudygimo dobilai turi turėti bent vieną tikrąjį lapelį	1	
			3,0	Pašariniai kukurūzai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti per 5 dienas po kukurūzų sėjos arba kukurūzams turint 1 - 4 lapelius	1	
			3,0	Žirniai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti nuo sėjos iki sudygimo arba kai žirniai yra 3-6 cm aukščio	1	
			2,0-3,0	Svogūnai, porai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Auginant iš sėklų, purkšti tuoj po svogūnų / porų sėjos, auginant iš ropelių, purkšti prieš sodinimą arba po sudygimo, kai svogūnai / porai turi ne mažiau 1 lapelį	Galima purkšti 2 kartus po 2,0 l/ha	
			4,0	Morkos, pastarnokai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti iki morkų / pastarnokų sudygimo arba kai morkos bei pastarnokai turi 2 visiškai išsivysčiusius lapelius	1	
			4,0	Briuselio kopūstai, gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai,	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti prieš kopūstų sudygimą arba prieš daigų persodinimą	1	

				brokoliai				
			4,0	Vyšnios, slyvos, obelys, kriaušės	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vėlai rudenį arba anksti pavasarį, kol augalai ramybės būklės	1	Nenaudoti pirmais vaismedžių pasodinimo metais
			4,0	Gervuogės, aviečių ir gervuogių hibridai, avietės, juodieji serbentai, agrastai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kol augalai ramybės būklės iki pumpurų susiformavimo	1	Nenaudoti pirmais uogakrūmių pasodinimo metais
			4,0	Braškės	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, braškių vegetacijos pabaigoje arba pavasarį, vėliausiai iki žiedyno pasirodymo	1	Nepurkšti ką tik pasodintų braškių, taip pat nepurkšti dirvos, kurioje bus sodinamos braškės
5.	Alister Grande OD Bayer AG 0327H/13, 2019-12-31	Natrio metiljodo-sulfuronas + metil mezosulfuronas+ diflufenikanas 4,5+6+180 g/l	0,8	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai	Vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti rudenį sudygus javams, nuo trečio lapelio išsiskleidimo iki matomo trečiojo šoninio ūglio tarpsnio (BBCH13-23)	1	Pakuotė: 5 l.
6.	Aminopielik 600 SL Adama Registrations B.V. 0366H/09 2019-02-25	2,4-dichlorfenoksi acto rūgštis 600 g/l	1,25	Žieminiai kviečiai, rugiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti javų krūmijimosi metu	1	
			1,25	Vasariniai kviečiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai turi 4-5 lapelius iki krūmijimosi tarpsnio pabaigos	1	
7.	Ariane S Dow AgroSciences Denmark A/S, 0229H/11, 2018-12-31	Fluoksipiras + klopuralidas + MCPA 40 + 20 + 200 g/l	2,0-2,5	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti pavasarį, kai javai yra krūmijimosi pradžioje – pirmojo bamblio tarpsnio (BBCH21-31)	1	Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l.
			2,0-2,5	Vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai yra krūmijimosi pradžioje – pirmojo bamblio tarpsnio (BBCH21-31)	1	
8.	Arrat BASF A/S, AS2-51H/2014 2019-11-30	Tritosulfuronas + dikamba 250 + 500 g/kg	0,2 kg/ha + 0,5 l/ha Dash	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti pavasarį, prasidėjus aktyviai vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13–29)	1	Pakuotė: 0,8 kg.
			0,15 kg/ha + 0,5 l/ha Dash	Vasariniai kviečiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai yra nuo 3 lapelių iki krūmijimosi vidurio (BBCH 13–25)	1	
			0,2 kg/ha + 0,5 l/ha Dash	Kukurūzai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai kukurūzai turi 3-5 lapelius (BBCH 13-15)	1	

9.	Attribut Bayer AG 0202H/06, 2019-01-31	Natrio propoksi- karbazonas 700 g/kg	0,06-0,1	Žieminiai kviečiai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės ir kai kurios vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami nuo 3 lapo išsiskleidimo iki krūmijimosi pabaigos. Varputis jautriausias, kai išskleidžia 3–5, o kitos piktžolės – 2–3 lapelius	1	
			0,06	Vasariniai kviečiai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės ir kai kurios vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami nuo 3 lapo išsiskleidimo iki krūmijimosi pabaigos. Varputis jautriausias, kai išskleidžia 3–5, o kitos piktžolės – 2–3 lapelius	1	
10.	Agil 100 EC Adama Registrations B.V., AS2-35H/2015 2022-11-30	Propakvizafopas 100 g/l	0,5-0,75 arba	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai, linai, bulvės, žieminiai ir vasariniai rapsai, vaismedžių pomedžiai, žirniai, brokoliai, gūžiniai kopūstai, svogūnai, česnakai, morkos, pašarinės pupos, garstyčios, baltieji ir raudonieji dobilai, braškės, juodieji ir raudonieji serbentai, avietės, agrastai, dekoratyviniai augalai	Vienametės vienaskiltės	Purkšti nuo piktžolių sudygimo iki krūmijimosi	1	Produktą galima naudoti tik 1 kartą per auginimo sezoną.

			0,75-1,0 arba	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai, linai, bulvės, žieminiai ir vasariniai rapsai, vaismedžių pomedžiai, žirniai, brokoliai, gūžiniai kopūstai, svogūnai, česnakai, morkos, pašarinės pupos, garstyčios, baltieji ir raudonieji dobilai, braškės, juodieji ir raudonieji serbentai, avietės, agrastai, dekoratyviniai augalai	Vienametės vienaskiltės	Purkšti piktžolių krūmijimosi–bambliųjimo metu	1	
			1,0 arba	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai, linai, bulvės, žieminiai ir vasariniai rapsai, vaismedžių pomedžiai, žirniai, brokoliai, gūžiniai kopūstai, svogūnai, česnakai, morkos, pašarinės pupos, garstyčios, baltieji ir raudonieji dobilai, braškės, juodieji ir raudonieji	Daugiametės vienaskiltės	Purkšti, kai piktžolės yra 3–5 lapelių stadijoje	1	

				serbentai, avietės, agrastai, dekoratyviniai augalai				
			1,5	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai, linai, bulvės, žieminiai ir vasariniai rapsai, vaismedžių pomedžiai, žirniai, brokoliai, gūžiniai kopūstai, svogūnai, česnakai, morkos, pašarinės pupos, garstyčios, baltieji ir raudonieji dobilai, braškės, juodieji ir raudonieji serbentai, avietės, agrastai, dekoratyviniai augalai	Daugiametės vienaskiltės	Purkšti piktžolių krūmijimosi–bamblėjimo metu	1	
11.	Avoxa (A19786A) Syngenta SP. z o.o., AS2-52H(2017), 2025-04-30	Pinoksadenas Piroksulamas 33,3 g/ + 8,33 g/l	1,35 – 1,8	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, vasariniai kviečiai	Dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios (matomas antras šoninis ūglis) iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 22–32)	1	
12.	Axial 50 EC Syngenta SP. z o.o., 0332H/07, 2018-12-31	Pinoksadenas 50 g/l	0,6	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Dirvinės smilguolės	Purkšti javų krūmijimosi pabaigoje- stiebo augimo metu	1	
			0,9	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Dirvinės smilguolės	Purkšti javų paskutinio lapo tarpsnyje		
			0,9	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Peliniai pašiaušėliai	Purkšti javų krūmijimosi pabaigoje- stiebo augimo metu	1	

			1,2	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Peliniai pašiaušėliai	Purkšti javų paskutinio lapo tarpsnyje		
			0,6	Vasariniai kviečiai, miežiai	Tuščiosios avižos	Purkšti javų krūmijimosi pabaigoje- stiebo augimo metu	1	
			0,9	Vasariniai kviečiai, miežiai	Tuščiosios avižos	Purkšti javų paskutinio lapo tarpsnyje		
13.	Banvel 4S Syngenta Crop Protection AG, AS2-28H/2014 2019-12-31	Dikamba 480 g/l	0,15 – 0,2	Žieminiai kviečiai, rugiai, miežiai, kvietrugiai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Pasėliai purškiami krūmijimosi tarpsniu (BBCH 21 – 29)	1	Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5l.
			0,15 - 02	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Pasėliai purškiami krūmijimosi tarpsniu (BBCH 21 – 29)	1	
			0,3 – 0,6	Kukurūzai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai kukurūzai turi 2 - 8 lapelių tarpsnyje, (BBCH 12 - 18)	1	
			0,3 – 1,0	Pūdymai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti pavasarį piktžolėms intensyviai augant iki žiedinių pumpurų pasirodymo	1	
			0,75	Ražienos	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti po derliaus nuėmimo sudygus išbirusioms sėkloms	1	
14.	Basagran 480 BASF A/S, 0038H/06, 2018-06-30	Bentazonas 480 g/l	2,0-3,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai; rugiai, avižos	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami javų krūmijimosi tarpsnyje	1	
			2,0-3,0	Javai su dobilų įsėliu	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami javų krūmijimosi tarpsnyje, o dobilai turi turėti nors vieną tikrąjį lapelį	1	
			2,0-3,0	Javai su liucernos įsėliu	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami javų krūmijimosi tarpsnyje, o liucerna turi turėti nors 1–2 tikruosius lapelius	1	
			2,0-3,0	Kukurūzai	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai išsiskleidžia 2–5 kukurūzų lapeliai	1	
			2,0-3,0	Linai	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami „eglutės“ tarpsnyje , t.y. 3–8 cm	1	

						aukščio, o piktžolės išskleidžia 3–5 lapelį		
			2,0-3,0	Žirnių-avižių, žirnių-miežių mišiniai grūdams	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai išsiskleidžia 3–6 žirnių lapeliai	1	
			2,0-3,0	Žirniai grūdams	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai išsiskleidžia 3–6 žirnių lapeliai	1	
			2,0-3,0	Vienmetės svidrės	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami svidrėms krūmijantis	1	
			3,0-4,0	Dobilai sėklai	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai dobilai yra 10–15 cm aukščio	1	
			2,0	Liucerna sėjos metais	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai išsiskleidžia bent 1–2 liucernos lapeliai (BBCH 11–12), o piktžolės yra sudygusios	1	
			2,0	Liucerna sėklai	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai liucerna yra 10–15 cm aukščio	1	
15.	Barbarian Super 360 Barclay Chemicals (R&D) Limited, AS2-45H/2015, 2017-12-17	Glifosatas 360 g/l	3,0	Žieminiai ir vasariniai javai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d.	1	Nenaudoti sėkliniams javų pasėliams
			3,0-4,0	Žirniai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, paruduoja 75% anksčių, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d	1	Nenaudoti sėkliniams žirnių pasėliams. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės. Didesnioji – daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės.
			3,0-4,0	Linai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 10 d.	1	Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės. Didesnioji – daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės
			3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės ir daugiametės	Purškama, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra	1	Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose. Mažesnioji norma

					vienaskiltės ir dviskiltės	mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d.		naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes
			2,0-4,0	Pūdymai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 d. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes
			2,0-4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 d. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes
			2,0-4,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	1-2 metų soduose naudoti tik su specialia kamienų apsauga. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes
16.	Barclay Barbarian Biograde 360 Barclay Chemicals (R&D) Limited, 0341H/07, 2017-12-17	Glifosatas 360 g/l	3,0	Žieminiai ir vasariniai javai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamas, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d.	1	Nenaudoti sėkliniams javų pasėliams
			3,0-4,0	Žirniai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamas, paruduoja 75% anksčių, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d	1	Nenaudoti sėkliniams žirnių pasėliams. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes.
			3,0-4,0	Linai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir	Purškiamas, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, kai iki	1	Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes,

					dviskiltės	derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 10 d.		mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės. Didesnioji – daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės
			3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d.	1	Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės. Didesnioji – daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės
			2,0-4,0	Pūdymai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 d. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės. Didesnioji – daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės
			2,0-4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 d. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės. Didesnioji – daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės
			2,0-4,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	1-2 metų soduose naudoti tik su specialia kamienų apsauga. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės. Didesnioji – daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės
17.	Barbarian Hi-Aktiv Barclay Chemicals (R&D) Limited, 0339H/07, 2017-12-17	Glifosatas 490 g/l	2,2	Žieminiai ir vasariniai javai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d.	1	Nenaudoti sėkliniams javų pasėliams
			2,2-2,9	Žirniai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, paruduoja 75% anksčiau, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d.	1	Nenaudoti sėkliniams žirnių pasėliams. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias

								daugiametės vienaskiltės. Didesnioji – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės.
		2,2-2,9	Linai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 10 d.	1	Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose. Mažesnioji norma naikina vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės. Didesnioji – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	
		2,2-2,9	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d.	1	Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose. Mažesnioji norma naikina vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės. Didesnioji – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	
		1,5-2,9	Pūdymai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 d. Mažesnioji norma naikina vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės. Didesnioji – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	
		1,5-2,9	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 d. Mažesnioji norma naikina vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės. Didesnioji – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	
		1,5-2,9	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	1-2 metų soduose naudoti tik su specialia kamienų apsauga. Mažesnioji norma naikina vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės. Didesnioji – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	

18.	Belkar Dow AgroSciences Denmark A/S AS2-68H(2017) 2019-12-31	haloksifen metilas pikloramas 10 g/l + 48 g/l	0,25	Žieminiai rapsai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti dviejų–penkių lapelių tarpsniu (BBCH 12– 15) arba	1	
			0,25	Žieminiai rapsai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti per du kartus: pirmą kartą – dviejų– penkių lapelių tarpsniu (BBCH 12–15), antrą kartą – ne anksčiau kaip po 3 savaičių, šešių–devynių lapelių tarpsniu (BBCH 16– 19) arba	2	
			0,5	Žieminiai rapsai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti šešių–devynių lapelių tarpsniu (BBCH 16– 19)	1	
19.	Belvedere Adama Registrations B.V AS2-27H(2017) 2018-07-31	fenmedifamas 160 g/l + desmedifamas 160 g/l	0,6	Cukriniai ir pašariniai runkeliai	Naikina dviskiltės piktžolės	Purkšti skilčialapių–8 lapelių tarpsniu (BBCH 10–18)	3	
20.	Belvedere extra Adama Registrations B.V. AS2-14H/2014 2018-07-31	Fenmedifamas + desmedifamas + etofumezatas 150+50+200 g/l		Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai	Vienametės dviskiltės ir kai kurias vienaskiltės	Purkšti po 0,75–1,25 l/ha, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnio, nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo tarpsnio	4	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.
21.	Betanal Expert Bayer AG 0113H/09, 2019-02-25	Fenmedifamas + desmedifamas + etofumezatas 91+71+112 g/l	3,0-3,75	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai	Dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Pasėliai purškiami per 3 kartus po 1,0-1,25 l/ha nepriklausimai nuo runkelių vystymosi tarpsnio, o piktžolėms esant skilčialapių tarpsnio, purškiant 2 kartus: pirmą kartą 1,3 l/ha, antrą - 1,7 l/ha, purškiant 1 kartą - 3,0	3	Nenaudoti burokėlių lapų maistui

						l/ha, kai runkeliai turi 4 tikrus lapelius.		
22.	Betanal Bayer AG 0355H/08 2018-10-18	Fenmedifamas 160 g/l	6,0	Derančios braškės	Vienmetės dviskiltės	Purškiama po tarpueilių purenimo ant naujai sudygusių piktžolių 3 kartus po 2 l/ha arba 2 kartus po 3 l/ha produkto, kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje	3	
				Naujai įveistas braškynas	Vienmetės dviskiltės	Purškiama praėjus vienai savaitei po daigų sodinimo 3 l/ha, purškimą pakartoti pasirodžius naujai piktžolių bangai naudojant 3,0 l/ha		
23.	Betanal MaxxPro OD Bayer AG 0452H/13 2019-12-31	Fenmedifamas + desmedifamas + etofomezatas + lenacilas 60 + 47 + 75 + 27 g/l		Cukriniai ir pašariniai runkeliai, raudonieji burokėliai	Dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purškšti per 3 kartus po 1,25–1,5 l/ha, pirmą kartą – cukriniams ir pašariniams runkeliams ar raudoniesiems burokėliams esant skilčialapių tarpsnio (BBCH 10), piktžolėms taip pat skilčialapių tarpsnio, antrą kartą – sudygus naujoms piktžolėms, t. y. po 5–10 dienų po pirmojo purškimo, trečią kartą – sudygus naujoms piktžolėms, t. y. po 5–10 dienų po antrojo purškimo.	3	Pakuotė: 1 l, 5 l, 15 l.
24.	Betasana UPL Europe Ltd., 0268H/04, 2019-07-31	Fenmedifamas 160 g/l	4,5	Cukriniais ir pašariniai runkeliai	Vienmetės dviskiltės	Purškiama 3 kartus po 1,5 l/ha, pirmą kartą, kai piktžolės yra skilčialapių stadijoje, nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo, antrą kartą po 5-8 dienų, trečią kartą po 10-14 dienų po antro purškimo. Per 2 kartus po 2,25 l/ha: pirmą kartą kai piktžolės yra iki 4 lapelių stadijos, o runkeliai	3	

						turi 2 lapelius, antrą kartą – po 5-10 dienų.		
25.	Biathlon 4D BASF A/S, 0467H/13, 2019-11-30	Tritosulfuronas + florasulamas 714 + 54 g/kg	0,055-0,070 + Dash	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, rugiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti pavasarį nuo 3 lapelių iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 13-39)	1	Pakuotė: 0,1 kg, 0,35 kg, 0,5 kg, 1,05 kg.
			0,040-0,070 + Dash	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo 3 lapelių tarpsnio iki paskutiniojo lapo tarpsnio (BBCH 13-39)	1	
26.	Boxer 800 EC Syngenta Crop Protection AG, 0308H/13, 2019-10-31	Prosulfokarbas 800 g/l	2,0-2,5	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, rugiai	Vienmetės vienskiltės ir dviskiltės	Purkšti po sėjos-iki sudygimo (BBCH 00-10)	1	Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l.
			3,0-4,0	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, rugiai	Vienmetės vienskiltės ir dviskiltės	Purkšti pradėjus dygti javams iki krūmijimosi pradžios (BBCH 11-21)		
			4,0-5,0	Žirniai	Vienmetės vienskiltės ir dviskiltės	Purkšti po sėjos-iki sudygimo (BBCH 00-10)	1	
			4,0-5,0	Bulvės	Vienmetės vienskiltės ir dviskiltės	Purkšti po sodinimo-iki sudygimo (BBCH 00-09). Ankstyvosioms bulvėms paskutinis purškimo terminas iki derliaus nuėmimo likus 42 dienoms.	1	
			4,0-5,0	Kmynai	Vienmetės vienskiltės ir dviskiltės	Purkšti po sėjos-iki sudygimo (BBCH 00-10)	1	
27.	Brasan 540 EC Syngenta Crop Protection AG AS2-23H/2014 2019-10-31	Dimetachloras + klomazonas 500+40 g/l	2,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purškama po sėjos iki sudygimo	1	Pakuotė: 5 l, 20 l.
28.	Butisan Avant BASF A/S, AS2-47H/2014	Metazachloras + dimetenamidas-P +kvinmerakas	2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės dviskiltės	Purkšti po sėjos iki sudygimo (BBCH00-09) arba skilčialapių-4 lapelių	1	Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l

	2018-10-31	300+100 +100 g/l				tarpsniu (BBCH 10-14)		
29.	Butisan Kombi BASF A/S, AS2-2H/2014 2018-10-31	Metazachloras + dimetenamidas-P 200+200 g/l	2,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti po sėjos iki sudygimo (BBCH00-09) arba skilčialapių-8 lapelių tarpsniu (BBCH 10-18)	1	Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.
30.	Butisan Star BASF A/S, AS2-28H/2015, 2020-07-31	Metazachloras + kvinmerakas 333 + 83 g/l	2,0-2,25	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės dviskiltės ir vienaskiltės	Pasėliai purškiami po sėjos iki išsiskleidžia 2 lapeliai, piktžolės neturėtų būti didesnės nei 3-4 lapelių	1	
31.	Butisan 400 BASF A/S, AS2-4H/2014 2020-07-31	Metazachloras 400 g/l	1,875	Žieminiai ir vasariniai rapsai, žieminiai ir vasariniai rapsiukai, garstyčios	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti po sėjos iki sudygimo (BBCH 00-09) arba skilčialapių-8 lapelių tarpsniu (BBCH 10-18)	1	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.
			1,875	Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, bruseliniai kopūstai, lapiniai kopūstai, brokoliai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti 7-12 d. po daigų išsodinimo	1	
32.	Butoxone Nufarm GmbH & Co.KG, 0402H/11 2021-02-14	MCPB 400 g/l	3,0-4,0	Žirniai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai žirniai turi 3-6 lapelius	1	
33.	Caliban Duo Stahler International GmbH&Co. KG, 0374H/09, 2019-06-15	Propoksikarbazona s + jodosulfuronas 168 + 10 g/kg	0,25	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Dirvinės smilguotės ir vienametės dviskiltės (išskyrus kibiuosius lipikus, jei jie labai išplitę)	Purkšti atsinaujinus vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos (BBCH29)	1	Pakuotė: 1 kg
			0,333	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Paprastieji varpučiai, peliniai pašiaušėliai ir vienametės dviskiltės (išskyrus kibiuosius lipikus, jei jie	Purkšti atsinaujinus vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos (BBCH29)		

					labai išplitę)			
			0,25	Žieminiai rugiai	Dirvinės smilguotės ir vienametės dviskiltės (išskyrus kibiuosius lipikus, jei jie labai išplitę)	Purkšti atsinaujinus vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos (BBCH29)	1	
34.	Calibre 50 SX DuPont Finland Ltd., 0325H/07, 2019-06-01	Tifensulfuronmetilas + tribenuronmetilas 333 + 167 g/kg	0,0225-0,03 + PAM	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, miežiai	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai javai yra nuo antro lapo tarpsnio iki paskutinio lapo pasirodymo		
			0,0225-0,03 + PAM	Vasariniai kviečiai, miežiai	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai javai yra nuo antro lapo tarpsnio iki paskutinio lapo pasirodymo		
			0,0225-0,03 + PAM	Javai su varpinių žolių įsėliu	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai javai yra nuo antro lapo tarpsnio iki paskutinio lapo pasirodymo		
35.	Caribou 50 WG Du Pont Finland Ltd., AS2-31H/2015, 2020-12-31	Triflusufluron metilas 500 g/kg	0,01-0,03 + PAM	Cukriniai ir pašariniai runkeliai	Dviskiltės	Purkšti per 2–3 kartus: pirmą kartą – kai sudygę 90 proc. runkelių ar burokėlių, o piktžolės yra skilčialapių tarpsnio, antrą ir trečią kartą – sudygus naujoms piktžolėms, kai jos yra skilčialapių tarpsnio	3	Didžiausia norma per sezoną 90 g/ha
			0,01-0,03	Cikorijos	Dviskiltės	Purkšti: pirmą kartą – kai sudygę 90 proc. cikorių, o piktžolės yra skilčialapių tarpsnio, antrą kartą – sudygus naujoms piktžolėms, kai jos yra skilčialapių tarpsnio	2	Didžiausia norma per sezoną 60 g/ha
36.	CDQ-SX Du Pont Finland Ltd., AS2-39H/2017,	Metsulfuron metilas + tribenuron	16 g/ha	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Dviskiltės	Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29)	1	produktą galima naudoti tik 1 kartą per auginimo sezoną

	2018-10-31	metilas 111 g/kg + 222 g/kg	27 g/ha	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai	Dviskiltės	Purkšti bamblėjimo tarpsniu (BBCH 30–39)	1		
			27 g/ha	Žieminiai miežiai	Dviskiltės	Purkšti bamblėjimo pradžios tarpsniu (BBCH 30)	1		
			27 g/ha	Vasariniai kviečiai, miežiai	Dviskiltės	Purkšti antro lapo– bamblėjimo pabaigos tarpsniu (BBCH 12–39)	1		
			18 g/ha	Avižos	Dviskiltės	Purkšti antro lapo– bamblėjimo pradžios tarpsniu (BBCH 12–30)	1		
37.	Ceridor MCPA 750 Nufarm GmbH & Co KG 0380H/10 2020-02-08	MCPA 750 g/l	0,7-1,0	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo 3-4 lapelių iki pirmojo bamblio pasirodymo	1		
			0,7-1,0	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo 3-4 lapelių iki pirmojo bamblio pasirodymo	1		
			0,8-1,0	Javai su doobilų įsėliu	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai dobilai yra 1-2 tikrųjų lapelių, o javai – krūmijimosi tarpsnyje	1		
			1,0-1,3	Linai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai linai „eglutės“ tarpsnyje (3-8 cm aukščio)	1		
			1,3-1,7	Pievos, ganyklos	Vienametės ir daugiametė dviskiltės	Purškiamos jaunos, aktyviai augančios piktžolės.	1		Nešienauti ir neganyti galvijų 4 savaites po purškimo
			1,3-1,7	Varpinės žolės sėklai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purškiamas aktyvaus piktžolių augimo metu	1		
38.	Centurion Plus Arysta Life Science S.A.S. AS2-22H/2015 2022-05-31	Kletodimas 120 g/l	1,0-2,0	Braškės	Vienametės ir daugiametės vienskiltės	Purkšti, kai braškės yra 2 pilnų lapelių tarpsnyje iki kol žiedai su vainiklapiais suformuoja vainikėlį (BBCH 12–59) arba po derliaus nuėmimo, kai vienametės vienskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių–iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienskiltės – 15–20 cm aukščio iki derliaus nuėmimo likus ne	1	Pakuotė: 1 l, 5 l.	

					mažiau kaip 30 d.	
		1,0-2,0	Bulvės	Vienametės ir daugiametės vienskiltės	Purkšti, kai išsiskleidžia pagrindinio stiebo antras lapas iki kol tarpueiliuose susilieja 30 proc. augalų (BBCH 12–33), vienametės vienskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių–iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienskiltės – 15–20 cm aukšči, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.	1
		1,0-2,0	Morkos	Vienametės ir daugiametės vienskiltės	Purkšti, kai išsiskleidę du tikrieji lapeliai, kol šaknis padidėja iki 50 proc. būdingo dydžio (BBCH 12–45), vienametės vienskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių–iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienskiltės – 15–20 cm aukšči, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 40 dienų.	1
		1,0-2,0	Svogūnai	Vienametės ir daugiametės vienskiltės	Purkšti, kai gerai matomas antras lapelis iki svogūnų gumbai yra 50 proc. skersmens (BBCH 12–45), vienametės vienskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių–iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienskiltės – 15–20 cm aukšči, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 56 dienoms.	1
		1,0-2,0	Baltagūžiai, raudongūžiai, briuseliniai, savojiniai kopūstai	Vienametės ir daugiametės vienskiltės	Purkšti, kai gerai matomas 2 lapelis iki kol augalai pradeda formuoti gūžes (BBCH 12–41), vienametės vienskiltės piktžolės yra	1

						nuo 3 lapelių–iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienskiltės – 15–20 cm aukščio, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.		
		1,0	Pupos	Vienametės ir daugiametės vienskiltės	Purkšti, kai pupos yra 2 tikrųjų lapelių tarpsnyje iki kol išsiskleidžia 9 ar daugiau lapelių (BBCH 12–19), vienametės vienskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių–iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienskiltės – 15–20 cm aukščio, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų.	1		
		1,0	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienskiltės	Purkšti, kai žirniai yra 2 tikrųjų lapelių tarpsnyje iki matomi 9 ar daugiau tarpubamblių (BBCH 12–39), vienametės vienskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių–iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienskiltės – 15–20 cm aukščio, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.	1		
		1,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienskiltės	Purkšti, kai rapsai turi 2 lapelius iki stiebo ilgėjimo pradžios (BBCH 12–30), vienametės vienskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių–iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienskiltės – 15–20 cm aukščio, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 90 dienų.	1		
		1,0-2,0	Cukriniai ir pašariniai	Vienametės ir daugiametės	Purkšti, kai išsiskleidę 2 tikrieji lapeliai, kol lapai	1		

				runkeliai, burokėliai	vienskiltės	uždengia 30 proc. tarpueilių (BBCH 12–33), vienametės vienskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių–iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienskiltės – 15–20 cm aukščio, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.		
			1,0	Linai	Vienametės ir daugiametės vienskiltės	Purkšti, kol linai pasiekia 20 cm aukščio, vienametės vienskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių–iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienskiltės – 15–20 cm aukščio, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 70 dienų.	1	
39.	Chwastox 750 SL CIECH Sarzyna S.A. 0378H/10, 2020-02-08	MCPA 750 g/l	1,0	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi metu	1	
			0,75	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi metu	1	
40.	Chwastox 500 SL CIECH Sarzyna S.A. 0427H/12, 2018-10-30	MCPA 500 g/l	1,5	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti pavasarį, atsinaujinus žieminių javų vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos	1	Pakuotė: 1 l, 5l, 10 l, 20 l
			1,1	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti javų krūmijimosi metu	1	
41.	Cleave Adama Registrations B.V. AS2-48H(2016) 2022-12-31	florasulamas 2,5 g/l + fluroksipiras 100 g/l.	1,0-1,21	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki vamzdelėjimo pradžios (BBCH 20–40)	1	
			0,8-1,0	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki vamzdelėjimo pradžios (BBCH 20–40)	1	
			1,5-1,8	Vejos, ganyklos, sėklinių žolių	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki vamzdelėjimo	1	

				pasėliai		pradžios (BBCH 20–40)		
42.	Cleravo BASF A/S AS2-43H(2017) 2019-07-31	imazamoksas + kvinmerakas 35 g/l + 250 g/l	0,8–1,0 l/ha + PAM	Hibridinių <i>Clearfield</i> veislių žieminiai rapsai	Vienmetės dviskiltės piktžolės	Purkšti rudenį, kai skilčialapiai visiškai išsiskleidę iki 8-ojo lapo tarpsnio (BBCH 10–18), arba pavasarį, atsinaujinus vegetacijai, nuo stiebo ilgėjimo pradžios iki kol butonai apgaubti lapais (BBCH 30–50)	1	
			0,8–1,0 l/ha + PAM	Hibridinių <i>Clearfield</i> veislių vasariniai rapsai, vasariniai rapsiukai	Vienmetės dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai skilčialapiai visiškai išsiskleidę iki 8-ojo lapo tarpsnio (BBCH 10– 18)	1	
43.	Clinic Up Nufarm GmbH&Co KG AS2-14H(2017), 2017-12-17	Glifosatas 360 g/l	3,0	Žieminiai ir javai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 14 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0-4,0	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai paruduoja 75% , ne vėliau kaip 14 dienų prieš pjūtį. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles.	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0-4,0	Linai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį . Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose

						piktžoles.		
			3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 14 dienų prieš pjūtį. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			2,0-4,0	Pūdymai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes.	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.
			2,0-4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės. Javų pabiros	Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.
			2,0-4,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes	1	1–2 metų soduose naudoti tik su specialia medžio kamienų apsauga
44.	Conviso One Bayer AG AS2-12H/2016 2020-07-31	foramsulfuronas metiltien karbazonas 50 g/l + 30 g/l.	1,0	Tik acetolaktato sintazės (ALS) herbicidams atsparios cukrinių	Dviskiltės ir vienaskiltės piktžolės	Purkšti, kai cukriniai runkeliai turi 4–8 tikruosius lapelius (BBCH 14–18), o piktžolės turi būti ne	1	

				runkelių veislės		didesnės kaip 4 lapelių (BBCH 14) tarpsnio		
			1,0	Tik acetolaktato sintazės (ALS) herbicidams atsparios cukrinių runkelių veislės	Dviskiltės ir vienaskiltės piktžolės	Purkšti, per du kartus po 0,5 l/ha, pirmą kartą kai cukriniai runkeliai yra nuo skilčialapių iki 4 lapelių išsivystymo tarpsnio (BBCH 10–14), o piktžolės ne didesnės kaip 2–4 lapelių (BBCH 12–14), antrą - 10–14 dienų po pirmojo purškimo, kai cukriniai runkeliai yra 2–8 lapelių tarpsnio (BBCH 12–18), o piktžolės ne didesnės kaip 2–4 lapelių (BBCH 12–14)	2	Gyvulius ganyti ir šienauti galima ne anksčiau kaip 14 dienų po purškimo.
45.	Dalgis XL Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-23H/2016 2018-12-31	Glifosatas 360 g/l	3,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0-4,0	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai paruduoja 75% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0-4,0	Linai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			2,0-4,0	Pūdymai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes
			2,0-4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienametės ir daugiametės	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

					vienaskiltės ir dviskiltės			Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės, didesnė – daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės
			2,0-4,0	Vaismedžių (obelų, kriaušių, vyšnių) pomedžiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti 1-2 metų vaismedžių sodų pomedžiuose. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės, didesnė – daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės
46.	Devrinol United Phosphorus Ltd. AS2-52H/2015 2021-09-15	Napropamidas 450 g/l	1,5-2,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Kai kurio dviskiltės ir vienaskiltės piktžolės	Purkšti paruošus dirvą sėjai, tuoj po purškimo, įterpti	1	
			1,5-2,0	Žiediniai kopūstai, brokoliai, gūžiniai, lapiniai kopūstai	Kai kurio dviskiltės ir vienaskiltės piktžolės	Purkšti paruošus dirvą sėjai, tuoj po purškimo, įterpti	1	
47.	Dicoherb super 750 SL Nufarm GmbH&Co KG 0436H/12 2019-12-31	MCPA + dicamba 660 + 90 g/l	1,0	Žieminiai kviečiai, rugiai	Vienametės dviskiltės	Purkšti pavasarį, prasidėjus intensyviai vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 31)	1	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l
			1,0	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Vienametės dviskiltės	Purkšti, kai javai yra nuo 3 lapelių iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13-31)	1	
48.	Diflanil 500 SC Globachem N.V., AS2-33H(2016) 2019-12-31	Diflufenikanas 500 g/l	0,125-0,25	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai, speltos kviečiai	Dviskilės piktžolės	Purkšti nuo purkšti nuo javų sudrygimo iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 09-29)	1	mažesnę normą naudoti mažoms piktžolėms naikinti.
			0,125	Vasariniai miežiai	Dviskilės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi vidurio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 26-29)	1	
49.	DMA 6 2,4-D Retro Dow Agro Sciences Danmark A/S, 0098H/07, 2017-12-17	2,4-dichlorfenoksi acto rūgštis 683 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purškama javų krūmijimosi metu	1	
			1,0-1,2	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purškama javų krūmijimosi metu	1	

			1,0-1,5	Kukurūzai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purškama, kai kukurūzai išleidžia 3-5 lapelius	1	
			0,6	Daugiametės varpinės žolės	Vienametės dviskiltės	Purškama daugiamečių žolių krūmijimosi metu	1	
			1,5	Daugiametės varpinės žolės	Daugiametės dviskiltės	Purškama daugiamečių žolių krūmijimosi metu	1	
50.	DMA 600 Dow AgroSciences Denmark A/S, AS2-67H(2017), 2031-12-31	2,4-D 600 g/l	0,5–0,75	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29)	1	Naudoti produktą tik 1 kartą per auginimo sezoną
			1,25	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti bamblių pradžios–antro bamblio susidarymo tarpsniu (BBCH 30–32)	1	
			0,75–1,25	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti krūmijimosi–antrojo bamblio susidarymo tarpsniu (BBCH 20–32)	1	
51.	Duplosan super Nufarm GmbH & Co KG, 0083H/11, 2021-02-14	Mekopropas-P + MCPA + dichlorpropas-P 130 + 160 + 310 g/l	1,5-2,5	Žieminiai kviečiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki bamblių pradžios (BBCH 21-30)	1	Pakuotė: 10 l.
			1,5-2,5	Vasariniai miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo antro lapo pasirodymo iki bamblių pradžios (BBCH 12-30)	1	
52.	Elegant 2FD Adama Registrations B.V., AS2-23H/2015 2017-12-31	Florasulamas 6,25 g/l 2,4 D 300 g/l	0,5–0,6	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purškama pavasarį atsinaujinus vegetacijai iki antrojo bamblio tarpsnio (iki BBCH 32)	1	
			0,4	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purškama, kai javai yra dviejų lapelių–antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 12–32)	1	
53.	Elumis 105 OD Syngenta Polska Sp. zo. o AS2-45H(2016) 2018-07--31	Mezotrionas 75 g/l + nikosulfuronas 30 g/l	1,0	Kukurūzai	Dviskiltės ir vienaskiltės piktžolės	Purkšti, kai kukurūzai turi 2–8 tikruosius lapelius (BBCH 12–18), piktžolės turi 1–3 lapelius, o varputis yra 10–15 cm aukščiau.	1	
54.	Estet 600 EC Nufarm GmbH & Co KG, 0313H/07, 2018-12-31	2,4 – dichlorfenoksi acto rūgštis 600 g/l	0,5-1,0	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purškama kai javai yra 4 lapelių – antro bamblio susiformavimo tarpsniuose.	1	Nenaudoti javuose su ankštinių žolių įsėliu
			0,5-1,0	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Vienametės ir daugiametės dviskiltės	Purškama kai javai yra 4 lapelių – antro bamblio susiformavimo tarpsniuose.	1	Nenaudoti javuose su ankštinių žolių įsėliu.

			0,5	Kukurūzai	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purškama iki kukurūzų 6 lapelių tarpsnio	1	
			1,0-2,0	Varpinės žolės	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purškama pavasarį, krūmijimosi – vamzdelėjimo tarpsnio pradžioje, kai daugiametės dviskiltės piktžolės yra lapų skrotelės vystymosi tarpsnyje.	1	Nenaudoti varpinių žolių pasėlyje su ankštinių žolių įsėliu.
			1,0-2,0	Ganyklos be ankštinių žolių	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purškama pavasarį, krūmijimosi – vamzdelėjimo tarpsnio pradžioje, kai daugiametės dviskiltės piktžolės yra lapų skrotelės vystymosi tarpsnyje.	1	Gyvulius ganyti ir šienauti galima ne anksčiau kaip 28 dienos po purškimo.
55.	Ergon Rotam Agrochemical Europe Limited 0384H/10 2020-04-01	Metsulfuron metilas 68 g/kg + tifensulfuron metilas 682 g/kg	15 g/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga	Žieminiai kviečiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi iki antrojo bamblio tarpsnio(BBCH 21-31)	1	Pakuotė: 120 g, 300 g, 500 g.
			10 g/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga	Vasariniai kviečiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai augalai turi tris lapelius iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 13-31)	1	
56.	Ethofol SC AgroDan A/S, 0172H/08, 2018-04-16	Etofomezatas 500 g/l	1,2	Cukriniai ir pašariniai runkeliai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Pasėliai purškiami Ethofol po 0,4 l/ha mišinyje su Betasana 1,5 l/ha ir alyvos 0,2-0,7 l/ha per 3 kartus.	3	
57.	Ethosat 500 SC Adama Registrations B.V. 0315H/07, 2018-07-31	Etofomezatas 500 g/l	0,8-1,2	Cukriniai ir pašariniai runkeliai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Pasėliai purškiami per 3 kartus po 0,4 l/ha mišinyje su Kontakt 320 SC ir Goltix 700 SC, kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje, nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo tarpsnio. Purškiant per 2 kartus po 0,6 l/ha mišinyje su Kontakt 320 SC ir Goltix 700 SC pirmą kartą, kai piktžolės yra iki 4 tikrųjų lapelių augimo tarpsnio.	3	

58.	Fenix Bayer AG 0305H/13 2020-07-31	Aklonifenas 600 g/l	2,5 -3,0	Bulvės	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti po galutinio vagų suformavimo (paskutinio bulvių kaupimo), bet ne vėliau kaip 1 savaitė iki bulvių daigų pasirodymo	1	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l.
			3,0	Žirniai, pupos	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purškiama po sėjos, iki žirnių ar pupų sudygimo	1	
			2,5	Morkos, pastarnokai, šakninės petražolės	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti vieną kartą prieš sudygimą 2,5 l/ha arba purkšti per du kartus: pirmą kartą prieš sudygstant pasėliams 1,5 l/ha, antrą kartą purškiama, kai daržovės turi 2 tikruosius lapelius, o piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje 1,0 l/ha.		
			2,5	Svogūnai, sodinami iš ropelių, česnakai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti vieną kartą prieš sudygimą 2,5 l/ha arba purkšti per du kartus: pirmą kartą iškart po svogūnų pasodinimo 1,5 l/ha, antrą kartą, kai daržovės turi 1-2 lapelius, o piktžolės yra skilčialapių tarpsnio 1,0 l/ha.		
			2,0	Kmynai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti po sėjos iki kmynų sudygimo	1	
			2,5	Lapinės petražolės	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti po sėjos iki lapinių petražolių sudygimo	1	
			2,0-3,0	Krapai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti po sėjos iki krapų sudygimo	1	

			2,5-3,0	Saulėgražos	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti po sėjos, bet ne vėliau kaip savaitė iki saulėgražų sudygimo	1	
			1,5-2,5	Gluosnių šeimos augalai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti po pasodinimo prieš naujų ūglių formavimąsi	1	
59.	Flight Forte BASF A/S, 0292H/06, 2019-03-31	Pendimetalinas + pikolinafenas 320 + 16 g/l	1,5-2,5	Žieminiai kviečiai, kviatrugiai, rugiai, miežiai	Vienametės dviskiltės ir kai kurias vienaskiltės piktžoles	Pasėliai purškiami rudenį, kai žieminiai kviečiai, kviatrugiai, rugiai, miežiai turi 1–3 lapelius (BBCH 11–13)	1	
60.	Focus ultra BASF A/S, AS2-50H/2016 2022-05-31	Cikloksidimas 100 g/l	1,0-4,0	Braškės	Vienametės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti braškes nuo pirmojo iki šešių lapelių tarpsnio (BBCH 11–16) iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltės piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius. Tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą
			1,0-4,0	Braškių tarpueiliai	Vienametės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti braškių tarpueilius vegetacijos metu	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltės piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.
			1,0-2,0	Briuseliniai kopūstai, lapiniai kopūstai, pekininiai kopūstai	Vienametės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki stiebas / lapų rozetė pasiekia 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13–35) iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltės piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius. Tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.
			1,0-2,0	Brokoliai, žiediniai kopūstai, gūžiniai kopūstai	Vienametės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki žiedynas / gūžė pasiekia 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13–45) iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltės piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius. Tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.
			1,0-4,0	Bulvės	Vienametės ir daugiametės	Purkšti nuo pirmo lapelio tarpsnio iki tarpvagių	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltės

				vienskiltės piktžolės, javų pabiros	uždengimo (BBCH 10–39) iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.		piktžolės, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius. Tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.
		1,0-4,0	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, raudonieji burokėliai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo antro lapelio tarpsnio iki tarpuvagių uždengimo (BBCH 12–39)	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienskiltės piktžolės, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius. Tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.
		1,0-4,0	Griežčiai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo trečio lapelio tarpsnio iki tarpuvagių uždengimo (BBCH 13–39)	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienskiltės piktžolės, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius. Tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.
		1,0-4,0	Tik cikloksidimui atsparios kukurūzų veislės	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo dviejų iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 12–19) iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienskiltės piktžolės, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.
		1,0-4,0	Linai, pluoštiniai ir auginami sėmenims	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti „eglutės“ tarpsnyje (BBCH 12–19)	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienskiltės piktžolės, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.
		1,0-4,0	Liucernos, auginamos sėklai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo vieno lapelio tarpsnio iki pirmųjų žiedynų pasirodymo (BBCH 11–51)	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienskiltės piktžolės, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius. Nenaudoti pašariniuose liucernų pasėliuose.
		2,0	Morkos	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo dviejų lapelių tarpsnio iki šaknys pasiekia 50 proc. būdingo dydžio (BBCH 12–45) iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienskiltės piktžolės, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

					kaip 35 dienoms.		Tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.
		1,0-4,0	Pastarnokai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki šaknys / gumbas pasiekia 50 proc. būdingo dydžio (BBCH 13–45)	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius. Nenaudoti pašariniuose liucernų pasėliuose.
		1,0-4,0	Šakninės petražolės	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo trijų iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 13–19) iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.
		1,0-4,0	Pupos ir žirniai, auginami grūdams	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo dviejų lapelių tarpsnio ar ūsų išsivystymo iki bamblėjimo pabaigos (BBCH 12–39) iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius. Tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.
		1,0-4,0	Pupos šviežiam naudojimui	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo dviejų lapelių tarpsnio iki bamblėjimo pabaigos (BBCH 12–39) iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius. Tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.
		1,0-4,0	Žirniai, šviežiam naudojimui	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo dviejų lapelių ar ūsų išsivystymo tarpsnio iki bamblėjimo pabaigos (BBCH 12–39) iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius. Tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.
		1,0-4,0	Vasariniai rapsai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo dviejų lapelių tarpsnio iki dviejų ištsusių tarpubamblių tarpsnio (BBCH 12–32)	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius. Tankesnė lapija trukdo įsisavinti

							herbicidą.
		1,0-2,0	Žieminiai rapsai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki dviejų išėjusių tarpbamblių tarpsnio (BBCH 13–32)	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius. Tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.
		1,0-4,0	Rapsukai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki bamblių pabaigos (BBCH 13–39)	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius. Tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.
		1,0-2,0	Šakniniai salierai, ropės	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki šaknys / gumbas pasiekia 50 proc. būdingo dydžio (BBCH 13–45) iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius. Tankesnė lapija trukdo įsisavinti herbicidą.
		1,0-2,0	Garbanotieji (savojiniai) kopūstai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki lapų rozetė / gūžė pasiekia iki 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13–45) iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 dienai.	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.
		1,0-4,0	Svogūnai, česnakai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo penkių lapelių tarpsnio iki svogūnelis pasiekia 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 15–45) iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.
		1,0-2,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti iki vaisiai pasiekia pusę veislei būdingo dydžio (iki BBCH 76) ne vėliau kaip liepos mėn., iki derliaus nuėmimo likus ne	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

					mažiau kaip 28 dienoms.		
		1,0-4,0	Dobilai, auginami sėklai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo dviejų lapelių tarpsnio iki pirmųjų žiedynų padidėjimo (BBCH 12–51),	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienskiltės piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius. Nenaudoti pašariniuose pasėliuose.
		1,0-4,0	Raudonieji eraičiai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo keturių lapelių iki ketvirtojo bamblio tarpsnio (BBCH 14–34)	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienskiltės piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius. Nenaudoti pašariniuose pasėliuose.
		1,0-4,0	Porai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo dviejų lapelių tarpsnio iki svogūnelis pasiekia 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 12–45) iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienskiltės piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.
		1,0-2,0	Salotos	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki lapų rozetė / gūžė pasiekia 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13–45) iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 diena.	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienskiltės piktžoles, 2,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.
		1,0-4,0	Krienai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės, javų pabiros	Purkšti nuo trijų lapelių tarpsnio iki lapų rozetė / gūžė pasiekia 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13–45) iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 diena.	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienskiltės piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.
		1,0-4,0	Gluosniai, auginami kurui	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės	Purkšti vegetacijos metu.	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienskiltės piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius
		1,0-4,0	Miško medžių ir krūmų sodmenys, auginami medelynuose	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės	Purkšti vegetacijos metu.	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienskiltės piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.

			1,0-4,0	Dekoratyviniai augalai, išskyrus miglinių šeimos augalus	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės piktžolės	Purkšti vegetacijos metu.	1	1,0–2,0 l/ha normą naudoti naikinant vienmetes vienskiltes piktžoles, 2,0–4,0 l/ha normą naudoti naikinant varpučius.
61.	Fornet 4 OD ISK BioSciences Europe N.V. 0445H/12 2019-12-31	Nikosulfuronas 40 g/l	0,75	Kukurūzai	Kai kurios vienametės vienskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai kukurūzai turi 3-4 lapelius, o vienametės dviskiltės ir vienskiltės piktžolės turi 2-4 lapelius	1	
62.	Fornet 6 OD ISK BioSciences Europe N.V. 0447H/12 2019-12-31	Nikosulfuronas 60 g/l	0,5	Kukurūzai	Vienametės ir kai kurios daugiametės vienskiltės ir vienametės dviskiltės	Purkšti, kai kukurūzai turi 3-4 lapelius, dviskiltės ir vienskiltės piktžolės turi 2-4 lapelius, o varputis 4-6 lapelius arba yra 15-25 cm aukščio	1	
63.	Fox 480 SC Adama Registrations B.V. 0398H/13 2019-12-31	Bifenoksas 480 g/l	0,75-1,0	Vasariniai rapsai	Vienametės dviskiltės	Purkšti, kai rapsai turi 3-6 lapelius 0,75-1,0 l/ha arba po 0,5 l/ha, kai rapsai turi 3-6 lapelius, kas 7-10 d.		Pakuotė: 5 l.
64.	Foxtrot 69 EW Cheminova A/S 0448H/12 2019-12-31	Fenoxaprop-P- etilas 69 g/l	1,0-1,2	Žieminiai kviečiai, rugiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Vienametės vienskiltės (dirvinės smilguolės, tuščiosios avižos, paprastosios rietmenės, peliniai pašiaušėliai)	Purkšti, kai javai yra nuo 3 lapelių iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13-32), o piktžolės yra nuo 2 lapelių iki krūmijimosi tarpinių (BBCH 12-29)	1	
			1,0	Vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai	Vienametės vienskiltės (dirvinės smilguolės, tuščiosios avižos, paprastosios rietmenės, peliniai pašiaušėliai)	Purkšti, kai javai yra nuo 3 lapelių iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13-32), o piktžolės yra nuo 2 lapelių iki krūmijimosi tarpinių (BBCH 12-29)	1	
65.	Fuego top Adama Registrations B.V.	Metazachloras + kvinmerakas	1,75-2,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės dviskiltės ir	Purkšti po sėjos - 3 tikrųjų lapelių tarpsniu (BBCH 00-	1	Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l

	AS2-6H/2015 2022-04-30	375 + 125 g/l			vienaskiltės piktžolės	13)		
66.	Fusilade forte 150 EC Syngenta Ltd., 0073H/01, 2017-12-31	Fluazifop-P- butilas 150 g/l	1,0-1,5	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės vienskiltės	Purškama kai piktžolės išskleidžia 2-4 lapelius	1	
			2,0-3,0	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės	Purškama kai piktžolės išskleidžia 4-6 lapelius	1	
67.	Galera Dow AgroSciences Denmark A/S, AS2-44H/2014 2019-04-30	Klopiralidas + pikloramas 267 + 67 g/l	0,3	Žieminiai rapsai	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti pavasarį nuo stiebo ilgėjimo pradžios iki kol lapai uždengia butonus (BBCH 30-50)	1	
			0,3	Vasariniai rapsai	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai vasariniai rapsai yra 2-4 lapelių (BBCH 12- 14) tarpsnio	1	
68.	Gallup Super 360 Barclay Chemicals (R&D) Limited AS2-37H/2015 2017-12-31	Glifosatas 360 g/l	3,0	Žieminiai ir vasariniai javai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d.	1	Nenaudoti sėkliniams javų pasėliams
			3,0-4,0	Žirniai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, paruduoja 75% anksčių, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d	1	Nenaudoti sėkliniams žirnių pasėliams. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes.
			3,0-4,0	Linai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 10 d.	1	Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes
			3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d.	1	Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes

			2,0-4,0	Pūdymai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 d. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes
			2,0-4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 d. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes
			2,0-4,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	1-2 metų soduose naudoti tik su specialia kamienų apsauga. Mažesnioji norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Didesnioji – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes
69.	GF-2573 Dow AgroSciences Denmark A/S, AS2-5H(2016), 2026-08-05	Haloksifenmetilas 7,81 g/l	0,4	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Vienmetės, kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti rudenį nuo pirmo lapo iki antro šoninio ūglio tarpsnio (BBCH 11–22)	1	Purškama 1 kartą per auginimo sezoną
			0,4	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Vienmetės, kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti pavasarį nuo trečio šoninio ūglio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 23–29)	1	Purškama 1 kartą per auginimo sezoną
			0,8	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Vienmetės, kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo stiebo ilgėjimo iki vamzdelėjimo tarpsnio vidurio (BBCH 30–45)	1	Purškama 1 kartą per auginimo sezoną
			0,4	Vasariniai kviečiai, miežiai	Vienmetės, kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo trečiojo lapo iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13–29)	1	Purškama 1 kartą per auginimo sezoną
			0,8	Vasariniai kviečiai, miežiai	Vienmetės, kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo stiebo ilgėjimo iki vamzdelėjimo tarpsnio vidurio (BBCH 30–45)	1	Purškama 1 kartą per auginimo sezoną

70.	Glyfer Generica Europa Ltd AS2-7H(2017), 2017-12-17	Glifosatas 360 g/l	3,0	Žieminiai ir javai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 14 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0-4,0	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai paruduoja 75% , ne vėliau kaip 14 dienų prieš pjūtį. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0-4,0	Linai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį . Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 14 dienų prieš pjūtį. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			2,0-4,0	Pūdymai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir	Purkšti vegetuojančias piktžoles Mažesnė norma naikina vienametes	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.

					dviskiltės	vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltės, didesnė – daugiameses vienaskiltės ir dviskiltės.		
			2,0-4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės. Javų pabiros	Purkšti vegetuojančias piktžolės. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltės, didesnė – daugiameses vienaskiltės ir dviskiltės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.
			2,0-4,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžolės. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltės, didesnė – daugiameses vienaskiltės ir dviskiltės	1	1–2 metų soduose naudoti tik su specialia medžio kamienų apsauga
71.	Glyphomax 480 Albaugh UK Ltd., 0439H/12, 2017-12-31	Glifosatas 480 g/l	1,5-2,25	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai, avižos	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį Nenaudoti sėkliniams pasėliams	1	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l, 640 l
			1,5-3,0	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai paruduoja 70-75% ankščių, ne vėliau kaip 10 dienų iki derliaus nuėmimo, ne daugiau kaip 1 kartą. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltės, didesnė – daugiameses vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės. Nenaudoti sėkliniams pasėliams.	1	

			2,25-3,0	Pupos	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai paruduoja 70-75% ankščių, ne vėliau kaip 10 dienų iki derliaus nuėmimo, ne daugiau kaip 1 kartą. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltes, didesnė – daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nenaudoti sėkliniams pasėliams	1	
			2,25-3,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai sėklų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį Nenaudoti sėkliniams pasėliams	1	
			2,25-4,5	Pūdymai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.	1	
			1,125-1,5	Ražienos	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.	1	
			2,25-3,0	Ražienos	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.		
			2,25-4,5	Sėklinių žolių ražienos	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	

			1,5-4,5	Vaismedžių (obelų, kriaušių, vyšnių, slyvų) pomedžiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis Nenaudoti 1–2 metų vaismedžių sodų pomedžiuose	1	
			0,75-1,5	Plotai prieš sėją	Javų pabiros	Purkšti vegetuojančias piktžoles prieš pavasarinį dirvos dirbimą	1	
			2,25	Plotai prieš sėją	Varpučiai	Purkšti vegetuojančias piktžoles prieš pavasarinį dirvos dirbimą		
			1,5-3,0	Sėjant į ražienas	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti po sėjos vegetuojančias piktžoles Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiames vienaskiltes, didesnė – daugiames vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Sėklos turi būti gerai įterptos į dirvą.	1	
72.	Glyphomax Plus Albaugh UK Ltd., 0328H/07, 2017-12-31	Glifosatas 360 g/l	3,0	Varpiniai javai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%. Nenaudoti sėkliniuose varpinių javų pasėliuose	1	Pakuotė: 10 l, 20 l
			2,0 – 4,0	Žirniai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai paruduoja 75% ankščių, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 14 d. Mažesnė norma naikina vienames vienaskiltes, dviskiltes ir mažai išplitusias daugiames vienaskiltes. Didesnė	1	

						norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose.		
		3,0-4,0	Linai	Vienmetės ir daugiamesės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 10 d. Mažesnė norma naikina vienameses vienaskiltes, dviskiltes ir mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes. Didesnė norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose.	1		
		3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės ir daugiamesės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%, kai iki derliaus nuėmimo lieka ne mažiau kaip 10 d. Mažesnė norma naikina vienameses vienaskiltes, dviskiltes ir mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes. Didesnė norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose	1		
		2,0-4,0	Pūdymai	Vienmetės ir daugiamesės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės. Mažesnė norma naikina vienameses vienaskiltes, dviskiltes ir	1		

						mažai išplitusias daugiamečių vienaskiltes. Didesnė norma naikina daugiamečių vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.		
			3,0-4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės ir daugiamečių vienaskiltes ir dviskiltes	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes, dviskiltes ir mažai išplitusias daugiamečių vienaskiltes. Didesnė norma naikina daugiamečių vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.	1	
			2,0-4,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės ir daugiamečių vienaskiltes ir dviskiltes	Purškiamos vegetuojančios piktžolės. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes, dviskiltes ir mažai išplitusias daugiamečių vienaskiltes. Didesnė norma naikina daugiamečių vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nenaudoti 1-2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos	1	
73.	Glyfos Bio 450 SL Cheminova A/S, 0295H/06, 2018-12-31	Glifosatas 450 g/l	2,4	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai	Vienmetės ir daugiamečių vienaskiltes ir dviskiltes	Purškiamas 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose

			2,4	Žirniai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% anksčių	1	Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose
			2,4-3,2	Lubinai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% anksčių.	1	Nenaudoti sėklinių lubinų pasėliuose.
			2,4-3,2	Linai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai sėklų drėgmė mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose.
			2,4-3,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai sėklų drėgmė mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose.
			2,4-4,0	Pūdymai, dirvonai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 2 savaitių
			2,4-3,2	Plotai, skirti žemės ūkio augalams sėti ar sodinti	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 2 savaitių
			2,4-3,2	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 2 savaitių
			2,4-4,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	1-2 m. soduose naudoti tik su specialia kamienų apsauga.
			3,0-5,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
74.	Go-Low Power Nufarm Limited 0350H/08 2018-04-11	MCPA 300 g/l	2,0	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti atsinaujinus vegetacijai iki pirmo bamblio susiformavimo tarpsnio (BBCH 13-30)	1	
			2,0	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai,	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki pirmo bamblio	1	

				miežiai, avižos		susiformavimo tarpsnio (BBCH 21-30)		
75.	Goltix 700 SC Adama Registrations B.V. AS2-15H/2015 2020-08-31	Metamitronas 700 g/l	3,0	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, burokėliai	Vienmetės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti, kai runkeliai ar burokėliai yra nuo skilčialapių iki 8 tikrųjų lapelių (BBCH 10–18) tarpsnio, o piktžolės turi 2–4 tikruosius lapelius: per 2 kartus – po 1,5 l/ha, per 3 kartus – po 1,0 l/ha, per 4 kartus – po 0,75 l/ha, kas 10–15 dienų.	3	Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l
76.	Goltix Super Adama Registrations B.V. AS2-13H/2015 2018-07-31	Metamitronas + etofumezatas 350+ 150 g/l	3,5-4,5	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, burokėliai	Vienmetės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti vegetacijos metu per 3 kartus: kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnio (nepriklausomai nuo runkelių ar burokėlių augimo tarpsnio): pirmą kartą 1,0 l/ha, antrą kartą 1,0-1,5 l/ha, trečią kartą 1,5-2,0 l/ha	3	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l
77.	Goltix Queen Adama Registrations B.V. AS2-22H/2014 2020-08-31	Metamitronas + kvinmerakas 525+ 40 g/l		Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai	Vienmetės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti po 1,5–2,0 l/ha, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnio, o runkeliai ar burokėliai skilčialapių – devynių lapelių išsivystymo tarpsnio (BBCH 10-19) ne daugiau kaip 3 kartus.	3	Pakuotė: 5 l.
78.	Granstar Premia 50 SX Du Pont Finland Ltd., 0278H/05, 2018-10-31	Tribenuron metilas 500 g/kg	0,015–0,0225	Žieminiai kviečiai, rugiai	Dviskiltės piktžolės	Purškama kai piktžolės turi 2–4 lapelius, javai yra nuo 2 lapelių iki paskutinio lapo tarpsnio	1	Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, nenaudoti augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra tribenuron metilas daugiau kaip 1 kartą per sezoną.
			0,015–0,0225	Vasariniai miežiai, kviečiai	Dviskiltės piktžolės	Purškama kai piktžolės turi 2–4 lapelius, javai yra nuo 2 lapelių iki paskutinio lapo tarpsnio	1	
79.	Grodyl Bayer AG 0097H/13, 2019-12-31	Amidosulfuronas 750 g/kg	0,020-0,040	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienmetės dviskiltės	Purkšti pavasarį atsinaujinus javų vegetacijai iki vamzdelėjimo tarpsnio pabaigos (BBCH 49)	1	Pakuotė: 500 g.

			0,020-0,040	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos.	Vienmetės dviskiltės	Purkšti nuo trečiojo lapo pasirodymo iki vamzdelėjimo tarpsnio pabaigos (BBCH 13–49)	1	
			0,020-0,040	Linai	Vienmetės dviskiltės	Purkšti, kai linai yra 3–12 lapelių tarpsnio	1	
80.	Hurler 200 EC Barclay Chemicals (R&D) Ltd AS2-70H(2017), 2022-12-31	Fluoksipiras 200 g/l	0,6	Žieminiai kviečiai, miežiai	Dviskiltės	Purkšti pavasarį, krūmijimosi–paskutinio lapo tarpsniu (BBCH 20–37)	1	
81.	Hussar Activ OD Bayer AG 0344H/08 2018-02-20	Natrio metil-jodsulfuronas+ 2,4-D 2- etilheksilo esteris 10+377 g/l	0,75-1,0	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai	Vienmetės vienaskiltės bei kai kurios daugiametės dviskiltės	Purškama nuo javų trečio lapo išsiskleidimo iki antro bamblio pasirodymo (BBCH 13-32)	1	Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20l.
82.	Hussar Activ Plus OD Bayer AG AS2-51H(2017) 2025-06-30	Natrio metil-jodsulfuronas+ 2,4-D 2- etilheksilo esteris + metiltienkarbazonas 300+10-7,5 g/l	1,0	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai	Dirvinės smilguolės, dviskiltės	Purkšti nuo trečio šoninio ūglio susiformavimo tarpsnio iki pasirodo pirmas bamblys (BBCH 23–31)	1	
				Žieminiai rugiai	Dirvinės smilguolės, dviskiltės	Purkšti nuo trečio šoninio ūglio susiformavimo tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 23–29)	1	
83.	Kalif 360 CS Adama Registrations B.V. 0421H/12 2019-10-31	Klomazonas 360 g/l	0,2-0,33	Žieminiai rapsai	Kai kurios dviskiltės ir vienaskiltės	Purkšti ne vėliau kaip 3 dienos po sėjos	1	
			0,15-0,25	Vasariniai rapsai	Kai kurios dviskiltės ir vienaskiltės	Purkšti ne vėliau kaip 3 dienos po sėjos	1	
			0,2-0,25	Bulvės	Kai kurios dviskiltės ir vienaskiltės	Purkšti pasodinus bulves, ne vėliau kaip 5 dienos iki sudygimo	1	
84.	Kalif mega Adama Registrations B.V. 0456H/13 2020-07-31	Metazachloras + klomazonas 250+ 33 g/l	2,5-3,0	Žieminiai rapsai	Dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti pirmas 3 dienas po sėjos	1	
			2,5	Vasariniai rapsai	Dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti pirmas 3 dienas po sėjos	1	

85.	Kyleo Nufarm GmbH & Co KG, AS2-11H/2014 2017-12-31	Glifosatas + 2,4-D 240+160 g/l	3,0-5,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienametės dviskiltės	Purškiama vegetacijos metu apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų. Pastaba: mažesnė norma naudojama, kai piktžolės nedidelės ir mažai išplitusios, didesnė – kai piktžolės didelės ir labai išplitusios.	1	Pakuotė: 0,25 l, 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l, 220 l, 640 l, 1000 l.
			4,0-5,0	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės dviskiltės ir vienametės vienaskiltės	Purškiama vegetacijos metu apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų. Pastaba: mažesnė norma naudojama, kai piktžolės nedidelės ir mažai išplitusios, didesnė – kai piktžolės didelės ir labai išplitusios.	1	
			5,0	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės	Purškiama vegetacijos metu apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų.	1	
			2,0-3,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienametės dviskiltės	Purkšti vegetacijos metu. Pastaba: mažesnė norma naudojama, kai piktžolės nedidelės ir mažai išplitusios, didesnė – kai piktžolės didelės ir labai išplitusios.	1	
			3,0-5,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės dviskiltės	Purkšti vegetacijos metu. Pastaba: mažesnė norma naudojama, kai piktžolės nedidelės ir mažai išplitusios, didesnė – kai piktžolės didelės ir labai išplitusios.	1	
			3,0	Laukai po derliaus	Vienametės	Purkšti vegetacijos metu	1	

			nuémimo	vienaskiltės				
			5,0	Laukai po derliaus nuémimo	Daugiametės vienaskiltės	Purkšti vegetacijos metu	1	
			2,0-3,0	Pūdymai, dirvonai	Vienametės dviskiltės	Purkšti vegetacijos metu. Pastaba: mažesnė norma naudojama, kai piktžolės nedidelės ir mažai išplitusios, didesnė – kai piktžolės didelės ir labai išplitusios.	1	
			3,0-5,0	Pūdymai, dirvonai	Daugiametės dviskiltės	Purkšti vegetacijos metu. Pastaba: mažesnė norma naudojama, kai piktžolės nedidelės ir mažai išplitusios, didesnė – kai piktžolės didelės ir labai išplitusios.	1	
			3,0	Pūdymai, dirvonai	Vienametės vienaskiltės	Purkšti vegetacijos metu	1	
			5,0	Pūdymai, dirvonai	Daugiametės vienaskiltės	Purkšti vegetacijos metu	1	
			2,0-3,0	Laukams prieš javų sėją	Vienametės dviskiltės	Purkšti vegetacijos metu. Pastaba: mažesnė norma naudojama, kai piktžolės nedidelės ir mažai išplitusios, didesnė – kai piktžolės didelės ir labai išplitusios.	1	
			3,0-5,0	Laukams prieš javų sėją	Daugiametės dviskiltės	Purkšti vegetacijos metu. Pastaba: mažesnė norma naudojama, kai piktžolės nedidelės ir mažai išplitusios, didesnė – kai piktžolės didelės ir labai išplitusios.	1	
			3,0	Laukams prieš javų sėją	Vienametės vienaskiltės	Purkšti vegetacijos metu	1	
			5,0	Laukams prieš javų sėją	Daugiametės vienaskiltės	Purkšti vegetacijos metu	1	
86.	Klean G Ventura Agrosience Ltd	Glifosatas 360 g/l	3,0	Žieminiai ir javai	Vienametės ir daugiametės	Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei	1	Nenaudoti sėklinuose pasėliuose

AS2-9H(2017), 2017-12-17				vienaskiltės ir dviskiltės	30% , ne vėliau kaip 14 dienų prieš pjūtį		
	3,0-4,0	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai paruduoja 75% , ne vėliau kaip 14 dienų prieš pjūtį. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	
	3,0-4,0	Linai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį . Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	
	3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 14 dienų prieš pjūtį. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	
	2,0-4,0	Pūdymai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.	

						daugiametės vienaskiltės, didesnė – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės.		
			2,0-4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės. Javų pabiros	Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės, didesnė – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.
			2,0-4,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės, didesnė – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	1	1–2 metų soduose naudoti tik su specialia medžio kamienų apsauga
87.	Komplet Bayer AG 0408H/11 2018-12-31	Flufenacetas + diflufenikanas 280+280 g/l	0,4-0,5	Žieminiai kviečiai, rugiai,, kvietrugiai, miežiai	Dirvinė smilguolė, dviskiltės piktžolės	Purkšti rudenį, kai sudygsta javai, iki trijų lapelių išsiskleidimo (BBCH 11-13) tarpsnio	1	Pakuotė: 1 l, 5 l, 15 l
88.	Kontakt 320 SC Adama Registrations B.V. 0316H/07, 2018-07-31	Fenmedifamas 320 g/l	1,5-3,0	Cukriniai ir pašariniai runkeliai	Vienmetės dviskiltės	Pasėliai purškiami per 3 kartus po 0,5 l/ha mišiniuose su Ethosat ir Goltix , kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje, nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo tarpsnio arba pirmą kartą Kontakt 320 SC 0,75 l/ha mišiniuose su Goltix , antrą kartą - Kontakt 320 SC 0,75 l/ha mišiniuose su Goltix, trečią kartą - Kontakt 320 SC 1,0 l/ha mišiniuose su Ethosat. Purškiant per 2 kartus: pirmą kartą, kai piktžolės yra iki 4 tikrųjų lapelių augimo tarpsnio Kontakt	3	

						320 SC 0,75 l/ha mišiniuose su Ethosat ir Goltix, antrą kartą 5-10 dienų po pimojo purškimo Kontakt 320 SC 0,75 l/ha mišiniuose su Ethosat ir Goltix.		
89.	Lancelot Dow AgroSciences Denmark A/S AS2-18H/2017 2025-12-31	Florasulamas + aminopiralidas 150 + 300 g/kg	15–25 g/ha + PAM	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai yra trečio šoninio ūglio–krūmijimosi pabaigos tarpsniuose (BBCH 23–29)	1	Per augimo sezoną žieminius kviečius, rugius, kvietrugius, miežius purkšti Lancelot galima tik 1 kartą
			33 g/ha + PAM	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai yra bamblių pradžios–antro bamblio tarpsniuose (BBCH 30–32)	1	Per augimo sezoną žieminius kviečius, rugius, kvietrugius, miežius purkšti Lancelot galima tik 1 kartą
			10 g/ha + PAM	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai yra trečio–devinto lapo tarpsniuose (BBCH 13–19)	1	Per augimo sezoną vasarinius kviečius, miežius, avižas purkšti Lancelot galima tik 1 kartą
			15–25 g/ha + PAM	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai yra krūmijimosi tarpsnyje (BBCH 21–29)	1	Per augimo sezoną vasarinius kviečius, miežius, avižas purkšti Lancelot galima tik 1 kartą
			33 g/ha + PAM	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai yra bamblių pradžios–antro bamblio tarpsniuose (BBCH 30–32)	1	Per augimo sezoną vasarinius kviečius, miežius, avižas purkšti Lancelot galima tik 1 kartą
90.	Legacy Pro Adama Registrations B.V. 0432H/12 2019-12-31	Diflufenikanas + pendimetalinas + chlorotoluronas 40+300+250 g/l	2,0	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, miežiai	Vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti rudenį, kai javai turi 1-3 lapelius (BBCH 10-13)	1	Pakuotė: 5 l, 10 l, 20
91.	Legacy 500 SC Adama Registrations B.V. AS2-24H/2014 2019-12-31	Diflufenikanas 500 g/l	0,15-0,2 arba 0,20-0,25 arba	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti po sėjos iki dviejų lapelių tarpsniu (BBCH 00-12) arba purkšti 3-4 lapelių tarpsniu	1	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

			0,15-0,20			(BBCH 13-14) arba purkšti pavasrį, atsinaujinus vegetacijai iki pirmojo bamblio tarpsnio (iki BBCH 31)		
			0,15-0,20	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti po sėjos iki pirmojo bamblio tarpsnio (BBCH 00- 31)	1	
92.	Leopard Adama Registrations B.V. 0450H/13 2022-11-30	Kvizalofop-P- etilas 50 g/l	1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai, cukriniai ir pašariniai runkeliai, morkos, bulvės, gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, Briuselio kopūstai, brokoliai, svogūnai, česnakai, žirniai, pupos, lubinai, linai	Vienametės vienaskiltės, javų pabiros	Purkšti, kai piktžolės turi 2- 4 lapelius	1	Pakuotė: 5 l, 10 l
			2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai, cukriniai ir pašariniai runkeliai, morkos, bulvės, gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, Briuselio kopūstai, brokoliai, svogūnai, česnakai, žirniai, pupos, lubinai, linai	Daugiametės vienaskiltės	Purkšti, kai piktžolės turi 4- 6 lapelius	1	
			2,0-2,5	Obelių pomedžiai, dekoratyviniai augalai	Daugiametės ir vienametės vienaskiltės	Purkšti, kai piktžolės turi 4- 6 lapelius	1	
			2,0-2,5	Miško želdiniai, miško medelynai	Daugiametės ir vienametės	Purkšti, kai piktžolės turi 4- 6 lapelius	1	

					vienaskiltės			
93.	Lentagran WP Belchim Crop Protection NV AS2-49H(2016) 2031-12-31	Piridatas 45%	0,5-2,0	Garbanotieji, raudongūžiai, baltagūžiai, lapiniai, pašariniai, briuseliniai kopūstai	Vienametės dviskiltės	Purkšti po sudygimo, kai augalai turi visiškai išsiskleidusius 4 tikruosius lapelius. Iš daigų auginami augalai purškiami 2–4 savaitės po pasodinimo, prigiję ir turintys 4–6 lapelius iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.	2	Per auginimo sezoną norma negali viršyti 2,0 kg/ha.
			0,5-1,0	Žiediniai kopūstai, brokoliai	Vienametės dviskiltės	Purkšti po sudygimo, kai augalai turi visiškai išsiskleidusius 4 tikruosius lapelius. Iš daigų auginami augalai purškiami 2–4 savaitės po pasodinimo, prigiję ir turintys 4–6 lapelius iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.	2	Per auginimo sezoną norma negali viršyti 2,0 kg/ha.
			0,5-1,0	Svogūnai auginami iš sėklų ir sėjinukų	Vienametės dviskiltės	Purkšti po sudygimo 1–4 lapelių tarpsnyje iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.	3	Per auginimo sezoną norma negali viršyti 2,0 kg/ha.
			0,5–1,0	Laiškiniai svogūnai	Vienametės dviskiltės	Purkšti nuo 3 lapelių tarpsnio (BBCH 13) iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.	2	Per auginimo sezoną norma negali viršyti 2,0 kg/ha.
			0,5–2,0	Porai	Vienametės dviskiltės	Purkšti po sudygimo 3 lapelių tarpsnyje arba po daigų pasodinimo. Jei po sėjos ar daigų pasodinimo buvo naudotas dirvinis herbicidas, <i>Lentagran WP</i> naudojamas, kai sudygsta nauja piktžolių banga (daugiausiai 4 lapelių tarpsnio) iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.	2	Per auginimo sezoną norma negali viršyti 2,0 kg/ha.

			0,5–2,0	Kaliaropės	Vienametės dviskiltės	Purkšti po sudygimo, kai augalai turi visiškai išsiskleidusius 4 tikruosius lapelius. Iš daigų auginami augalai purškiami 2 savaitės po pasodinimo iki 6 lapelių tarpsnio iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.	2	Per auginimo sezoną norma negali viršyti 2,0 kg/ha.
			0,5–2,0	Šparagai (senesni nei 2 metų augalai)	Vienametės dviskiltės	Purkšti iki sudygimo arba po derliaus nuėmimo	1	
			0,5–1,0	Naujai pasodinti šparagai	Vienametės dviskiltės	Purkšti nuo BBCH 21 tarpsnio ne didesne kaip 1 kg/ha norma	2	
			0,5–1,0	Česnakai	Vienametės dviskiltės	Purkšti nuo 3 lapelių tarpsnio (BBCH 13) iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.	2	Per auginimo sezoną norma negali viršyti 2,0 kg/ha.
			0,5–1,0	Askaloniniai česnakai	Vienametės dviskiltės	Purkšti po sudygimo 1–4 lapelių iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.	3	Per auginimo sezoną norma negali viršyti 2,0 kg/ha.
94.	Lontrel 72 SG Dow AgroSciences Denmark A/S, 0043H/11 2021-06-06	Klopivalidas 720 g/kg	0,125-0,165	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai yra krūmijimosi- paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 21-37) tarpsnio	1	Pakuotė: 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg
			0,125-0,165	Vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai yra krūmijimosi- paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 21-37) tarpsnio	1	
			0100-0,165	Žieminiai rapsai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai rapsų 1 tarpbamblys ištįsęs- žali butonai matosi iš viršaus (BBCH 31-51)	1	
			0100-0,165	Vasariniai rapsai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai rapsų išsivystęs antras lapas – žali butonai matosi iš viršaus (BBCH 12-51)	1	
			0,165	Kukurūzai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai kukurūzai turi 3-6 lapelius (BBCH 13-16)	1	
			0125-0,165	Cukriniai,	Dviskiltės	Purkšti, kai cukriniai ir	1	

				pašariniai runkeliai, burokėliai	piktžolės	pašariniai runkeliai arba burokėliai turi 2-4 tikruosius lapelius (BBCH 12-15). Usnims esant 15-20 cm aukščio naudoti 0,165 kg/ha normą		
			0,165	Braškės	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuėmus braškių derlių	1	
			0,125-0,165	Varpinės žolės sėklai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai varpinės žolės sėklai yra krūmijimosi-paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 21-37) tarpsnio	1	
			0,125-0,165	Ganyklos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai ganyklos yra krūmijimosi-paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 21-37) tarpsnio	1	
			0,125	Linai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai linai yra pirmųjų tikrųjų lapelių-eglutės (BBCH 12-19) tarpsnio, o piktžolės – skrotelės tarpsnio	1	
			0,125-0,165	Gūžiniai, žiediniai kopūstai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai kopūstai yra vėlesnio nei dviejų tikrųjų lapelių tarpsnio (>BBCH 12), o piktžolės – skrotelės tarpsnio	1	
			0,125-0,165	Juodieji ir raudonieji serbentai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti serbentų pokrūmius, apsaugant žaliąsias serbentų dalis, kai piktžolės yra skrotelės tarpsnio	1	
95.	Maister OD Bayer AG 0363H/09 2019-02-25	Foramsulfuronas + natrio metil jodosulfuronas 30 g/l + 1 g/l	1,5	Kukurūzai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai kukurūzai turi 2-6, o piktžolės 2-3 lapelius	1	
96.	Maister WG Bayer AG 0287H/06, 2019-07-31	Foramsulfuronas + natrio metil jodosulfuronas 300 g/l + 10 g/l	0.15 + 2,0 l/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos	Kukurūzai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama kai kukurūzai turi 2-6, o piktžolės 2-3 lapelius	1	

97.	Maister Power OD Bayer AG 0363H/09 2020-07-31	Foramsulfuronas + natrio metil jodosulfuronas + tienkarbazon metilas 31,5 g/l + 1 g/l + 10 g/l		Kukurūzai	Dviskiltės ir vienaskiltės piktžolės	Purkšti vegetacijos metu nuo antrojo iki šeštojo lapo pasirodymo (BBCH 12-16)	1	
98.	MCPA 750 Nufarm GmbH & Co KG 0116H/10, 2020-02-08	MCPA 750 g/l	0,7-1,0	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo 3-4 lapelių tarpsnio iki pirmojo bamblio pasirodymo	1	Nešienauti ir neganyti galvijų 4 savaites po purškimo
			0,7-1,0	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo 3-4 lapelių tarpsnio iki pirmojo bamblio pasirodymo	1	
			0,8-1,0	Javai su dobilų įsėliu	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai dobilai yra 1-2 tikrųjų lapelių, o javai - krūmijimosi tarpsnyje	1	
			1,0-1,3	Linai	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai linai „eglutės“ tarpsnyje (3-8 cm aukščio)	1	
			1,3-1,7	Pievos, ganyklos	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purškiamos jaunos, aktyviai augančios piktžolės	1	
99.	MCPA Classic 750 SL CIECH Sarzyna S.A. AS2-21H/2016 2018-10-31	MCPA 750 g/l	1,0	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės piktžolės	Purkšti krūmijimosi metu	1	
			0,75	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės piktžolės	Purkšti krūmijimosi metu	1	
100.	MCPA Super Nufarm GmbH & Co KG 0118H/10, 2020-02-08	MCPA 500 g/l	1,0-1,5	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo 3-4 lapelių tarpsnio iki pirmojo bamblio pasirodymo	1	
			1,0-1,5	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo 3-4 lapelių tarpsnio iki pirmojo bamblio pasirodymo	1	
			0,8-1,2	Javai su dobilų įsėliu	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai dobilai yra 1-2 tikrųjų lapelių, o javai - krūmijimosi tarpsnyje	1	

			2,0	Bulvės	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti iki bulvių sudygimo vegetuojančias piktžoles	1	
			1,0	Bulvės	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai bulvės yra 3-8 cm aukščio	1	
			1,5-2,0	Pievos ir ganyklos	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai piktžolės jaunos ir aktyviai auga	1	Nešienauti ir neganyti galvijų 4 savaites po purškimo
			0,8-1,2	Raudonieji dobilai sėklai	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti sėklų nuėmimo metais nuo atžėlimo pradžios 2-3 savaičių laikotarpyje	1	Kūlenas gyvuliams šerti galima naudoti tik praėjus 45 dienoms po purškimo
101.	Metafol 700 SC United Phosphorus Ltd. AS2-54H/2015 2020-08-31	Metamitronas 700 g/l	1,0-3,0 l/ha	Cukriniai ir pašariniai runkeliai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės piktžolės	Purkšti pirmą kartą, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje, antrą kartą – po 7–10 d., trečią kartą – praėjus 14–16 d. po antro purškimo. Purkšti 3 kartus po 1,0 l/ha, arba 1 kartą po 3,0 l/ha.	3	Didžiausia norma per sezoną 3,0 l/ha.
102.	Metazamix Dow Agro Sciences Denmark A/S AS2-21H/2015 2019-12-31	Pikloramas + aminopiralidas + metazachloras 13,3 + 5,3 + 500 g/l	0,8	Žieminiai rapsai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo skilčialapių iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 10–14)	1	Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l.
			1,0	Vasariniai rapsai, rapsiukai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti po sėjos iki sudygimo (BBCH 00–09)	1	
			0,75 + paviršiaus aktyvioji medžiaga Dassoil	Vasariniai rapsai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo skilčialapių iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 10–14)	1	
103.	Metric Belchim Crop Protection NV 0385H/10 2020-04-07	Klomazonas + metribuzinas 60 + 233 g/l	1,0-1,5	Bulvės	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti iki piktžolių ir bulvių sudygimo	1	Pakuotė: 5 l
104.	Mezzo WG Nufarm GmbH & Co KG	Metsulfuron metilas 200 g/kg	15 g/ha + PAM	Žieminiai kviečiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti pavasarį, nuo krūmijimosi tarpsnio	1	

	AS2-56H(2017) 2024-03-31					pradžios iki paskutinio lapo augimo tarpsnio (BBCH 20–39)		
			15 g/ha + PAM	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi tarpsnio pradžios iki paskutinio lapo augimo tarpsnio (BBCH 20–39)	1	
105.	Milagro 4 OD ISK BioSciences Europe N.V. 0270H/12, 2019-12-31	Nikosulfuronas 40 g/l	0,75	Kukurūzai	Kai kurios vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai kukurūzai turi 3- 4 lapelius, o vienametės dviskiltės ir vienaskiltės piktžolės turi 2–6 lapelius	1	Pakuotė: 5 l.
106.	Milagro 240 Cheminova A/S AS2-9H/12, 2019-12-31	Nikosulfuronas 240 g/l	0,125	Kukurūzai	Vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetacijos metu, kai kukurūzai turi 2-8 lapus	1	Pakuotė: 1l, 5 l.
107.	Milagro extra 6 OD ISK BioSciences Europe N.V. 0440H/2016, 2019-12-31	Nikosulfuronas 60 g/l	0,5	Kukurūzai	Vienametės ir kai kurias daugiametės vienaskiltės ir vienametės dviskiltės	Purkšti, kai kukurūzai turi 3- 4 lapelius, o dviskiltės ir vienametės vienaskiltės piktžolės turi 2–6 lapelius, varputis 4–6 lapelius arba yra 15–25 cm aukščio	1	Pakuotė: 5 l.
108.	Monosate G Monsanto Crop Sciences Denmark A/S AS2-11H/2016, 2017-12-17	Glifosatas 360 g/l	3,0	Žieminiai ir javai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 14 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0-4,0	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai paruduoja 75% , ne vėliau kaip 14 dienų prieš pjūtį. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltės piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles.	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0-4,0	Linai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį . Mažesnė norma naikina vienmetes	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose

					vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiamečių vienaskiltės piktžolės. Didesnioji norma naikina daugiamečių vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės.		
		3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiamečių vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 14 dienų prieš pjūtį. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusias daugiamečių vienaskiltės piktžolės. Didesnioji norma naikina daugiamečių vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės.	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
		2,0-4,0	Pūdymai	Vienametės ir daugiamečių vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžolės. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusias daugiamečių vienaskiltės, didesnė – daugiamečių vienaskiltės ir dviskiltės.	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.
		2,0-4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienametės ir daugiamečių vienaskiltės ir dviskiltės. Javų pabiros	Purkšti vegetuojančias piktžolės. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusias daugiamečių vienaskiltės, didesnė – daugiamečių vienaskiltės ir dviskiltės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.
		2,0-4,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienametės ir daugiamečių vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžolės. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusias daugiamečių vienaskiltės, didesnė – daugiamečių	1	1–2 metų soduose naudoti tik su specialia medžio kamienų apsauga

						vienaskiltės ir dviskiltės		
109.	Mustang Dow AgroSciences Danmark A/S, 0212H/06, 2018-06-22	Florasulamas + 2,4-D 2- etiloheksilo esteris 6,25 + 452,5 g/l	0,4-0,6	Žieminiai kviečiai	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius, o žieminiai kviečiai - 2 lapelius, iki kol susiformuoja antras bamblys. Didesniąją normą naudoti, kai pasėlyje želia raudonžiedė notrelė, dirvinė usnis.	1	Pakuotė: 5 l
			0,4-0,6	Vasariniai kviečiai, miežiai	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius, o javai - 2 lapelius, iki kol susiformuoja antras bamblys. Didesniąją normą naudoti, kai pasėlyje želia raudonžiedė notrelė, dirvinė usnis	1	
110.	Mustang Forte Dow AgroSciences Denmark A/S, AS2-17H(2017), 2025-12-31	Aminopiralidas + Florasulamas + 2,4-D etilheksilo esteris 10 + 5 + 180 g/l	0,5-1,0	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 21-32)	1	Pakuotė: 2 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l, 210 l
			0,5-0,8	Vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 21-32)	1	
111.	Nicogan Adama Registrations B.V. AS2-38H/2014 2019-12-31	Nikusulfuronas 40 g/l	0,75	Kukurūzai	Kai kurios vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai kukurūzai yra 2-8 lapelių tarpsnio	1	Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l.
112.	Nimbus Gold BASF A/S AS2-39H/2015 2019-10-31	Metazachloras + dimetenamidas-P + klomazonas 200 + 200 + 40 g/l	2,0-2,5 l/ha	Žieminiai rapsai	Vienametės dviskiltės ir vienaskiltės	Purkšti iki sudygimo (BBCH 00–09)	1	Pakuotė: 0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l
113.	Nimbus SE BASF A/S AS2-5H/2014 2019-10-31	Metazachloras + klomazonas 250 + 33,3 g/l	2,0-3,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės dviskiltės ir vienaskiltės	Purkšti 3 dienos po sėjos (BBCH 00-09)	1	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l.
114.	Nortron Bayer AG AS2-81H(2017), 2032-10-31	Etofumezatas 500 g/l	0,8	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji	Vienmetės dviskiltės	Purkšti, kai augalai yra skilčialapių tarpsnyje, iki kol išaugina 8 tikruosius lapelius (BBCH 10–18), o	3	Neviršyti 2,0 l/ha per auginimo sezoną

				burokėliai		piktžolės yra ankstyvuosiuose augimo tarpsniuose		
115.	Novitron DAM TEC FMC Chemical sprl AS2-80H(2017) 2017-11-30	aklonifenas + klorazonas 500 + 30 g/kg.	2,4	Bulvės	Dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės piktžolės	Purkšti po sodinimo ir vagų suformavimo, ne vėliau kaip 5 dienas iki bulvių sudygimo	1	
			2.4	Pupos, žirniai	Dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės piktžolės	Purkšti 2 dienas po sėjos	1	
116.	Nuance 75 WG Cheminova A/S 0441H/12 2018-10-31	Tribenuron metilas 750 g/kg	0,01 + paviršiaus aktyvioji medžiaga <i>PAM extra</i>	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai.	Dviskiltės	Purkšti pavasarį, atsinaujinus javų vegetacijai iki paskutiniojo lapo tarpsnio (iki BBCH39)	1	Pakuotė: 0,1 kg, 0,25 kg, 0,5 kg
			0,0075 + paviršiaus aktyvioji medžiaga <i>PAM extra</i>	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Dviskiltės	Purkšti, kai javai yra 4 lapelių- matomo trečiojo šoninio ūglio (BBCH14-23) tarpsniuose	1	
117.	Nufarm MCPA Nufarm GmbH & Co KG 0064H/10, 2020-02-08	MCPA 750 g/l	1,0-1,3	Linai	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai linai „eglutės“ tarpsnyje (3-8 cm aukščio)	1	
			0,7-1,0	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo 3-4 lapelių iki pirmo bamblio pasirodymo	1	
			0,7-1,0	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti nuo 3-4 lapelių iki pirmo bamblio pasirodymo	1	
			0,8-1,0	Javai su dobilų įsėliu	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai dobilai yra 1-2 tikrųjų lapelių, o javai krūmijimosi tarpsnyje	1	
			1,3-1,7	Pievos ir ganyklos	Vienmetės ir daugiametės dviskiltės	Purškiamos jaunos, aktyviai augančios piktžolės	1	
118.	Optica Trio Nufarm GmbH & Co KG 0197H/11 2021-02-14	Mekopropas-P + dichlorpropas-P + MCPA 130+310+160 g/l	1,5-2,5	Žieminiai kviečiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki bamblių pradžios (BBCH 21-30)	1	Pakuotė: 10 l.
			1,5-2,5	Vasariniai miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo antro lapo pasirodymo tarpsnio iki bamblių pradžios (BBCH	1	

119.	Ouragan with system 4 Syngenta Ltd., 0244H/06, 2018-12-31	Glifosatas 360 g/l	3,0	Laukai, skirti žemės ūkio augalų sėjai ar sodinimui	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	12-30)	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo.	1	
			5,0	Laukai, skirti žemės ūkio augalų sėjai ar sodinimui	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo.	1		
			4,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos	
			5,0	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1		
			3,0	Žieminiai kviečiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniams žeminių kviečių pasėliams	
			4,0	Žieminiai kviečiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2 savaitės iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%	1		
			3,0	Bulvės	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 2–3 dienos iki bulvių sudygimo	1		
			4,0	Bulvės	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 2–3 dienos iki bulvių sudygimo	1		

			2,0	Grikliai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiama iki grikių sėjos	1		
			3,0	Grikliai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama iki grikių sėjos	1		
			3,0	Pūdymai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	
			5,0	Pūdymai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1		
120.	Quick 5% EC Sharda Europe b.v.b.a. 0464H/13 2020-11-30	Kvizalofop-P-etilas 50 g/l	1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės vienaskiltės	Purkšti, kai piktžolės yra dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsnių (BBCH 12–29)	1		Pakuotė: 5 l.
			2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Paprastieji varpučiai	Purkšti, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio	1		
121.	Pantera 40 EC Arysta LifeScience Great Britain Ltd AS2-18H/2014 2020-11-30	Kvizalofop-P-tefurilas 40 g/l	0,6	Žieminiai rapsai	Javų pabiros	Purkšti, kai javų pabiros yra 2-5 lapelių tarpsnio	1	Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.	
			1,0	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai, žieminiai ir vasariniai rapsai, linai, bulvės, pupos, žirniai, morkos	Vienmetės vienskiltės (tuščiosios avižos, paprastosios rietmenės, tikrosios soros)	Purkšti, kai piktžolės yra nuo 2 lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos	1		
			1,0–1,5	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai, žieminiai ir	Varpučiai	Purkšti, kai varpučiai yra 4–6 lapelių tarpsnio iki stiebo augimo pradžios (mažiausiai 10-15 cm aukščio)	1		

				vasariniai rapsai, linai, bulvės, pupos, žirniai, morkos				
			1,75	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai, žieminiai ir vasariniai rapsai, linai, bulvės, pupos, žirniai, morkos	Varpučiai, kai jų >50 vnt./m ²	Purkšti, kai varpučiai yra nuo 4 lapelių tarpsnio, kol pirmas bamblys pakyla daugiau kaip 1 cm	1	
122.	Pixxaro EC Dow AgroSciences Denmark A/S, AS2-47H(2016) 2022-12-31	Haloksifenmetilas 12,5 g/l + Fluroksipiras 280 g/l.	0,25	Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietrugiai	Vienmetės dviskiltės	Purkšti nuo trečiojo šoninio ūglio tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 23–29)	1	
			0,4	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Vienmetės dviskiltės	Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki išsiskleidžia paskutinis lapas (BBCH 30– 39)	1	
			0,5	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Vienmetės dviskiltės	Purkšti nuo vamzdelėjimo pradžios iki paskutiniojo lapo lapamakštės sustorėjimo (BBCH 40–45)	1	
			0,25	Vasariniai kviečiai, miežiai	Vienmetės dviskiltės	Purkšti nuo pirmojo šoninio ūglio tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 21–29)	1	
			0,35	Vasariniai kviečiai, miežiai	Vienmetės dviskiltės	Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki paskutinio lapo lapamakštės sustorėjimo (BBCH 30–45)	1	
123.	Powertwin 400 SC Adama Registrations B.V. 0348H/08 2018-07-31	Fenmedifamas + etofumezatas 200+200 g/l	4,5-5,0	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, raudonieji burokėliai	Dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Kai purškama per 3 kartus, naudojama po 1,5 – 1,65 l/ha: pirmą kartą – kai piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnio (nepriklausomai nuo runkelių ar burokėlių augimo tarpsnio); antrą	3	Pakuotė: 1 l, 5 l

						<p>kartą - praėjus 5-10 dienų po pirmojo purškimo, trečią - 5-10 dienų po antrojo purškimo. Kai purškiama per 2 kartus, naudojama po 2,0 - 2,5 l/ha: pirmą kartą - runkeliams turint 2 tikruosius lapelius (kai piktžolės turi ne daugiau kaip 2 lapelius); antrą kartą - sudygus naujoms piktžolėms (praėjus 5-10 dienų po pirmojo purškimo). Kai purškiama tik 1 kartą, naudojama 4,5 – 5,0 l/ha herbicido runkeliams ar burokėliams turint 4 tikruosius lapelius(kai piktžolės turi 2 ir daugiau lapelių).</p>		
124.	Premazor Turbo Q-Chem NV, AS2-36H(2016), 2017-12-31	diflufenikanas 40 g/l + glifosatas 250 g/l	3,0	Ne žemės ūkio paskirties plotai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti piktžolių vegetacijos metu	1	saugoti, kad produktas nepatektų ant augalų, kurių nesiekama sunaikinti
			3,0	Miškų plotai, medelynai, gluosinių auginamų kurui, plantacijos	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti piktžolių vegetacijos metu	1	neuždengus augalų galima purkšti ne vėliau kaip 10 dienų iki pumpurų išsiskleidimo, praskleidus pumpurams purkšti apsaugant augalus, kurių nesiekama sunaikinti
			3,0	Dekoratyviniai augalai, augalų vėjasienės	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti piktžolių vegetacijos metu	1	saugoti, kad produktas nepatektų ant dekoratyvinių augalų
125.	Primus Dow AgroSciences Danmark A/S, AS2-51H(2016) 2031-12-31	Florasulamas 50 g/l	0,06–0,075	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29)	1	
			0,075–0,1	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Vienmetės ir kai kurios daugiametės	Purkšti bamblių tarpsniu (BBCH 30–39)	1	

					dviskiltės			
			0,05–0,075	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29)	1	
			0,075–0,1	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti bamblėjimo tarpsniu (BBCH 30–39)	1	
			0,075	Sėkliniai varpinių žolių pasėliai ir ganyklos pirmais augimo metais	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29)	1	
			0,075–0,15	Sėkliniai varpinių žolių pasėliai ir ganyklos pirmais augimo metais	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti bamblėjimo tarpsniu (BBCH 30–39)	1	
			0,075–0,15	Sėkliniai varpinių žolių pasėliai ir ganyklos antrais ir vėlesniais augimo metais	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti bamblėjimo krūmijimosi tarpsniais (BBCH 20–39)	1	
126.	Primus 250 WG Dow AgroSciences Danmark A/S, AS2-20H(2017) 2031-12-31	Florasulamas 50 g/kg	0,015-0,02	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi-bamblėjimo tarpsniu (BBCH 20–39)	1	
			0,015-0,02	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi-bamblėjimo tarpsniu (BBCH 20–39)	1	
			0,015	Sėkliniai varpinių žolių pasėliai ir ganyklos pirmais augimo metais	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi-bamblėjimo tarpsniu (BBCH 20–39)	1	
			0,015-0,03	Sėkliniai varpinių žolių pasėliai ir ganyklos antrais ir vėlesniais augimo metais	Vienmetės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi-bamblėjimo tarpsniu (BBCH 20–39)	1	
127.	Primus XL Dow AgroSciences	Florasulams + fluroksipiras 5 +	0,75	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai,	Dviskiltės piktžolės	Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29)	1	Pakuotė: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l.

	Denmark A/S, AS2-56H(2016) 2022-12-31	100 g/l		kvietrugiai				
			1,0	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti bambklėjimo tarpsniu (BBCH 30–39)	1	
			0,75	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29)	1	
			1,0	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti bambklėjimo tarpsniu (BBCH 30–39)	1	
			0,75	Sėkliniams varpinių žolių pasėliai ir ganyklos pirmais auginimo metais	Dviskiltės piktžolės	Purkšti bambklėjimo krūmijimosi tarpsniais (BBCH 20–39)	1	
			0,75	Sėkliniams varpinių žolių pasėliai ir ganyklos antrais ir vėlesniais auginimo metais	Dviskiltės piktžolės	lapo tarpsnio (BBCH 20– 39)	1	
128.	PROFI MCPA 750 SL CIECH Sarzyna S.A. AS2-20H/2016 2018-10-31	MCPA 750 g/l	1,0	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės piktžolės	Purkšti krūmijimosi metu	1	
			0,75	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės piktžolės	Purkšti krūmijimosi metu	1	
129.	Puma universal Bayer AG AS2-40H/2014 2019-12-31	Fenoksaprop-P- etilas 69 g/l	1,0-1,2 l/ha	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai	Vienmetės vienaskiltės (ypač dirvinės smilguolės, tuščiosios avižos, peliniai pašiaušėliai)	Purškama kai javai yra trijų lapelių-antrojo bamblio tarpsniuose (BBCH 13-32), o piktžolės yra dviejų lapelių-krūmijimosi tarpsniuose	1	Pakuotė: 5 l, 15 l.
			0,8-1,0	Žieminiai miežiai	Vienmetės vienaskiltės (ypač dirvinės smilguolės, tuščiosios avižos, peliniai	Purškama kai javai yra trijų lapelių iki bambklėjimo pradžios (BBCH 13-30), o piktžolės yra dviejų lapelių- krūmijimosi tarpsniuose	1	

			0,8-1,0	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai	pašiaušėliai) Vienmetės vienaskiltės (ypač dirvinės smilguolės, tuščiosios avižos, peliniai pašiaušėliai)	Purškiama kai javai yra trijų lapelių-antrojo bamblio tarpsniuose (BBCH 13-32), o piktžolės yra dviejų lapelių-krūmijimosi tarpsniuose	1	
130.	Ranger XL Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-33H/2014 2018-06-30	Glifosatas 360 g/l	3,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%, ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.	1	Pakuotė: 20 l.
			3,0 - 4,0	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.	1	
			3,0 - 4,0	Linai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.	1	
			3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.	1	
			2,0-4,0	Pūdymai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias . Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltės, didesnė – daugiabetes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.	1	

			2,0–4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias . Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltes, didesnė – daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.	1	
			2,0–4,0	Vaismedžių (obelų, kriaušių, vyšnių) pomedžiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles,apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltes, didesnė – daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nenaudoti 1–2 metų vaismedžių sodų pomedžiams	1	
131.	Rapsan Globachem NV, AS2-57H/2015, 2020-07-31	Metazachloras 500 g/l	1,5 l/ha	Žieminiai rapsai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti po sėjos iki sudygimo (BBCH 00–09) arba po sudygimo 2–8 lapelių (BBCH 12-18) tarpsniu	1	
			1,5 l/ha	Vasariniai rapsai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti po sėjos iki sudygimo (BBCH 00–09) arba po sudygimo 2–8 lapelių (BBCH 12-18) tarpsniu	1	
132.	Rapsan Plus Globachem NV, AS2-54H(2017), 2022-04-30	metazachloras + kvinmerakas 333+83 g/l	2,0–2,25	Vasariniai rapsai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės piktžolės	Purkšti po sėjos–kol skilčialapiai tampa matomi virš dirvos paviršiaus (BBCH 00–09) arba po sudygimo nuo 2 iki 4 tikrųjų lapelių (BBCH 12–14) tarpsnio	1	
133.	Rodeo XL Monsanto Crop Science	Glifosatas 360 g/l	3,0 l/ha	Žieminiai ir vasariniai kviečiai,	Vienametės ir daugiametės	Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei	1	Pakuotė: 20 l.

Denmark A/S, AS2-31H/2014 2018-06-30			miežiai, kvietrugiai, rugiai	vienaskiltės ir dviskiltės	30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	
	3,0 - 4,0		Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.	1
	3,0 - 4,0		Linai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.	1
	3,0–4,0		Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	1
	2,0–4,0		Pūdymai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias . Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	1
	2,0–4,0		Laukams po derliaus nuėmimo	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias . Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Žemę galima pradėti	1

						dirbti po 10 dienų.		
			2,0–4,0	Vaismedžių (obelų, kriaušių, vyšnių) pomedžiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiames vienaskiltes, didesnė – daugiames vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nenaudoti 1–2 metų vaismedžių sodų pomedžiams	1	
134.	Roundup Ultra Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0173H/06, 2018-12-31 Pavadinimas iš Roundup Bio į Roundup Ultra pakeistas 2016m. kovo 4 d.	Glifosatas 360 g/l	3,0	Varpiniai javai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose javų pasėliuose
			3,0	Žirniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	Nenaudoti sėkliniuose žirnių pasėliuose
			4,0	Žirniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	
			3,0	Linai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose linų pasėliuose
			4,0	Linai	Daugiametės vienaskiltės ir	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai	1	

					dviskiltės	vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%		
		3,0-	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose rapsų pasėliuose	
		4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1		
		2,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1		
		4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1		
		2,0	Pūdymai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1		
		4,0	Pūdymai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų	1		
		2,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1		Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
		4,0	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1		

135.	Roundup Biactive Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0433H/12, 201806-30	Glifosatas 360 g/l	3,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0-4,0	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai paruduoja 75% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0-4,0	Linai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0-4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			2,0-4,0	Pūdymai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltes, didesnė – daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes
			2,0-4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltes, didesnė – daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes
			2,0-4,0	Vaismedžių (obelių, kriaušių, vyšnių) pomedžiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti 1-2 metų vaismedžių sodų pomedžiuose. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltes, didesnė – daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes
136.	Roundup Classic XL Monsanto Crop Science	Glifosatas 360 g/l	3,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai,	Vienametės ir daugiametės	Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei	1	Pakuotė: 15 l.

Denmark A/S, AS2-32H/2014 2018-06-30		miežiai, kvietrugiai, rugiai	vienaskiltės ir dviskiltės	30% , ne vėliau kaip 10 dienių prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	
	3,0 - 4,0	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	1
	3,0 - 4,0	Linai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	1
	3,0–4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	1
	2,0–4,0	Pūdymai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias . Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.	1
	2,0–4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias . Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Žemę galima pradėti	1

						dirbti po 10 dienų.		
			2,0–4,0	Vaismedžių (obelių, kriaušių, vyšnių) pomedžiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltes, didesnė – daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nenaudoti 1–2 metų vaismedžių sodų pomedžiams	1	
137.	Roundup Flex Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0423H/12, 2018-06-30	Glifosatas 480 g/l	2,25-3,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			2,25-3,0	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai paruduoja 75% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			2,25-3,0	Linai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			2,25-3,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį		Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			2,25-3,75	Pūdymai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

					dviskiltės			
			2,25-3,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.
			2,25-3,75	Vaismedžių pomedžiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti 1-2 metų vaismedžių sodų pomedžiuose
			2,25	Uogakrūmių pokrūmiams	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti piktžolių vegetacijos metu, apsaugant žaliąsias uogakrūmių dalis	1	Nenaudoti 1–2 metų uogakrūmių sodų pokrūmiams
			2,25-3	Plotai, skirti uogakrūmiams įveisti	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti aktyviai augančias piktžoles, kai jos turi 4–5 lapus arba yra 10–12 cm aukščio	1	
138.	Roundup ACE ST Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-29H/2014 2018-06-30	Glifosatas 450 g/l	2,4	Varpiniai javai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	1	Pakuotė: 20 l.
			2,4–3,2	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių. .Mažesnė norma naikina vienametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės, didesnė – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	1	
			2,4–3,2	Linai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose	1	
			2,4–3,2	Žieminiai ir	Vienametės ir	Purkšti, kai vidutinė rapsų	1	

			vasariniai rapsai	daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.		
		1,6–3,2	Pūdymai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles . Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.	1	
		1,6–3,2	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.	1	
		1,6–3,2	Vaismedžių (obelių, kriaušių, vyšnių) pomedžiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nenaudoti 1–2 metų vaismedžių sodų pomedžiams	1	

139.	Roundup Energy Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-44H/2015, 2018-06-30	Glifosatas 450 g/l	2,4	Varpiniai javai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose javų pasėliuose
			2,4	Žirniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	Nenaudoti sėkliniuose žirnių pasėliuose
			3,2	Žirniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	
			2,4	Linai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose linų pasėliuose
			3,2	Linai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
			2,4	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose rapsų pasėliuose
			3,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
			1,6	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, javų pabiros, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
			3,2	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės vienaskiltės ir	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus	1	

					dviskiltės	nuėmimo		
			1,6	Pūdymai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
			3,2	Pūdymai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	
			1,6	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
			3,2	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	
140.	Roundup FL 450 Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-41H(2017), 2018-12-31	Glifosatas 450 g/l	2,4	Varpiniai javai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose javų pasėliuose
			2,4	Žirniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	Nenaudoti sėkliniuose žirnių pasėliuose
			3,2	Žirniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	
			2,4	Linai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose linų pasėliuose

			3,2	Linai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
			2,4	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose rapsų pasėliuose
			3,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
			1,6	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, javų pabiros, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo	1	
			3,2	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo	1	
			1,6	Pūdymai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
			3,2	Pūdymai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	
			1,6	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
			3,2	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	

141.	Roundup Flick Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-63H(2017) 2018-12-15	Glifosatas 360 g/l	2,0–4,0	Lauko augalai prieš sėjant	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti ne vėliau kaip 2 paros prieš sėjant arba sodinant, kai piktžolės turi 2–6 lapelius	1	Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės, didesnė – daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles
			3,0–4,0	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai prieš derliaus nuėmimą.	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai grūdų drėgmė ne didesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš derliaus nuėmimą	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0–4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai prieš derliaus nuėmimą	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė sėklų drėgmė ne didesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš derliaus nuėmimą	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0–4,0	Linai, garstyčios prieš derliaus nuėmimą	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai vidutinė drėgmė ne didesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš derliaus nuėmimą	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0–4,0	Žirniai, pupos prieš derliaus nuėmimą	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti parodavus 75 proc. ankščių, ne vėliau kaip 10 dienų prieš derliaus nuėmimą	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			3,0–4,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
			3,0–5,0	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles nuėmus derlių ir pavasarij iki žaliojo pumpuro tarpsnio, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti jaunesniuose nei 2 metų soduose
			3,0–6,0	Numatytos atnaujinti pievos ir ganyklos	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti birželio–spalio mėnesį arba žolei ataugus po ganymo arba pjovimo, ne vėliau kaip 10 dienų	1	Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės, didesnė –

						prieš pradant ganyti arba pjauti		daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
			3,0–5,0	Pūdymai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškšti vegetuojančias piktžoles	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
			33–44 proc. tirpalas	Aukštaūgių piktžolių naikinimas lauko augaluose	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Tepti ne žemiau kaip 20 cm virš pasėlių išaugusias piktžoles	1	Tepimo įrenginiu neliesti lauko augalų
142.	Roundup Gold ST Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0285H/06, 2018-12-31	Glifosatas 450 g/l	2,4	Varpiniai javai	Daugiametės ir vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose javų pasėliuose
			2,4	Žirniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	Nenaudoti sėkliniuose žirnių pasėliuose
			3,2	Žirniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių	1	
			2,4	Linai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose linų pasėliuose
			3,2	Linai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	
			2,4	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%	1	Nenaudoti sėkliniuose rapsų pasėliuose
			3,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė sėklų drėgmė yra	1	

						mažesnė nei 30%		
			1,6	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, javų pabiros, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
			3,2	Laukai po derliaus nuėmimo	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo	1	
			1,6	Pūdymai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
			3,2	Pūdymai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	
			1,6	Vaismedžių pomedžiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
			3,2	Vaismedžių pomedžiai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis	1	
143.	Roundup PowerMax Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-1H/2016, 2018-12-31	Glifosatas 720 g/kg	1,5–2,0	Lauko augalai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti ne vėliau kaip 2 paros prieš sėjant, sodinant arba pasėjus, prieš lauko augalams sudygstant, kai piktžolės turi 2–6 lapelius	1	
			1,5	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, avižos	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai grūdų drėgmė ne didesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš derliaus nuėmimą	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose

			1,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai vidutinė sėklų drėgmė ne didesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš derliaus nuėmimą	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			1,5	Linai, garstyčios	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai vidutinė drėgmė ne didesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš derliaus nuėmimą	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			1,5	Žirniai, pupos	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai vidutinė drėgmė ne didesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš derliaus nuėmimą	1	Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose
			1,5-2,0	Laukai po derliaus nuėmimo	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltes, javų pabiras, didesnė – daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
			1,5-2,0	Pūdymai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltes, javų pabiras, didesnė – daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
			1,5-3,0	Numatytos atnaujinti pievos ir ganyklos	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti birželio–spalio mėnesį arba žolei ataugus po ganymo arba pjovimo, ne vėliau kaip 10 dienų prieš pradendant ganyti arba pjauti.	1	Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltes, didesnė – daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
			1,5-2,0	Žolė prieš nupjovimą	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti ne vėliau kaip 10 dienų prieš žolės surinkimą.	1	
			1,5-2,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles, nuėmus derlių ir pavasarį iki žaliojo pumpuro tarpsnio,	1	

					piktžolės	apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis,		
			16-22 proc. tirpalas	Aukštaūgių piktžolių naikinimas lauko augaluose	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Tepti ne žemiau kaip 20 cm virš pasėlių išaugusias piktžoles	1	Tepimo įrenginiu neliesi lauko augalų
144.	Roxy 800 EC Globachem N.V. AS2-63H/2015, 2019-10-31	Prosulfokarbas 800 g/L	2,0–4,0	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Kai kurios vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti po sėjos – iki sudygimo, iki kai piktžolės yra 3 lapelių tarpsnio	1	
			4,0	Bulvės	Kai kurios vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti po sodinimo – iki sudygimo, prieš piktžolėms sudygstant	1	Bulvių gumbai turi būti gerai užberti žemėmis
145.	Samson 4 OD ISK BioSciences Europe N.V. 0446H/12 2019-12-31	Nikosulfuronas 40 g/l	0,75	Kukurūzai	Kai kurios vienametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai kukurūzai turi 3-4 lapelius, o vienametės dviskiltės ir vienaskiltės piktžolės turi 2-6 lapelius	1	
146.	Samson 6 OD ISK BioSciences Europe N.V. 0444H/12 2019-12-31	Nikosulfuronas 60 g/l	0,5	Kukurūzai	Vienametės ir kai kurios daugiametės vienaskiltės ir vienametės dviskiltės	Purkšti, kai kukurūzai turi 3-4 lapelius, vienametės dviskiltės ir vienaskiltės piktžolės turi 2-6 lapelius, o varputis 4-6 lapelius arba yra 15-25 cm aukščio	1	
147.	Samson Max 6 OD ISK BioSciences Europe N.V. AS2-44H(2017) 2019-12-31	Nikosulfuronas 60 g/l	0,5	Kukurūzai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai kukurūzai turi 2-8 lapelius, vienametės vienskiltės piktžolės turi 2 tikruosius lapelius, o dviskiltės - 2-6 tikruosius lapelius	1	
148.	Saracen Cheminova A/S AS2-28H(2017) 2031-12-31	Florasulamas 50 g/l	0,075	Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai	Vienametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi metu (BBCH 20-29)	1	
			0,1	Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai	Vienametės dviskiltės	Purkšti bambklėjimo tarpsniu (BBCH 30-39)		
			0,075	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Vienametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20-29)	1	
			0,1	Vasariniai kviečiai,	Vienametės	Purkšti bambklėjimo metu		

				miežiai, avižos	dviskiltės	(BBCH 30-39)		
			0,075	Sėklinių varpinių žolių pasėliai	Vienametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20-29)	1	Nešerti gyvulių <i>Saracen</i> apdorotų sėklinių varpinių žolių šiaudais
			0,1	Sėklinių varpinių žolių pasėliai	Vienametės dviskiltės	Purkšti bamblėjimo tarpsniu (BBCH 30-39)		
			0,075	Ganyklos	Vienametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20-29)	1	gyvulius galima ganyti ne anksčiau kaip po 7 dienų nuo ganyklų purškimo <i>Saracen</i> .
			0,1	Ganyklos	Vienametės dviskiltės	Purkšti bamblėjimo tarpsniu (BBCH 30-39)		
149.	Saracen Delta Cheminova A/S AS2-26H(2017) 2019-12-31	Diflufenikanas + florasulamas 500 g/l + 50 g/l	0,075	Žieminiai kviečiai, miežiams, kvietrugiai, rugiai	vienametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20-29)	1	
			0,1	Žieminiai kviečiai, miežiams, kvietrugiai, rugiai	vienametės dviskiltės	Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30-32)	1	
			0,075	Vasariniai kviečiai, miežiai	vienametės dviskiltės	Purkšti nuo antrojo šoninio lapo iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 12-29)	1	
			0,1	Vasariniai kviečiai, miežiai	vienametės dviskiltės	Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30-32)	1	
			0,075	Sėklinių varpinių žolių pasėliai	vienametės dviskiltės	Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20-29)	1	Nešerti gyvulių <i>Saracen delta</i> apdorotų sėklinių varpinių žolių šiaudais.
			0,1	Sėklinių varpinių žolių pasėliai	vienametės dviskiltės	Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30-32)	1	Nešerti gyvulių <i>Saracen delta</i> apdorotų sėklinių varpinių žolių šiaudais.
150.	Sekator OD Bayer AG AS2-37H/2014 2019-12-31	Amidosulfuronas + natrio metil jodosulfuronas 100 + 25 g/l	0,15	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai	Dviskiltės	Pasėliai purškiami javų vegetacijos metu nuo trečiojo lapo tarpsnio iki paskutiniojo lapo pasirodymo (BBCH 13-37)	1	Pakuotė: 1 l, 5 l
			0,1-0,15	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai	Dviskiltės	Pasėliai purškiami javų vegetacijos metu nuo trečiojo lapo tarpsnio iki paskutiniojo lapo pasirodymo (BBCH 13-37)	1	
151.	Sempra UPL Europe Ltd, AS2-46H(2016)	Diflufenikanas 500 g/l	0,06-0,25	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Dviskiltės	Purkšti po sėjos iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 01-28)	1	Mažesnę normą naudoti mažoms piktžolėms naikinti.

	2019-12-31		0,06-0,15	Vasariniai kviečiai, miežiai	Dviskiltės	Purkšti po sėjos iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 01–28)	1	Mažesnę normą naudoti mažoms piktžolėms naikinti.
152.	Spitfire 333HL Dow AgroSciences Denmark A/S, AS2-41H(2016), 2022-12-31	Fluroksipiras 333 g/l	0,25	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Vienmetės dviskiltės	Purkšti nuo trečiojo šoninio ūglio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 23–29)	1	
			0,36	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Vienmetės dviskiltės	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki išsiskleidžia paskutinis lapas (BBCH 30–39)	1	
			0,25	Vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai, avižos	Vienmetės dviskiltės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki išsiskleidžia paskutinis lapas (BBCH 21–39)	1	
153.	Starane 333HL Dow AgroSciences Denmark A/S, AS2-39H(2016), 2022-12-31	Fluroksipiras 333 g/l	0,25	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Vienmetės dviskiltės	Purkšti nuo trečiojo šoninio ūglio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 23–29)	1	Žiemiems javams galima naudoti 1 kartą per auginimo sezoną
			0,36	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Vienmetės dviskiltės	Purkšti nuo krūmijimosi pabaigos iki išsiskleidžia paskutinis lapas (BBCH 30–39)	1	
			0,25	Vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai, avižos	Vienmetės dviskiltės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki išsiskleidžia paskutinis lapas (BBCH 21–39)	1	
154.	Starane XL Dow AgroSciences Denmark A/S, AS2-62H(2016), 2022-12-31	Fluroksipiras + florasulamas 100 + 2,5 g/l	0,8	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo trečiojo šoninio ūglio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 23–29)	1	
			1,2	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo bambliųjimo pradžios iki vamzdelėjimo vidurio (BBCH 30–39)	1	

			0,36	Vasariniai kviečiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti trečiojo–devintojo lapelio tarpsniu (BBCH 13-19)	1	
			0,8	Vasariniai kviečiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29)	1	
			1,0	Vasariniai kviečiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki vamzdelėjimo vidurio (BBCH 30–45)	1	
			0,36	Avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti trečiojo–devintojo lapelio tarpsniu (BBCH 13-19)	1	
			0,8	Avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29)	1	
			1,0	Avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti bamblėjimo tarpsniu (BBCH 30–39)	1	
			1,5	Sėkliniai varpiniai žolių pasėliai ir ganyklos pirmais auginimo metais	Dviskiltės piktžolės	Purkšti bamblėjimo krūmijimosi tarpsniais (BBCH 20–39)	1	
			1,5-1,8	Sėkliniai varpiniai žolių pasėliai ir ganyklos antrais ir vėlesniais auginimo metais	Dviskiltės piktžolės	Purkšti bamblėjimo krūmijimosi tarpsniais (BBCH 20–39)	1	
155.	Starship Adama Registrations B.V. AS2-19H/2016 2018-10-31	Mezotrionas 100 g/l	0,75-1,0	Kukurūzai silosui	Vienmetės dviskiltės	Purkšti antro – aštunto lapo tarpsnyje (BBCH 12–18)	1	
			1,5	Kukurūzai silosui	Vienmetės dviskiltės	Purkšti 2 kartus po 0,75 l/ha: pirmą kartą nuo dviejų iki keturių lapo tarpsnio (BBCH 12–14), antrą kartą, sudygus naujai piktžolių bangai, nuo ketvirto iki aštunto lapo tarpsnio (BBCH 14–18)		
156.	Stomp 330 EC BASF A/S, 0012H/08, 2018-06-02	Pendimetalinas 330 g/l	3,0-5,0	Svogūnai, česnakai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Sėjant iš sėklų - purškiama tuoj po sėjos prieš sudygimą, sodinant ropelėmis – prieš ropelių išsodinimą	1	
			4,0	Porai	Vienmetės vienaskiltės ir	Purškiama tuoj po sėjos – prieš sudygimą	1	

				dviskiltės		
4,0	Šakninės petražolės, morkos	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama prieš morkų ir petražolių sudygimą	1		
3,0-5,0	Kopūstai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama prieš kopūstų daigų išsodinimą	1		
4,0	Kukurūzai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti po kukurūzų sėjos iki 4 lapelių tarpsnio (BBCH 14)	1		
4,0-5,0	Žieminiai kviečiai, rugiai, miežiai, kvietrugiai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti javams turint 1-3 lapelius ir ne vėliau, kaip piktžolėms turint 2 lapelius	1		
2,0	Dobilų/liucernos/v arpinių žolių pasėliai ir jų įsėliai vasariniuose kviečiuose arba vasariniuose miežuose	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama, kai ankštinės žolės ką tik sudygusios mišiniuose su 1,0-2,0 l/ha Basagran 480	1		
2,0	Vasariniai kviečiai arba vasariniai miežiai su raudonųjų dobilų įsėliais	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama, kai dobilai turi 1-2 lapelius mišiniuose su 2,0 l/ha Basagran 480	1		
2,0	Vasariniai kviečiai arba vasariniai miežiai su liucernos/baltųjų dobilų įsėliais	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama, kai liucerna ar dobilai turi 1-2 lapelius mišiniuose su 1,0- 2,0 l/ha Basagran 480			
4,0	Žirniai ir žirnių-javų mišiniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti prieš žirnių ir mišinių sudygimą	1		
4,0	Pupos	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti prieš pupų sudygimą	1		
2,0	Raudonieji, baltieji dobilai ir liucerna sėklai sėjos metais	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama anksti pavasarį, kai piktžolės turi 1-2 lapelius mišiniuose su 1,0 - 2,0 l/ha Basagran 480	1		
4,0-6,0	Bulvės	Vienmetės vienaskiltės ir	Purškiama iki sudygimo, po paskutinio kaupimo-	1		

157.	Stomp CS BASF A/S, 0443H/12, 2018-07-31	Pendimetalinas 455 g/l	2,9	Kukurūzai	dviskiltės Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	akėjimo Purkšti po kukurūzų sėjos, iki 4 lapelių tarpsnio (BBCH 14)	1
			2,9	Žirniai ir žirnių- javų mišiniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti tuoj po sėjos, prieš žirnių ir žirnių-javų sudygimą	1
			2,9	Pupos	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti tuoj po sėjos, prieš pupų sudygimą	1
			0,88	Vasariniai kviečiai, miežiai su dobilų, liucernos arba varpinių žolių įsėliais	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai tik sudygsta dobilai ar liucerna mišiniuose su 1,0-2,0 l/ha Basagran 480	1
			0,88	Dobilų, liucernos arba varpinių žolių pasėliai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai tik sudygsta dobilai ar liucerna mišiniuose su 1,0-2,0 l/ha Basagran 480	1
			0,88	Vasariniai kviečiai, miežiai su raudonųjų dobilų įsėliais	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai dobilai turi 1-2 lapelius mišiniuose su 2,0 l/ha Basagran 480	1
			0,88	Vasariniai kviečiai, miežiai su liucernos, baltųjų dobilų įsėliais	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai dobilai ar liucerna turi 1-2 lapelius mišiniuose su 1,0-2,0 l/ha Basagran 480	1
			0,88	Raudonieji, baltieji dobilai, liucerna sėklai sėjos metais	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti anksti pavasarį, kai piktžolės turi 1-2 lapelius	1
			2,9-4,35	Bulvės	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti po paskutinio kaupimo, akėjimo, ne vėliau kaip 7 dienos iki bulvių sudygimo	1
			2,18-3,6	Svogūnai, česnakai auginami iš sėklų	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti tuoj po sėjos, prieš sudygimą	
			2,18-3,6	Svogūnai, česnakai auginami iš ropelių	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti prieš ropelių išsodinimą	
			2,9	Porai auginami iš sėklų	Vienmetės vienaskiltės ir	Purkšti tuoj po sėjos, iki sudygimo	

					dviskiltės			
			2,9	Morkos, šakninės petražolės	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti tuoj po sėjos iki sudygimo		
			2,18-3,6	Gūžiniai kopūstai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti prieš kopūstų daigų išsodinimą		
158.	Sultan 500 SC Adama Registrations B.V. AS2-5H/2014 2020-07-31	Metazachloras 500 g/l	1,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienmetės dviskiltės	Purškama po sėjos – iki rapsų sudygimo (BBCH 00-09)	1	Pakuotė: 5 l, 20 l.
159.	Sultan super Adama Registrations B.V. 0460H/13, 2022-04-30	Metazachloras 375 g/l + kvinmerakas 125 g/l	1,75-2,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės dviskiltės ir vienaskiltės	Purkšti po sėjos-3 tikrųjų lapelių tarpsniu (BBCH 00-13)	1	Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l.
160.	Supero Sharda Europe b.v.b.a. AS2-10H/2015 2020-11-30	Kvizalofop-P- etilas 50 g/l	1,0-1,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės vienaskiltės piktžolės	Purkšti, kai piktžolės yra dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsnio (BBCH 12–29)	1	Pakuotė: 5 l
			2,0-2,5	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Paprastieji varpučiai	Purkšti, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio	1	
161.	SuPrim Dow AgroSciences Denmark A/S, AS2-31H(2017) 2031-12-31	florasulamas 50 g/l	0,06–0,075	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Vienametės ir kai kurias daugiametės dviskiltės piktžolės	Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29)	1	Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 2 l, 3 l, 5 l.
			0,075–0,1	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Vienametės ir kai kurias daugiametės dviskiltės piktžolės	Purkšti bambklėjimo tarpsniu (BBCH 30–39)	1	
			0,05–0,075	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Vienametės ir kai kurias daugiametės dviskiltės piktžolės	Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29)	1	
			0,075–0,1	Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	Vienametės ir kai kurias daugiametės dviskiltės piktžolės	Purkšti bambklėjimo tarpsniu (BBCH 30–39)	1	

			0,075	Sėkliniai varpinių žolių pasėliai ir ganyklos pirmais auginimo metais	Vienametės ir kai kurias daugiametės dviskiltės piktžolės	Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29)	1	
			0,075–0,15	Sėkliniai varpinių žolių pasėliai ir ganyklos pirmais auginimo metais	Vienametės ir kai kurias daugiametės dviskiltės piktžolės	Purkšti bambklėjimo tarpsniu (BBCH 30–39)	1	
			0,075–0,15	Sėkliniai varpinių žolių pasėliai ir ganyklos antrais ir vėlesniais auginimo metais	Vienametės ir kai kurias daugiametės dviskiltės piktžolės	Purkšti bambklėjimo–krūmijimosi tarpsniais (BBCH 20–39)	1	
162.	Taifun B Adama Registrations B.V. 0261H/06, 2018-06-30	Glifosatas 360 g/l	3,0	Pūdymai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų
			6,0	Pūdymai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	
			3,0	Ražienos	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	
			6,0	Ražienos	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiamos vegetuojančios piktžolės	1	
			3,0	Varpiniai javai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% iki derliaus nuėmimo likus 14 d.	1	Nenaudoti sėkliniams varpinių javų ir salyklinių miežių pasėliams
			3,0–4,0	Žirniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai paruduoja 75% anksčių iki derliaus nuėmimo likus 14 d.	1	Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliams

			3,0 – 4,0	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Pasėliai purškiami, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30% iki derliaus nuėmimo likus 14 d.	1	Nenaudoti sėklinių rapsams pasėliams
			4,0	Vaismedžių pomedžiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama piktžolių vegetacijos metu iki derliaus nuėmimo likus 14 d.	1	Nenaudoti 1-2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos
			4,0	Šilauogių pokrūmiai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškama piktžolių vegetacijos metu iki derliaus nuėmimo likus 14 d.	1	Purkšti apsaugant žaliąsias vaiskrūmių dalis
163.	Targa super Bayer AG 0405F/11 2021-03-30	Kvizalofopo –P- etilas 50 g/l	0,75-1,25	Žieminiai rapsai	Vienametės vienaskiltės (išskyrus vienametes migles)	Purkšti rudenį arba pavasarį, kai piktžolės yra dviejų lapelių-krūmijimosi tarpsnyje (BBCH 12-29)	1	
			0,75	Vasariniai rapsai, cukriniai ir pašariniai runkeliai, bulvės	Vienametės vienaskiltės (išskyrus vienametes migles)	Purkšti pavasarį, kai piktžolės yra dviejų lapelių-krūmijimosi tarpsnyje (BBCH 12-29)	1	
			1,5-2,0	Žieminiai rapsai	Paprastieji varpučiai	Purkšti rudenį arba pavasarį, kai paprastieji varpučiai yra 10-15 cm aukščio	1	
			1,5-2,0	Vasariniai rapsai, cukriniai ir pašariniai runkeliai, bulvės	Paprastieji varpučiai	Purkšti pavasarį, kai paprastieji varpučiai yra 10-15 cm aukščio	1	
			0,75-1,25	Pupos, morkos	Vienametės vienaskiltės (išskyrus vienametes migles)	Purkšti pavasarį, kai piktžolės yra dviejų lapelių-krūmijimosi tarpsniuose (BBCH 12-29)	1	
			1,5-2,0	Pupos, morkos	Paprastieji varpučiai	Purkšti pavasarį, kai paprastieji varpučiai yra 10-15 cm aukščio	1	

			0,75-1,25	Žirniai	Vienametės vienaskiltės (išskyrus vienametes migles	Purkšti pavasarį, kai piktžolės yra dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsniuose (BBCH 12–29)	1	
			1,5-2,0	Žirniai	Paprastieji varpučiai	Purkšti pavasarį, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio	1	
164.	Target SC United Phosphorus Ltd. AS2-61H(2017) 2023-08-31	Metamitronas 700 g/l	1,0l/ha	Cukriniai ir pašariniai runkeliai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės piktžolės	Purkšti pirmą kartą, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje, antrą kartą – po 7–8 d., trečią kartą – praėjus 14–16 d. po pirmojo purškimo.	3	Didžiausia norma per sezoną 3,0 l/ha.
165.	Target WG United Phosphorus Ltd. AS2-53H/2015 2020-08-31	Metamitronas 700 g/kg	1,0-3,0 kg/ha	Cukriniai ir pašariniai runkeliai	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės piktžolės	Purkšti pirmą kartą, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje, antrą kartą – po 7–10 d., trečią kartą – praėjus 14–16 d. po antro purškimo. Purkšti 3 kartus po 1,0 kg/ha, arba 1 kartą po 3,0 kg/ha.	3	Didžiausia norma per sezoną 3,0 kg/ha.
166.	Teridox 500 EC Syngenta Crop Protection AG, AS2-21H/2014 2020-12-31	Dimetachloras 500 g/l	2,0	Žieminiai rapsai	Vienametės dviskiltės, kai kurios vienaskiltės	Purkšti po sėjos iki 4 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 00–14)	1	Pakuotė: 5 l, 20 l.
			2,0	Vasariniai rapsai	Vienametės dviskiltės, kai kurios vienaskiltės	Purkšti po sėjos iki sudygimo (BBCH 00–09)	1	
167.	Titus 25 DF DuPont Sverige AB, AS2-48H(2017), 2018-01-31	Rimsulfuronas 250 g/kg	0,05 + 200 ml/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos Trend	Bulvės	Dviskiltės ir varpučiai	Purkšti 1 kartą 0,05 +200 ml/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos, kai dviskiltės piktžolės yra nuo skilčialapių iki 2–4 lapelių tarpsnio, varpučiai 10–15 cm aukščio arba purkšti per 2 kartus, po 0,025 kg/ha + 200 ml/ha		Pakuotė: 100 g., 50 g (5x10 g vandenyje tirpiuose pakeliuose, supakuoti į laminuotus maišelius)

						paviršiaus aktyviosios medžiagos Trend, pirmą kartą, kai dviskiltės piktžolės yra nuo skilčialapių iki 2–4 lapelių tarpsnio, antrą kartą po 7–10 dienų.		
			0,05 + 200 ml/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos Trend	Kukurūzai	Dviskiltės ir varpučiai	Purkšti 1 kartą 0,05 kg/ha + 200 ml/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos Trend, kai kukurūzai turi 3–4 lapelius, dviskiltės piktžolės yra nuo skilčialapių iki 2–4 lapelių tarpsnio, varpučiai 10–15 cm aukščio ne daugiau kaip 1 kartą arba purkšti per 2 kartus, po 0,025 kg/ha + 200 ml/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos Trend, pirmą kartą, kai kukurūzai turi 3–4 lapelius, dviskiltės piktžolės yra nuo skilčialapių iki 2–4 lapelių tarpsnio, antrą kartą po 7–10 dienų.		
168.	Tomahawk 200 EC Adama Registrations B.V. AS2-34H(2016) 2022-12-31	Fluroksipiras 200 g/l	0,7	Žieminiai kviečiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo vegetacijos atsinaujinimo pavasarį iki lapamakštės sustorėjimo (BBCH 20–45)	1	
			0,5	Vasariniai kviečiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo dviejų lapelių iki lapamakštės sustorėjimo (BBCH 12–45)	1	
			1,8	Pievos, ganyklos (antrais metais)	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo trijų lapelių iki lapamakštės sustorėjimo (BBCH 13–45)	1	gyvulius ganyti ir šienauti galima ne anksčiau kaip 7 dienas po purškimo.
			1,8	Vejos, golfo laukai (antrais metais)	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo trijų lapelių iki lapamakštės sustorėjimo (BBCH 13–45)	1	
			1,0	Pievos (pirmais)	Dviskiltės	Purkšti dviejų–penkių	1	gyvulius ganyti ir šienauti galima

				metais)	piktžolės	lapelių tarpsnyje (BBCH 12–15)		ne anksčiau kaip 7 dienos po purškimo.
169.	Tombo Dow Agro Sciences Denmark A/S AS2-13H(2017) 2025-04-30	Piroksulamas + florasulamas + aminopiraldas 50 +25+50 g/kg	0,1-0,2 + 0,5 l/ha Dassoil	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai	Vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai javai yra krūmijimosi- antrojo bamblio formavimosi tarpsniuose (BBCH 21-32)	1	Pakuotė: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg.
			0,1-0,15 + 0,5 l/ha Dassoil	Vasariniai kviečiai	Vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai javai yra krūmijimosi- antrojo bamblio formavimosi tarpsniuose (BBCH 21-32)	1	
170.	Tooler BASF A/S 0399H/10 2020-11-09	Tritosulfuronas 714 g/kg	50-70 g/ha	Žieminiai kviečiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo krūmijimosi pradžios iki bamblių pabaigos (BBCH 21-39)	1	Purškiant Tooler pridėti paviršiaus aktyviosios medžiagos
			50 g/ha	Vasariniai miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai turi 3 lapelius iki bamblių pabaigos	1	
			50 g/ha	Vasariniai kviečiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai turi 3 lapelius iki bamblių pabaigos	1	
171.	Trimmer 50 SG Du Pont Finland Ltd. 0360H/08 2018-10-31	Tribenuron metilas 500 g/kg	15-22,5 g/ha	Žieminiai kviečiai, rugiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai yra nuo 2 lapelių iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 12-39), o piktžolės turi 2-4 lapelius	1	Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, nenaudoti augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra tribenuron metilas daugiau kaip 1 kartą per sezoną.
			15-22,5 g/ha	Vasariniai kviečiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti, kai javai yra nuo 2 lapelių iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 12-39), o piktžolės turi 2-4 lapelius	1	
172.	Trimmer 500 WG Adama Registrations B.V. AS2-7H/2015 2018-10-31	Tribenuron metilas 500 g/kg	15-22,5 g/ha + PAM	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, žieminiai rugiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti pavasarį, kai javai yra nuo 2 lapelių iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 12-39)	1	Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1 l
173.	Triplali Du Pont Finland Ltd. AS2-71H(2017) 2019-10-31	florasulamas + metsulfuron metilas + tribenuron metilas 105 + 83 + 83 g/kg	35 g/ha + PAM	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti pavasarį trečiojo šoninio ūglio–paskutinio lapo tarpsniu (BBCH 23– 39)	1	
			35 g/ha + PAM	Žieminiai miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti pavasarį trečiojo šoninio ūglio–bamblių pradžios tarpsniu (BBCH	1	

						23–30)		
			35 g/ha + PAM	Vasariniai kviečiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti trečiojo lapo–paskutinio lapo tarpsniu (BBCH 13–39)	1	
			35 g/ha + PAM	Avižos	Dviskiltės piktžolės	Purkšti trečiojo lapo–bamblių pradžios tarpsniu (BBCH 13–30)	1	
174.	U 46D Nufarm GmbH&Co KG, 0099H/08, 2018-05-23	2,4-dichlorfenoksi acto rūgštis 500 g/l	1,5	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purškama atsinaujinus vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos	1	
			1,5	Vasariniai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai javai yra nuo 3 lapelių iki krūmijimosi pabaigos (BBCh 13-29)	1	
			1,0-1,5	Kukurūzai	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti, kai kukurūrai išskleidžia 3-5 lapelius (BBCH 13-15)	1	
			0,75-1,0	Baltieji dobilai	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti baltiesiems dobilams turint 2-3 lapelius	1	
			2,0	Pievos ir ganyklos	Vienametės ir kai kurios daugiametės dviskiltės	Purkšti kai piktžolės jaunos ir aktyviai auga	1	
175.	Zetrola Adama Registrations B.V., AS2-77H(2017), 2022-11-30	Propakvizafopas 100 g/l	0,5–0,75	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai, linai, bulvės, žieminiai ir vasariniai rapsai, vaismedžių pomedžiai, žirniai, brokoliai, gūžiniai kopūstai, svogūnai, česnakai, morkos, pašarinės pupos,	Vienametės vienaskiltės piktžolės	Purkšti nuo piktžolių sudygimo iki krūmijimosi	1	

				garstyčios, baltieji ir raudonieji dobilai, braškės, juodieji ir raudonieji serbentai, avietės, agrastai, dekoratyviniai augalai				
				Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai, linai, bulvės, žieminiai ir vasariniai rapsai, vaismedžių pomedžiai, žirniai, brokoliai, gūžiniai kopūstai, svogūnai, česnakai, morkos, pašarinės pupos, garstyčios, baltieji ir raudonieji dobilai, braškės, juodieji ir raudonieji serbentai, avietės, agrastai, dekoratyviniai augalai	Vienametės vienaskiltės piktžolės	Purkšti piktžolių krūmijimosi–bambliųjimo metu	1	
				Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai, linai, bulvės, žieminiai ir vasariniai rapsai, vaismedžių pomedžiai, žirniai, brokoliai, gūžiniai	Daugiametės vienaskiltės piktžolės	Purkšti, kai piktžolės yra 3–5 lapelių stadijoje	1	

				kopūstai, svogūnai, česnakai, morkos, pašarinės pupos, garstyčios, baltieji ir raudonieji dobilai, braškės, juodieji ir raudonieji serbentai, avietės, agrastai, dekoratyviniai augalai				
				Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai, linai, bulvės, žieminiai ir vasariniai rapsai, vaismedžių pomedžiai, žirniai, brokoliai, gūžiniai kopūstai, svogūnai, česnakai, morkos, pašarinės pupos, garstyčios, baltieji ir raudonieji dobilai, braškės, juodieji ir raudonieji serbentai, avietės, agrastai, dekoratyviniai augalai	Daugiametės vienaskiltės piktžolės	Purkšti piktžolių krūmijimosi–bambliųjimo metu	1	
176.	Zypar Dow AgroSciences Denmark A/S, AS2-16H(2016), 2026-08-05	haloksifenmetilas + florasulamas 6,254 g/l + 5 g/l.	0,5–0,75	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo trečiojo šoninio ūglio tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 23–29)	1	
			0,5–1,0	Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai,	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo bambliųjimo pradžios iki paskutinio lapo	1	

				kvietrugiai		lapamakštės sutorėjimo (BBCH 30–45) tarpsnio		
		0,5		Vasariniai kviečiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo trečiojo lapo išsiskleidimo iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13–29)	1	
		0,5–1,0		Vasariniai kviečiai, miežiai	Dviskiltės piktžolės	Purkšti nuo bamblių pradžios iki paskutinio lapo lapamakštės sutorėjimo (BBCH 30–45) tarpsnio	1	