

INSEKTICIDAI

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas ir būdai	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
1.	Actara 25 WG Syngenta Crop Protection AG 0183I/08 2018-07-17	Tiametoksamas 250 g/kg		1-2 metų pušų sodinukai	Pušiniai straubliukai	Prieš sodinimą sodmenų šaknis pamerkti į 0,4-0,5 % Actara 25 WG vandens ir molio tirpalą		
				3-5 metų eglės sodmenys	Pušiniai straubliukai	Prieš sodinimą sodmenų šaknis pamerkti į 0,2-0,3 % Actara 25 WG vandens ir molio tirpalą		
2.	Foray 76B Sumitomo Chemical Agro Europe SA 0416I/11 2019-04-30	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> , štamai ABTS-351	2,0-2,5	Miškai	Lapus ir spyglius graužiančių drugių (pušinių verpikų, vienuolių verpikų, ąžuolinių lapsukų) vikšrai	Purkšti iš lėktuvų tik masinio kenkėjų išplitimo metu, kai kitais būdais sunaikinti jų neįmanoma	2	Būtina iš anksto informuoti gyvenamųjų vietovių gyventojus bei visuomenę apie planuojamus miško purškimus iš oro: jų tikslus, plotus, atlikimo laiką, naudojamą augalų apsaugos produktą ir saugos būdus. Draudžiama purkšti miškų plotus žmonių poilsio zonose bei arčiau kaip 100 metrų nuo žmonių gyvenamųjų vietų. Nuo visų numatytų nupurkšti plotų ribų ne mažesniu kaip 100 metrų atstumu turi būti išdėstyti gerai matomi pranešimai – įspėjimai, draudžiantys eiti į nupurkštą

								<p>teritorija. Perspėjamoji informacija nuimama tik pasibaigus draudimui lankytis miške.</p> <p>Gyventojams eiti į apdorotus plotus ir 100 metrų zoną aplink šiuos plotus galima tik praėjus ne mažiau kaip parai nuo purškimo iš oro.</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 50 metrų apsaugos zoną (purškiant aviacine technika) ir 10 metrų (naudojant antžeminius purkštuvus) iki paviršinio vandens telkinių.</p>
3.	<p>Karate Zeon 5 CS Syngenta Ctop Protection AG., 0236I/07, 2018-07-31</p>	Lambda-cihalotrinas 50 g/l	0,2-0,4	Lapuočiai	Lapus graužiantys vabzdžiai, voratinklinės erkės	Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu	1	<p>Negrybauti ir neuogauti - 10, nedirbti miške - 1, nepoilsiauti miške - 4 dienas po purškimo</p>
4.	<p>Mavrik Adama Registrations B.V. AS2-30I(2016) 2022-05-31</p>	Tau-fluvalinatas 240 g/l	0,15–0,2 l 0,5 % tirpalo/m ² žievės ploto	Spygliuočių mediena	Žievėgraužis tipografas (<i>Ips typographus</i>), žievėgraužis graveris (<i>Pityogenes chalcographus</i>), eglinis poligrafas (<i>Polygraphus poligraphus</i>), didysis kirpikas (<i>Blastographus piniperda</i>), mažasis kirpikas (<i>Blastographus minor</i>)		1	<p>Purškiant traktoriniais ventilatoriniais purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurkšti ne didesnį kaip 1500 m² žievės plotą arba ne didesnį kaip 1875 m³ į rietuves sukrautos medienos tūrį;</p> <p>Purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurkšti ne didesnį kaip 230 m² žievės plotą arba ne didesnį kaip 287 m³ į rietuves sukrautos medienos tūrį;</p> <p>Atliekant purškimo darbus šalia rietuvių negali būti pašalinių žmonių;</p> <p>Darbuotojams draudžiama</p>

								eiti ir dirbti į insekticidu <i>Mavrik</i> apdorotų medienos rietuvių plotus mažiausiai 2 paras po <i>Mavrik</i> panaudojimo.
5.	Merit Forest Bayer A/S AS2-43I/2015 2020-07-31	Imidaklopridas 700 g/kg	175 g/ha	Eglių, pušų, maumedžių sodinukai	didysis pušinis straubliukas, eglinis šakniagraužis, didysis pušinis šakniagraužs.	Prieš sodinimą šaknų sistema apdorojama naudojant uždarą sistemą 5 ml 1,4 proc. tirpalo sodinukui	1	Nenaudoti daugiau kaip 2500 vnt. sodinukų į hektarą
			175 g/ha.	Eglių, pušų, maumedžių sodinukai	didysis pušinis straubliukas, eglinis šakniagraužis, didysis pušinis šakniagraužs	Prieš sodinimą šaknų sistemą apdorojama mirkant / panardinant apatinę sodinuko dalį į 10 ml 0,7 proc. tirpalo sodinukui arba 20 ml 0,35 proc. tirpalo sodinukui, ne daugiau kaip 1 kartą.	1	Mažesnę tirpalo kiekį naudoti mažesnių matmenų medeliams, didesnę kiekį naudoti didesnių matmenų medeliams. Nenaudoti daugiau kaip 2500 vnt. sodinukų į hektarą
			70–100 g/ha.	2–3 metų eglių, pušų, maumedžių sodinukai	didysis pušinis straubliukas, eglinis šakniagraužis, didysis pušinis šakniagraužs	Purškiama apatinė stiebo dalis 2 ml 1,4– 2 proc. tirpalo sodinukui arba 10 ml 0,28– 0,4 proc. tirpalo sodinukui	1	Mažesnę tirpalo kiekį naudoti mažesnių matmenų medeliams, didesnę kiekį naudoti didesnių matmenų medeliams. Nenaudoti daugiau kaip 2500 vnt. sodinukų į hektarą

- - Purškiant iš lėktuvų darbų apimtys, teritorijos ir laikas turi būti suderinti su Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentais.

FUNGICIDAI

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas ir būdai	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
1.	Rostop WP Verdera Oy, AS2-24BF/2015, 2020-04-30	<i>Phlebiopsis gigantea</i> štamai VRA 1835	1 g/1 l vandens	Pušų ir eglių kelmiai	Pušų ir eglių kelmiai	Kertant medžius, tirpalas paskleidžiamas, panaudojant daugiafunkcinės mašinos purškimo įrangą, skiriant maždaug du litrus skiedinio vienam kvadratiniam metrui ploto su kelmiais		
2.	Rostop SC Verdera Oy, AS2-25BF/2015, 2020-04-30	<i>Phlebiopsis gigantea</i> štamai VRA 1835	1 g/1 l vandens	Pušų ir eglių kelmiai	Pušų ir eglių kelmiai	Kertant medžius, tirpalas paskleidžiamas, panaudojant daugiafunkcinės mašinos purškimo įrangą, skiriant maždaug du litrus skiedinio vienam kvadratiniam metrui ploto su kelmiais		
3.	Bumper 25 EC Adama Registrations B.V. 0164F/08 2018-04-11	Propikonazolas 250 g/l	0,5	Spygliuočių sodinukai medelynuose	Paprastoji spygliakritė, pušų snieginė spygliakritė, spygliuočių ūglių fomopsiozė	Purkšti vegetacijos metu	2	
			0,5	Lapuočių sodinukai medelynuose	Ažuolų lapų miltligė, klevų lapų miltligė, liepų lapų rudmargė, liepų lapų šviesmargė, lapų dėmėtligė, lapų sausligė, lapų antraknozė	Purkšti vegetacijos metu	2	
4.	Kantik Adama Registrations B.V. AS2-18F/2016	Fenpropidinas + prochlorazas + tebukonazolas 150	0,5	Spygliuočių sodinukai medelynuose	Pušų paprastoji spygliakritė, pušų snieginė	Purkšti vegetacijos metu	4	

	2019-12-31	+I 200 +I 100 g/l.			spygliakritė, spygliuočių ūglių fomopsiozė			
			0,5	Lapuočių sodinukai medelynuose	Ažuolų lapų miltligė, klevų lapų miltligė, beržų lapų rūdys, drebulių lapų antraknozė, pilkasis plėsis	Purkšti vegetacijos metu	3	
5.	Orius 250 EW Adama Registrations B.V. AS2-42F/2015, 2020-08-31	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Spygliuočių sodinukai medelynuose	Pušų paprastoji spygliakritė, pušų snieginė spygliakritė	Purkšti vegetacijos metu	1	
			1,0	Lapuočių sodinukai medelynuose	Ažuolų lapų miltligė, klevų lapų miltligė, beržų lapų rūdys, drebulių lapų rūdys, liepų lapų rūdys, liepų lapų šviesmargė, lapų dėmėtligė, lapų sausligė, lapų antraknozė, pilkasis pelėsis	Purkšti vegetacijos metu	1	
			0,1 proc. tirpalas	Spygliuočių ir lapuočių sėjinukai medelynuose	Infekcinis sėjinukų išgulimas	Laistyti židinius pastebėjus sėjinukų išgulimo požymius		Neviršyti 1,0 l/ha produkto normos per sezoną.
6.	Signum BASF A/S 0314F/09 2019-12-16	Boskalidas + piraklostrobinas 267 + 67 g/kg	1,0	Pušų sodmenys medelynuose	Spygliakritė	Purkšti vegetacijos metu	3	
7.	Syrius Adama Registrations B.V. AS2-61F/2015, 2020-08-31	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Lapuočių sodinukai medelynuose	Ažuolų lapų miltligė, klevų lapų miltligė, beržų lapų rūdys, drebulių lapų rūdys, liepų lapų rudmargė, liepų lapų šviesmargė, lapų dėmėtligė, lapų sausligė, lapų anteaknozė, pilkasis palėsis	Purkšti vegetacijos metu	1	

			1,0	Spygliuočių sodinukai medelynuose	Pušų paprastoji spygliakritė, pušų snieginė spygliakritė	Purkšti vegetacijos metu	1	
			0,1 proc. tirpalas	Spygliuočių ir lapuočių sėjinukai medelynuose	Infekcinis sėjinukų išgulimas	Laistyti židinius pastebėjus sėjinukų išgulimo požymius		Neviršyti 1,0 l/ha produkto normos per sezoną.

HERBICIDAI

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Piktžolės	Apdoravimo laikas ir būdai	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
1.	Barbarian Super 360 Barclay Chemicals (R&D) Limited, AS2-45H/2015, 2018-12-15	Glifosatas 360 g/l	2,0	Plotai daigynams, medelynams, želdiniams	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn.	1	
			4,0	Plotai daigynams, medelynams, želdiniams	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn.	1	
			2,0	Spygliuočių želdiniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui	1	
			4,0	Spygliuočių želdiniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai,	1	

						susiformavus einamųjų metų pumpurui		
			1 dalis Barclay Super 360 ir 4 dalys vandens (1:4)	Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui	Minkštųjų lapuočių atžalos	06-08 mėn. kelmai aptepami ar apipurškiami tuoj pat nupjovus medį	1	
2.	Barclay Barbarian Biograde 360 Barclay Chemicals (R&D) Limited, 0341H/07, 2018-12-15	Glifosatas 360 g/l	2,0	Plotai daigynams, medelynams, želdiniams	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn.	1	
			4,0	Plotai daigynams, medelynams, želdiniams	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn.	1	
			2,0	Spygliuočių želdiniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui	1	
			4,0	Spygliuočių želdiniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui	1	
			1 dalis Barclay Barbarian Biograde 360 ir 4 dalys	Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui	Minkštųjų lapuočių atžalos	06-08 mėn. kelmai aptepami ar apipurškiami tuoj pat nupjovus medį	1	

			vandens (1:4)					
3.	Barbarian Hi-Aktiv Barclay Chemicals (R&D) Limited, 0339H/07, 2018-12-15	Glifosatas 490 g/l	1,5	Plotai daigynams, medelynams , želdiniams	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparaturą augalų vegetacijos metu 06-08 mėn.	1	
			2,9	Plotai daigynams, medelynams , želdiniams	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparaturą augalų vegetacijos metu 06-08 mėn.	1	
			1,5	Spygliuočių želdiniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparaturą 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui	1	
			2,9	Spygliuočių želdiniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparaturą 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui	1	
			1 dalis Barbarian Hi-Aktiv ir 3 dalys vandens (1:3)	Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui	Minkštųjų lapuočių atžalos	06-08 mėn. kelmai aptepami ar apipurškiami tuoj pat nupjovus medį	1	
4.	Clinic Up Nufarm GmbH&Co KG AS2-14H(2017), 2018-12-15	Glifosatas 360 g/l	2,0–4,0	Ruošiant dirvą daigynams, medelynams , želdiniams	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai.	Purkšti augalų vegetacijos metu antžemine aparaturą birželio– rugpjūčio mėnesiais	1	
			2,0–4,0	Spygliuočių	Vienametės ir	Purškiama	1	

				želdiniai	daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai.	rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesiais, pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurai antžemine aparatūra		
			1 dalis Clinic Up ir 4 dalys vandens (1:4).	Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui	Minkštųjų lapuočių atžalos	Birželio–rugpjūčio mėnesiais nupjovus medį kelmai tuoj pat aptepami ar apipurškiami	1	
5.	Dalgis XL Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-23H/2016, 2018-12-31	Glifosatas 360 g/l	2,0-4,0	Plotai daigynams, medelynams, želdiniams	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	
			4,0-6,0	Plotai daigynams, medelynams, želdiniams	Viržiai	Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnę normą viržiams naikinti dirvose, kuriose gausu organinių medžiagų, didesnę – dirvose, kuriose gausu mineralinių medžiagų	1	
			2,0-3,0	Spygliuočių želdiniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purkšti vegetuojančias piktžoles rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus	1	
6.	Fenix Bayer AG 0305H/13	Aklonifenas 600 g/l	2,0-3,0	Miško sodinukai (eglių, pušų,	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti augalų ramybės periodu	1	

	2020-07-31			kėnių, maumedžių)				
7.	Fusilade forte 150 EC Syngenta Ltd., 0073H/01, 2017-12-31	Fluazifop-P- butilas 150 g/l	1,5-2,0	Pušų, eglių, kedrų sėjinukai	Vienmetės ir daugiametės vienskiltės	Purškiama antžemine aparaturai prieš spygliuočių sėklų sudygimą arba vegetacijos antroje pusėje, kai vienmetės vienskiltės išskleidžia 2-4, o daugiametės vienskiltės 4-6 lapelius	1	
8.	Gallup Super 360 Barclay Chemicals (R&D) Limited AS2-37H/2015 2018-12-15	Glifosatas 360 g/l	2,0	Plotai daigynams, medelynams , želdiniams	Vienmetės vienskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparaturai augalų vegetacijos metu 06-08 mėn.	1	
			4,0	Plotai daigynams, medelynams , želdiniams	Daugiametės vienskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparaturai augalų vegetacijos metu 06-08 mėn.	1	
			2,0	Spygliuočių želdiniai	Vienmetės vienskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparaturai 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui	1	
			4,0	Spygliuočių želdiniai	Daugiametės vienskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparaturai 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui	1	

			1 dalis Gallup Super 360 ir 4 dalys vandens (1:4)	Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui	Minkštųjų lapuočių atžalos	06-08 mėn. kelmai aptepami ar apipurškiami tuoj pat nupjovus medį	1	
9.	Glyfer Generica Europa Ltd, AS2-7H(2017) 2018-12-15	Glifosatas 360 g/l	2,0–4,0	Ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai.	Purkšti augalų vegetacijos metu antžemine aparatūra birželio–rugpjūčio mėnesiais	1	
			2,0–4,0	Spygliuočių želdiniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai.	Purškama rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesiais, pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurai antžemine aparatūra	1	
			1 dalis Glyfer ir 4 dalys vandens (1:4).	Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui	Minkštųjų lapuočių atžalos	Birželio–rugpjūčio mėnesiais nupjovus medį kelmai tuoj pat aptepami ar apipurškiami	1	
10.	Glyphomax 480 Albaugh UK Ltd., 0439H/12 2017-12-31	Glifosatas 480 g/l	1,5-4,5	Spygliuočių želdiniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purkšti vegetuojančias piktžoles rudenį, kai spygliuočių augimas sustojęs ir ūgliai visiškai sumedėję. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai	1	

						išplitusias daugiameses vienaskiltės, didesnė – daugiameses vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus.		
				Lapuočių medžių kelmai	Lapuočių medžių atžalos	Teptuku tepti arba apipurkšti kelmus kirtimo dieną, siekiant išvengti atžėlimo, tirpalu: 1 dalis <i>Glyphomax 480</i> ir 4 dalys vandens.		
11.	Glyfos Bio 450 SL Cheminova A/S, 0295H/06, 2018-12-31	Glifosatas 450 g/l	2,4-4,0	Plotai daigams, medelynams , želdiniams	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, minkštųjų lapuočių atžalos bei krūmai	Purškžiama antžemine aparatūra birželio-rugpjūčio mėnesiais augalų vegetacijos metu	1	
			3,2-4,8	Plotai daigams, medelynams , želdiniams	Viržiai	Mažesnę normą naudoti viržiams naikinti iš daug organinių medžiagų turinčios dirvos, didesnę – iš daug mineralinių medžiagų turinčios dirvos	1	
			2,4-3,2	Spygliuočių želdiniai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, minkštųjų lapuočių atžalos bei krūmai	Purškžiama rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo mėnesiais, pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų	1	

						pumpurui. Purškama antžemine aparatura		
			1 dalis Glyphos Bio 450 SL ir 5 dalys vandens (1:5)	Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui	Minkštųjų lapuočių atžalos	06-08 mėn. kelmai aptepami ar apipurškiami tuoj pat nupjovus medį	1	
12.	Klean G Ventura Agroscience Ltd AS2-9H(2017) 2018-12-15	Glifosatas 360 g/l	2,0–4,0	Ruošiant dirvą daigynams, medelynams , želdiniams	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai.	Purkšti augalų vegetacijos metu antžemine aparatura birželio– rugsjūčio mėnesiais	1	
			2,0–4,0	Spygliuočių želdiniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai.	Purškama rugsjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesiais, pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui antžemine aparatura	1	
			1 dalis Klean G ir 4 dalys vandens (1:4).	Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui	Minkštųjų lapuočių atžalos	Birželio–rugsjūčio mėnesiais nupjovus medį kelmai tuoj pat aptepami ar apipurškiami	1	
13.	Leopard Adama Registrations B.V. 0450H/13 2020-11-30	Kvizalofop-P- etilas 50 g/l	2,0-2,5	Miško želdiniai, miško medelynai	Daugiametės ir vienametės vienaskiltės	Purkšti, kai piktžolės turi 4-6 lapelius	1	
14.	Monosate G Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-11H/2016 2018-12-15	Glifosatas 360 g/l	2,0–4,0	Ruošiant dirvą daigynams, medelynams , želdiniams	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai.	Purkšti augalų vegetacijos metu antžemine aparatura birželio– rugsjūčio	1	

						mėnesiais		
			2,0–4,0	Spygliuočių želdiniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai.	Purškama rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesiais, pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurai antžemine aparatūra	1	
			1 dalis Monosate G ir 4 dalys vandens (1:4).	Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui	Minkštųjų lapuočių atžalos	Birželio–rugpjūčio mėnesiais nupjovus medį kelmai tuoj pat aptepami ar apipurškiami	1	
15.	Ranger XL Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-33H/2014 2018-08-30	Glifosatas 360 g/l	2,0–4,0	Ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai.	Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus	1	Herbidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės
			2,0-3,0	Spygliuočių želdiniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai.	Purkšti vegetuojančias piktžoles rugpjūčio pabaigoje-rugsėjo mėnesį, spygliuočių	1	

						vegetacijai pasibaigus.		aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybu ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 20 l.
			4,0-6,0	Miškų ūkyje	Viržiai	Mažesnę normą viržiams naikinti naudoti dirvoms, kuriose gausų organinių medžiagų, didesnę – dirvoms, kuriose gausu mineralinių medžiagų. Purkšti vegetuojančias piktžoles.	1	
16.	Rodeo XL Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-31H/2014 2018-06-30	Glifosatas 360 g/l	2,0-4,0	Ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnę normą naikina vienametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės, didesnė – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido)

			4,0-6,0	Miškų ūkyje	Viržiai	Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnę normą viržiams naikinti naudoti dirvoms, kuriose gausų organinių medžiagų, didesnę – dirvoms, kuriose gausu mineralinių medžiagų.	1	apsaugos priemonės. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 20 l.
			2,0-3,0	Spygliuočių želdiniai	Vieenametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai.	Purkšti vegetuojančias piktžoles rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus	1	apsaugos priemonės. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 20 l.

17.	Roundup Classic XL Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-32H/2014 2018-06-30	Glifosatas 360 g/l	2,0–4,0	Ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai.	Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus.	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
			4,0-6,0	Miškų ūkyje	Viržiai	Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnę normą viržiams naikinti naudoti dirvoms, kuriose gausų organinių medžiagų, didesnę – dirvoms, kuriose gausu mineralinių medžiagų.	1	Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių
			2,0-3,0	Spygliuočių želdiniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai.	Purkšti vegetuojančias piktžoles rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus	1	šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1

								metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 15 l.
18.	Roundup Flex Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0423H/12, 2018-06-30	Glifosatas 480 g/l	3,0	Plotai daigynams, medelynams, želdiniams	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	
			4,5	Plotai daigynams, medelynams, želdiniams	Viržiai	Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnę normą viržiams naikinti naudoti dirvoms, kuriose gausų organinių medžiagų, didesnę – dirvoms, kuriose gausu mineralinių medžiagų	1	
			1,5	Spygliuočių želdiniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus	1	
			2,5	Spygliuočių želdiniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purkšti rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus		
19.	Roundup Flick Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-63H(2017), 2018-06-30	Glifosatas 360 g/l	4,0	Ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti birželio–rugpjūčio mėnesiais piktžolių augimo laikotarpiu	1	
			4,0	Spygliuočių želdiniai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti antžemine, kryptine, uždengta įranga birželio–rugpjūčio	1	

						mėnesiais. Eglių, kaukazinių ir pilkųjų kėnių plantacijas galima purkšti rudenį, pasibaigus metiniam augimui, subrendus pavasariniams ūgliams ir ant šakų viršūnių susiformavus pumpurams, ne anksčiau kaip eglėms gerai įsitvirtinus nuolatinėje augimo vietoje		
			20 proc. tirpalas.	Kelmai	Atžalios	Tepti kelmus, tuoj pat nupjovus medį, spalio–vasario mėnesiais	1	
			3,5	Kalėdinės eglutės	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti traktoriniais purkštuvais subrendus (sumedėjus) naujiems kalėdinių eglių ūgliams, rugsėjo mėnesį	1	
20.	Roundup Energy Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-44H/2015, 2018-06-30	Glifosatas 450 g/l	1,6	Plotai daigynams, medelynams, želdiniams.	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn.	1	
			3,2	Plotai daigynams, medelynams, želdiniams.	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn.	1	
			3,2	Plotai daigams, medelynams, želdiniams	Viržiai	Purškama vegetacijos metu organinėmis medžiagomis	1	

						turtingoje dirvoje		
			4,8	Plotai daigams, medelynams, želdiniams	Viržiai	Purškiama vegetacijos metu mineralinėmis medžiagomis turtingoje dirvoje	1	
			1,6	Spygliuočių želdiniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui	1	
			3,2	Spygliuočių želdiniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui	1	
			Roundup Energy vanduo (1:3)	Minkštųjų lapuočių kelmai	Minkštųjų lapuočių atžalos	06-08 mėn. kelmai aptepami ar apipurškiami tuo pat nupjovus medį	1	
21.	Roundup Gold ST Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0285H/06, 2018-12-31	Glifosatas 450 g/l	1,6	Plotai daigams, medelynams, želdiniams.	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn.	1	
			3,2	Plotai daigams, medelynams, želdiniams.	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn.	1	
			3,2	Plotai	Viržiai	Purškiama	1	

				daigams, medelynams , želdiniams		vegetacijos metu organinėmis medžiagomis turtingoje dirvoje		
			4,8	Plotai daigams, medelynams , želdiniams	Viržiai	Purškiama vegetacijos metu mineralinėmis medžiagomis turtingoje dirvoje	1	
			1,6	Spygliuočių želdiniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatura 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui	1	
			3,2	Spygliuočių želdiniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatura 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui	1	
			Roundup Gold ST+ vanduo (1:3)	Minkštųjų lapuočių kelmai	Minkštųjų lapuočių atžalos	06-08 mėn. kelmai aptepami ar apipurškiami tuoj pat nupjovus medį	1	

22.	Roundup PowerMax Monsanto Crop Sciences Denmark A/S AS2-1H/2016 2018-12-31	Glifosatas 720 g/kg	1,5-2,0	Ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti birželio–rugpjūčio mėnesiais antžemine įranga piktžolių augimo laikotarpiu	1	Mažesnė norma naikina vienametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės, didesnė – daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles.
			1,5-2,0	Spygliuočių želdiniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti birželio–rugpjūčio mėnesiais. Eglų, kaukazinių ir pilkųjų kėnių plantacijas galima purkšti rudenį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, subrendus pavasariniams ūgliams ir ant šakų viršūnių susiformavus pumpurams, ne anksčiau kaip eglėms gerai įsitvirtinusios nuolatinėje augimo vietoje.	1	Herbicido negali patekti ant medžių
			20 proc. tirpalas	Kelmai		Tepti kelmus, tuoj pat nupjovus medį, spalio – vasario mėnesiais	1	

			1,75	Kalėdinės eglutės	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti subrendus (sumedėjus) naujiems kalėdinių eglučių ūgliams, rugsėjo–spalio mėnesį	1	
23.	Roundup ACE ST Monsanto Crop Science Denmark A/S, AS2-29H/2014 2018-06-30	Glifosatas 450 g/l	1,6-3,2	Ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus.	1	Herbicidas klasifikuojamas: Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1
			3,2-4,8	Miškų ūkyje	Viržiai	Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnę normą viržiams naikinti naudoti dirvoms, kuriose gausu organinių medžiagų, didesnę – dirvoms, kuriose gausu mineralinių medžiagų.	1	
			1,6-3,2	Spygliuočių želdiniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purkšti vegetuojančias piktžoles rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesį, spygliuočių	1	

						vegetacijai pasibaigus.		metro apsaugos zona iki paviršinio vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zona iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pakuotė: 20 l.
			1 dalis Roundup Ace ST ir 3 dalys vandens	Minkštųjų lapuočių kelmai		Nupjovus medį iškart kelmus aptepti arba apipurkšti birželio–rugpjūčio mėnesiais.	1	
24.	Roundup Ultra Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0013H/06, 2018-12-31 Pavadinimas iš Roundup Bio į Roundup Ultra pakeistas 2016m. kovo 4 d.	Glifosatas 360 g/l	2,0	Plotai daigynams, medelynams, želdiniams	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn.	1	
			4,0	Plotai daigynams, medelynams, želdiniams	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn.	1	
			4,0	Plotai daigams, medelynams, želdiniams	Viržiai	Purškiama vegetacijos metu organinėmis medžiagomis turtingoje dirvoje	1	
			6,0	Plotai daigams, medelynams, želdiniams	Viržiai	Purškiama vegetacijos metu mineralinėmis medžiagomis turtingoje dirvoje	1	
			2,0	Spygliuočių želdiniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurai	1	
			4,0	Spygliuočių želdiniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių	Purškiama antžemine aparatūra 08-09	1	

					atžalos, krūmai	mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui			
			1 dalis Roundup Bio ir 4–5 dalys vandens (1:4-5)	Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui	Minkštųjų lapuočių atžalos	06-08 mėn. kelmai aptepami ar apipurškiami tuoj pat nupjovus medį	1		
25.	Roundup Biactive Monsanto Crop Science Denmark A/S, 0433H/12, 2018-06-30	Glifosatas 360 g/l	2,0-4,0	Plotai daigynams, medelynams, želdiniams	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1		
			4,0-6,0	Plotai daigynams, medelynams, želdiniams	Viržiai	Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnę normą viržiams naikinti dirvose, kuriose gausu organinių medžiagų, didesnę – dirvose, kuriose gausu mineralinių medžiagų	1		
			2,0-3,0	Spygliuočių želdiniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purkšti vegetuojančias piktžoles rugpjūčio pabaigoje-rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus	1		
5.	2 2 .	Taifun B Adama registrations B.V. 0261H/06, 2018-06-30	Glifosatas 360 g/l	3,0-4,0	Kirtavietės	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, minkštųjų lapuočių atžalos	Purkšti antžemine aparatūra birželio-rugpjūčio mėnesiais augalų vegetacijos metu	1	

REPELENTAI

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami augalai	Paskirtis	Apdoravimo laikas
1.	Cervacol extra Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG , AS2-18R/2015, 2020-08-31	Kvarcinis smėlis 251 g/kg	3,0-4,0 kg/1000 augalų	Lapuočių ir spygliuočių želdiniai	Saugo nuo stirnų ir elnių nugraužimo	Tepti lapuočių ir spygliuočių viršūninio ūglio 5-10 cm rudenį pasibaigus vegetacijai
2.	Wam Extra Witasek Pflanzenschutz GmbH AS2-19R/2015 2020-08-31	Kvarcinis smėlis 300 g/kg	2,5-4,0 kg/1000 augalų	Lapuočių ir spygliuočių želdiniai	Saugo želdinius nuo kanopinių žvėrių nugraužimo	Tepti lapuočių ir spygliuočių viršūninio ūglio 5-10 cm rudenį pasibaigus vegetacijai
3.	Trico Kwizda Agro GmbH 0462R/13 2020-08-31	Avių riebalai 65 g/l	10 – 20 l/ha	Miškai, miško daigynai, medelynai	Saugo nuo elnių, stirnų, briedžių apgraužimo	Purkštu rudenį arba pavasarį, ne daugiau kaip 1 kartą