

INSEKTICIDAI

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas ir būdai	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
1.	Decis Mega Bayer AG 0336I/07 2023-10-31	Deltametrinas 50 g/l	0,25 l/ha (0,025 proc.)	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys, auginami medelynuose	Amarai, skydamariai, pjūkleliai, gumbavapsvės, lapsukiai	Purkšti vegetacijos metu	2	
2.	Evure Adama Registrations B.V. AS2-78I(2017) 2025-08-31	Tau-fluvalinatas 240 g/l	0,15–0,2 l 0,5 % tirpalo/m ² žievės ploto	Spygliuočių mediena	Žievėgraužis tipografas (<i>Ips typographus</i>), žievėgraužis graveris (<i>Pityogenes chalcographus</i>), eglinis poligrafas (<i>Polygraphus poligraphus</i>), didysis kirpikas (<i>Blastographus piniperda</i>), mažasis kirpikas (<i>Blastographus minor</i>)		1	Purškiant traktoriniais ventiliatoriniais purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurkšti ne didesnį kaip 1500 m ² žievės plotą arba ne didesnį kaip 1875 m ³ rietuves sukrautos medienos tūrį; Purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurkšti ne didesnį kaip 230 m ² žievės plotą arba ne didesnį kaip 287 m ³ rietuves sukrautos medienos tūrį; Atliekant purškimo darbus šalia rietuvių negali būti pašalinių žmonių; Darbuotojams draudžiama eiti ir dirbti į insekticidu <i>Evure</i> apdorotų medienos rietuvių plotus mažiausiai 2 paras po <i>Evure</i> panaudojimo.
			0,2 l/ha	Eglučių sodinukai	Amarai	Purkšti vegetacijos metu	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas ir būdai	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai	
3.	Foray 76B Sumitomo Chemical Agro Europe SA 0416I/11 2024-04-30	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> , štamai ABTS-351	2,0-2,5	Miškai	Lapus ir spyglius graužiančių drugių (pušinių verpikų, vienuolių verpikų, ąžuolinių lapsukų) vikšrai	Purkšti iš lėktuvų tik masinio kenkėjų išplitimo metu, kai kitais būdais sunaikinti jų neįmanoma	2	<p>Būtina iš anksto informuoti gyvenamųjų vietovių gyventojus bei visuomenę apie planuojamus miško purškimus iš oro: jų tikslus, plotus, atlikimo laiką, naudojamą augalų apsaugos produktą ir saugos būdus. Draudžiama purkšti miškų plotus žmonių poilsio zonose bei arčiau kaip 100 metrų nuo žmonių gyvenamųjų vietų.</p> <p>Nuo visų numatytų nupurkšti plotų ribų ne mažesniu kaip 100 metrų atstumu turi būti išdėstyti gerai matomi pranešimai – įspėjimai, draudžiantys eiti į nupurkštą teritoriją. Pespėjamoji informacija nuimama tik pasibaigus draudimui lankytis miške.</p> <p>Gyventojams eiti į apdorotus plotus ir 100 metrų zoną aplink šiuos plotus galima tik praėjus ne mažiau kaip parai nuo purškimo iš oro.</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 50 metrų apsaugos zoną (purškiant aviacine technika) ir 10 metrų (naudojant antžeminius purkštuvus) iki paviršinio vandens telkinių.</p>

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas ir būdai	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
4. Kaiso 50 EG Nufarm GmbH & Co KG 0410I/11 2023-03-01	Lambda cihalotrinas 50 g/kg	0,15	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys, auginami medelynuose	Amarai, gumbauodžiai, paslėptastraubliai, žiedinukai	Purkšti vegetacijos metu	1	
5. Karate Zeon 5 CS Syngenta Ctop Protection AG. 0236I/07 2022-12-31	Lambda-cihalotrinas 50 g/l	0,2-0,4	Lapuočiai	Lapus graužiantys ir čiulpiantys vabzdžiai bei jų lervos, voratinklinės erkės		1	Negrybauti ir neuogauti - 10, nedirbti miške - 1, nepoilsiauti miške - 4 dienas po purškimo
		0,2–0,4	Lapuočių ir spygliuočių medžių ir krūmų sodmenys medelynuose	Lapus graužiantys ir čiulpiantys vabzdžiai bei jų lervos, voratinklinės erkės		1	
6. Mavrik Adama Registrations B.V. AS2-30I(2016) 2025-08–31	Tau-fluvalinatas 240 g/l	0,15–0,2 l 0,5 % tirpalo/m ² žievės ploto	Spygliuočių mediena	Žievėgraužis tipografas (<i>Ips typographus</i>), žievėgraužis graveris (<i>Pityogenes chalcographus</i>), eglinis poligrafas (<i>Polygraphus poligraphus</i>), didysis kirpikas (<i>Blastographus piniperda</i>), mažasis kirpikas (<i>Blastographus minor</i>)		1	Purškiant traktoriniais ventiliatoriniais purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurkšti ne didesnį kaip 1500 m ² žievės plotą arba ne didesnį kaip 1875 m ³ į rietuves sukrautos medienos tūrį; Purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais vienas operatorius per dieną gali nupurkšti ne didesnį kaip 230 m ² žievės plotą arba ne didesnį kaip 287 m ³ į rietuves sukrautos medienos tūrį; Atliekant purškimo darbus šalia rietuvių negali būti pašalinių žmonių; Darbuotojams draudžiama eiti ir dirbti į insekticidu <i>Mavrik</i> apdorotų medienos rietuvių plotus mažiausiai 2

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas ir būdai	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai	
							paras po <i>Mavrik</i> panaudojimo.	
		0,2 l/ha	Eglučių sodinukai	Amarai	Purkšti vegetacijos metu	2		
7.	Mospilan 20 SG Nisso Chemical Europe GmbH AS2-15I(2022) 2034-02-28	Acetamipridas 200 g/kg	250 g/ha	Miško medelynai, kalėdinių eglų plantacijos	Amarai	Purkšti gegužės – rugpjūčio mėnesiais	1	Registruota pagal Reglamento 51 str.
			250 g/ha	Dekoratyviniai plačialapiai medžiai uždaramė grunte	Amarai	Purkšti kenkėjams plintant pavasarį ir vasarą	1	Registruota pagal Reglamento 51 str.
			250 g/ha	Miško medelynai uždaramė grunte	Amarai, didieji pušiniai straubliukai	Purkšti pasirodžius pirmiesiems kenkėjams	1	Registruota pagal Reglamento 51 str.
8.	Movento SC100 Bayer AG AS2-24I(2020) 2025-04-30	Spirotetramatas 100 g/l	0,75 l/ha	Miškų medelynuose ir sėklinių miško medžių plantacijose auginami augalai	Amarai, baltasparniai	Purkšti vegetacijos metu	2	

- Purškiant iš lėktuvų darbų apimtys, teritorijos ir laikas turi būti suderinti su Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentais.

FUNGICIDAI

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdoravimo laikas ir būdai	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
1.	Aliette Bayer AG AS2-24F/2016 2023-04-30	Aliuminio fosetilas 800 g/kg	0,05–0,1 proc.	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys, auginami medelynuose, šiltnamiuose	Šaknų puvinys (<i>Pythium</i> spp.), pašaknio ir šaknų puvinys (<i>Phytophthora</i> spp.)	Laistyti prieš arba po sodinimo	1	
			0,25–0,5 proc.	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys, auginami medelynuose, šiltnamiuose	Šaknų puvinys (<i>Pythium</i> spp.), pašaknio ir šaknų puvinys (<i>Phytophthora</i> spp.)	Apdoroti naudojant laistymo sistemą prieš pasireiškiant ligos požymiams	4	
2.	Falcon Forte Bayer AG AS2-10F(2016) 2023-07-31	Tebukonazolas 148 g/l + protiokonazolas 53 g/l + spiroksaminas 224 g/l	1,6	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose	Miltligė, rūdys	Purkšti vegetacijos metu	1	
3.	Infito Bayer AG 0337F/12 2023-07-31	Propamokarbo hidrochloridas 625 g/l + fluopikolidas 62,5 g/l	1,6	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose	Miltligė, šaknų ir pašaknio puviniai (<i>Phytophthora</i> spp.)	Purškiama profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos požymius	3	
4.	Input Bayer AG AS2-103F(2019) 2023-07-31	Protiokonazolas 160 g/l + spiroksaminas 300 g/l	0,8–1,0	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose	Miltligė, fuzariozė	Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos požymius	1	
5.	Input Triple Bayer AG AS2-103F(2019) 2023-07-31	Prokvinazidas 40 g/l + protiokonazolas 160 g/l + spiroksaminas 200 g/l	0,75	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose	Miltligė, rūdys, pašaknio puviniai	Purškiama profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos požymius	1	

6.	Kantik Adama Registrations B.V. AS2-18F/2016 2022-12-31	Fenpropidinas + prochlorazas + tebukonazolas 150 +I 200 +I 100 g/l.	0,5	Spygliuočių sodinukai medelynuose	Pušų paprastoji spygliakritė, pušų snieginė spygliakritė, spygliuočių ūglių fomopsiozė	Purkšti vegetacijos metu	4	
			0,5	Lapuočių sodinukai medelynuose	Ažuolų lapų miltligė, klevų lapų miltligė, beržų lapų rūdys, drebulių lapų antraknozė, pilkasis plėsis	Purkšti vegetacijos metu	3	
7.	Lalstop G46 WG Danstar Ferment AG AS2-70BF(2021) 2035-03-31	Clonostachys rosea J1446 900 g/kg	20–50 g/m3	Spygliuočių ir lapuočių medžių sėjinukai auginami šiltnamiuose, lauke ir tuneliuose	Šaknų ir pašaknio puviniai (Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.)	Naudojama prieš sodinimą, įterpiant į dirvą / substratą	1	
			50–100 g/100 m2	Spygliuočių ir lapuočių medžių sėjinukai auginami šiltnamiuose, lauke ir tuneliuose	Šaknų ir pašaknio puviniai (Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.)	Naudojama sodinimo metu, nuo sudygimo iki ūglių vystymosi pabaigos (BBCH 10–39)	5	
			300– 500 g/ha	Spygliuočių ir lapuočių medžių sėjinukai auginami šiltnamiuose, lauke ir tuneliuose	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purškama nuo sudygimo iki ūglių vystymosi pabaigos (BBCH 10–39)	5	
8.	Orius 250 EW Adama Registrations B.V. AS2-42F/2015 2022-08-31	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Spygliuočių sodinukai medelynuose	Pušų paprastoji spygliakritė, pušų snieginė spygliakritė	Purkšti vegetacijos metu	1	

			1,0	Lapuočių sodinukai medelynuose	Ažuolų lapų miltligė, klevų lapų miltligė, beržų lapų rūdys, drebulių lapų rūdys, liepų lapų rūdys, liepų lapų šviesmargė, lapų dėmėtligė, lapų sausligė, lapų antraknozė, pilkasis pelėsis	Purkšti vegetacijos metu	1	
			0,1 proc. tirpalas	Spygliuočių ir lapuočių sėjinukai medelynuose	Infekcinis sėjinukų išgulimas	Laistyti židinius pastebėjus sėjinukų išgulimo požymius		Neviršyti 1,0 l/ha produkto normos per sezoną.
9.	Previcur Energy Bayer AG 0356F/08 2022-07-31	Propamokarbas 530 g/l + fosetilas 310 g/l	0,2 proc. tirpalas (20 ml/10 l vandens)	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys, auginami medelynuose	Fitoftorozė, pašaknio ir šaknų puvinų sukėlėjai	Laistoma vegetacijos metu	2	
			2,5 l/ha arba 25 ml/100 m ²	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys, auginami medelynuose	Netikroji miltligė	Purškama vegetacijos metu	2	
10	Rostop SC Danstar Ferment AG AS2-40BF(2018) 2022-04-30	Phlebiopsis gigantea štamai VRA 1835	1 g/1 l vandens	Pušų ir eglių kelmai	Pušų ir eglių kelmai	Kertant medžius, tirpalas paskleidžiamas, panaudojant daugiafunkcinės mašinos purškimo įrangą, skiriant maždaug du litrus skiedinio vienam kvadratiniam metrui ploto su kelmis		
11	Serenade Aso Bayer AG AS2-3F(2017) 2023-04-30	Bacillus subtilis QST 713	8 l/ha	Medžių sodinukai, auginami lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Sausligė, pilkasis (kekerinis) puvinys, sklerotinis puvinys, miltligė, juodasis puvinys, bakterinis vėžys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus	8 l/ha	

			1 proc. tirpalas	Medžių sodinukai, auginami lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą	1 proc. tirpalas	
			10 l/ha	Medžių sodinukai, auginami lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą	10 l/ha	
			8 l/ha	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose	Sausligė (<i>Alternaria</i> spp.); Pilkasis (kekerinis) puvinys (<i>Botrytis cinerea</i>); Sklerotinis puvinys (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>); Miltligė (<i>Erysiphe</i> spp., <i>Sphaerotheca pannosa</i>)	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus	8 l/ha	
12	Signum BASF A/S 0314F/09 2023-01-31	Boskalidas + piraklostrobinas 267 + 67 g/kg	1,0	Pušų sodmenys medelynuose	Spygliakritė	Purkšti vegetacijos metu	3	

13	Syrius Adama Registrations B.V. AS2-61F/2015, 2022-08-31	Tebukonazolas 250 g/l	1,0	Lapuočių sodinukai medelynuose	Ažuolų lapų miltligė, klevų lapų miltligė, beržų lapų rūdys, drebulių lapų rūdys, liepų lapų rudmargė, liepų lapų šviesmargė, lapų dėmėtligė, lapų sausligė, lapų anteaknozė, pilkasis palėsis	Purkšti vegetacijos metu	1	
			1,0	Spygliuočių sodinukai medelynuose	Pušų paprastoji spygliakritė, pušų snieginė spygliakritė	Purkšti vegetacijos metu	1	
			0,1 proc. tirpalas	Spygliuočių ir lapuočių sėjinukai medelynuose	Infekcinis sėjinukų išgulimas	Laistyti židinius pastebėjus sėjinukų išgulimo požymius		Neviršyti 1,0 l/ha produkto normos per sezoną.
14	Tazer 250 SC Nufarm GmbH & Co. KG AS2-35F(2020) 2025-12-31	Azoksistrobinas 250 g/l	0,5–1,0	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose	Miltligė, rūdys, alternariozė	Purkšti vegetacijos metu	1	
15	VitiSan Andermatt Group AG AS2-24F(2021) 2023-08-31	Kalio hidrokarbonatas 994.9 g/kg	2,5 kg/ha (kai augalo aukštis iki 50 cm)	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose	Tikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu, profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius infekcijos požymius	10	
			3,75 kg/ha (kai augalo aukštis 50–125 cm)	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose	Tikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu, profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius infekcijos požymius	10	

			5 kg/ha (kai augalo aukštis daugiau kaip 125 cm)	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose	Tikroji miltligė	Purškšti vegetacijos metu, profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius infekcijos požymius	10	
--	--	--	--	---	------------------	---	----	--

HERBICIDAI

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Piktžolės	Apdoravimo laikas ir būdai	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
1.	Barbarian Biograde 360 Barclay Chemicals (R&D) Limited AS2-85H(2018) 2023-12-15	Glifosatas 360 g/l	2,0	Plotai daigynams, medelynams, želdiniams	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn.	1	
			4,0	Plotai daigynams, medelynams, želdiniams	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn.	1	
			2,0	Spygliuočių želdiniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui	1	

			4,0	Spygliuočių želdiniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurai	1	
			1 dalis Barbarian Biograde 360 ir 4 dalys vandens (1:4)	Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui	Minkštųjų lapuočių atžalos	06-08 mėn. kelmai aptepami ar apipurškiami tuoj pat nupjovus medį	1	
2.	Barbarian Hi-Aktiv Barclay Chemicals (R&D) Limited AS2-86H(2018) 2023-12-15	Glifosatas 490 g/l	1,5	Plotai daigynams, medelynams, želdiniams	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn.	1	
			2,9	Plotai daigynams, medelynams, želdiniams	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn.	1	
			1,5	Spygliuočių želdiniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurai	1	
			2,9	Spygliuočių želdiniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purškiama antžemine aparatūra 08-09 mėn., pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurai	1	

			1 dalis Barbarian Hi-Aktiv ir 4 dalys vandens (1:4)	Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui	Minkštųjų lapuočių atžalos	06-08 mėn. kelmai aptepami ar apipurškiami tuoj pat nupjovus medį	1	
3.	Barbarian Super 360 Barclay Chemicals (R&D) Ltd. AS2-86H(2019) 2023-12-15	Glifosatas 360 g/l	2,0–4,0	Ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purkšti antžemine aparaturą augalų vegetacijos metu, birželio–rugspjūčio mėnesiais	1	Mažesnė norma naikina vienametės vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametės vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
			2,0–4,0	Spygliuočių želdiniai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purkšti rugspjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesiais, spygliuočių vegetacijai pasibaigus	1	Mažesnė norma naikina vienametės vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametės vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
			1 dalis Barbarian Super 360 ir 4 dalys vandens (1:4)	Minkštųjų lapuočių kelmai		Birželio–rugspjūčio mėnesiais nupjovus medį kelmai tuoj pat aptepami ar apipurškiami		
4.	Clinic Up Nufarm GmbH&Co KG AS2-72H(2019), 2023-12-15	Glifosatas 360 g/l	2,0–4,0	Ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai.	Purkšti augalų vegetacijos metu antžemine aparaturą birželio– rugspjūčio mėnesiais	1	

			2,0–4,0	Spygliuočių želdiniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai.	Purškiama rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesiais, pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui antžemine aparatūra	1	
			1 dalis Clinic Up ir 4 dalys vandens (1:4).	Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui	Minkštųjų lapuočių atžalos	Birželio–rugpjūčio mėnesiais nupjovus medį kelmai tuoj pat aptepami ar apipurškiami	1	
5.	Fenix Bayer AG 0305H/13 2023-07-31	Aklonifenas 600 g/l	2,0-3,0	Miško sodinukai (eglių, pušų, kėnių, maumedžių)	Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės	Purkšti augalų ramybės periodu	1	
6.	Gallup 360-K Barclay Chemicals (R&D) Limited AS2-67H(2019) 2023-12-15	Glifosatas 360 g/l	3,0-4,0	Plotai medelynams	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai piktžolės aktyvia auga.	1	Žemę galima pradėti dirbti po 7 dienų.
			3,0-4,0	Plotai, skirti miškų sodinimui	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai piktžolės aktyvia auga.	1	Žemę galima pradėti dirbti po 7 dienų.
			3,0-4,0	Miškuose, medelynuose pasodinus medelius	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti piktžolių vegetacijos metu, apsaugant medelių kamienus	1	
7.	Gallup Super 360 Barclay Chemicals (R&D) Limited AS2-87H(2019) 2023-12-15	Glifosatas 360 g/l	2,0	Ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn.	1	
			4,0	Ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu 06-08 mėn.	1	

			2,0	Spygliuočių želdiniai	Vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purkšti rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesiais, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, susiformavus einamųjų metų pumpurai	1	
			4,0	Spygliuočių želdiniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesiais, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, susiformavus einamųjų metų pumpurai	1	
			1 dalis Gallup Super 360 ir 4 dalys vandens (1:4)	Minkštųjų lapuočių kelmai		Birželio–rugpjūčio mėnesiais nupjovus medį kelmą tuoj pat aptepami ar apipurškiami	1	
8.	Glare Sharda Cropchem España S.L. AS2-9H(2022) 2023-12-15	Glifosatas 360 g/L	3,0–4,0	Nepageidaujama žolinė ir sumedėjusi augmenija kirtavietėse	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purkšti antžemine aparatūra birželio–rugpjūčio mėnesiais	1	
			200 ml Glare ir 10 l vandens	Medelynai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Pavienius kelmus / augalus purkšti arba tepti. Apsaugoti augalus, kurių nenorima sunaikinti.	1	Pastaba: didžiausia naudojimo norma yra 400 ml /100 m² 2 proc. tirpalo.

			3,0–6,0	Mišakai: energetinis miškas, spygliuočių ir lapuočių sodmenys miško medelynuose	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti piktžolių vegetacijos metu, apsaugant medelių kamienus	1	Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
			2,0–6,0	Mišakai: energetinis miškas, spygliuočių ir lapuočių sodmenys miško medelynuose , kai medžiai yra 1 ir daugiau metų	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti piktžolių vegetacijos metu, apsaugant medelių kamienus	1	Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnė norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
			1 dalis Glare ir 2 dalys vandens	Mišakai: energetinis miškas, spygliuočių ir lapuočių sodmenys miško medelynuose aplikacija (tepimas)	Vienametės ir daugiametės piktžolės	Pavienės aukštaūgės piktžolės naikinamos aplikacijos (tepimo) būdu	1	Pastaba: vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų. Saugoti, kad tirpalo nepatektų ant medžių šakų ir / ar lapų.
			200 ml Glare ir 10 l vandens	Mišakai: energetinis miškas, spygliuočių ir lapuočių sodmenys miško medelynuose (kelmų naikinimui)	Medžių ir krūmų kelmai	Purkšti nugariniais purkštuvais bei lašeliniais aplikatoriais	1	

9.	Glyphomax 480 Albaugh TKI d.o.o. AS2-63H(2021) 2023-12-15	Glifosatas 480 g/l	1,5–2,25	Spygliuočių plantacijos (paprastosios eglės (Picea abies), kaukaziniai kėniai (Abies Nordmanniana))	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti vegetuojančias piktžoles rudenį, kai spygliuočių augimas sustojęs ir ūgliai visiškai sumedėję (BBCH 91). Laikotarpis tarp purškimų ne mažiau kaip 28 d.	2	Didžiausias Glyphomax 480 kiekis per sezoną 4,375 l/ha.
			1,5–3,875	Miškų ūkyje piktžolėms naikinti	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti prieš sodinant, kai piktžolės aktyviai auga. Laikotarpis tarp purškimų ne mažiau kaip 28 d.	3	Didžiausia vienkartinė Glyphomax 480 norma 3,875 l/ha. Didesnė norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Didžiausias Glyphomax 480 kiekis per sezoną 9,0 l/ha. Sodinukai sodinami ne anksčiau kaip 10 dienų po apdorojimo. Nenaudoti 1–2 metų jaunuose medelynuose be specialios kamienų apsaugos.
			1 dalis Glyphomax 480 ir 4 dalys vandens (25 proc. tirpalas)	Lapuočių medžių kelmai	Atžalos	Tepti tuoj pat nupjovus medį. Tarp tepimų praėjus ne mažiau kaip 21 d.	2	
10.	Krypt 540 Barclay Chemicals (R&D) Limited AS2-68H(2019) 2023-12-15	Glifosatas 540 g/l	2,0-2,7	Plotai medelynams	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai piktžolės aktyviai auga.	1	Žemę galima pradėti dirbti po 7 dienų.
			2,0-2,7	Plotai, skirti miškų sodinimui	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti, kai piktžolės aktyviai auga.	1	Žemę galima pradėti dirbti po 7 dienų.

			2,0-2,7	Miškuose, medelynuose pasodinus medelius	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti piktžolių vegetacijos metu, apsaugant medelių kamienus.	1	
11.	Leopard Adama Registrations B.V. 0450H/13 2022-11-30	Kvizalofop-P-etilas 50 g/l	2,0-2,5	Miško želdiniai, miško medelynai	Daugiametės ir vienametės vienaskiltės	Purkšti, kai piktžolės turi 4-6 lapelius	1	
12.	Monosate G Bayer AG AS2-5H(2022), 2023-12-15	Glifosatas 360 g/l	2,0–4,0	Ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai.	Purkšti augalų vegetacijos metu antžemine aparatūra birželio–rugpjūčio mėnesiais	1	
			2,0–4,0	Spygliuočių želdiniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai.	Purškama rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesiais, pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurai antžemine aparatūra	1	
			1 dalis Monosate G ir 4 dalys vandens (1:4).	Minkštųjų lapuočių kelmų sunaikinimui	Minkštųjų lapuočių atžalos	Birželio–rugpjūčio mėnesiais nupjovus medį kelmą tuoj pat aptepami ar apipurškiami	1	
13.	Ouragan with system 4 Syngenta Polska Sp.zo.o 0244H/06 2023-12-15	Glifosatas 360 g/l	2,0	Miško želdiniai	Krūmai, Mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės piktžolės, Minkštųjų lapuočių atžalos, Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purškama rugpjūčio pabaigoje - rugsėjo mėnesiais, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, susiformavus einamųjų metų pumpurai.	1	

14.	Rodeo FL Bayer AG AS2-2H(2022) 2022-12-15	Glifosatas 360 g/l	4,0	Miškų ūkyje ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti birželio–rugpjūčio mėnesiais piktžolių augimo laikotarpiu	1	
			4,0	Spygliuočių želdiniai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti antžemine, kryptine, uždengta įranga birželio–rugpjūčio mėnesiais. Eglių, kaukazinių ir pilkųjų kėnių plantacijas galima purkšti rudenį, pasibaigus metiniam augimui, subrendus pavasariniais ūgliams ir ant šakų viršūnių susiformavus pumpurams, ne anksčiau kaip eglėms gerai įsitvirtinus nuolatinėje augimo vietoje.	1	Produkto negali patekti ant medžių.
			20 proc. tirpalas	Kelmai	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Tepti kelmus tuoj pat nupjovus medį, spalio–vasario mėnesiais	1	
			3,5	Kalėdinės eglutės	Vienmetės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti traktoriniais purkštuvais subrendus (sumedėjus) naujiems kalėdinių eglių ūgliams, rugsėjo mėnesį	1	

15.	Roundup Flex Bayer AG AS2-4H(2022) 2022-12-15	Glifosatas 480 g/l	3,0	Plotai daigynams, medelynam, želdiniams	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles	1	
			4,5	Plotai daigynams, medelynam, želdiniams	Viržiai	Purkšti vegetuojančias piktžoles. Mažesnę normą viržiams naikinti naudoti dirvoms, kuriose gausų organinių medžiagų, didesnę – dirvoms, kuriose gausu mineralinių medžiagų	1	
			1,5	Spygliuočių želdiniai	Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės	Purkšti vegetuojančias piktžoles rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus	1	
			2,5	Spygliuočių želdiniai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės, minkštųjų lapuočių atžalos, krūmai	Purkšti rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus	1	
16.	Roundup PowerMax Bayer AG AS2-3H(2022) 2022-12-15	Glifosatas 720 g/kg	1,5-2,0	Ruošiant dirvą daigynams, medelynam, želdiniams	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti birželio–rugpjūčio mėnesiais antžemine įranga piktžolių augimo laikotarpiu	1	Mažesnę norma naikina vienametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltės, didesnė – daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles.

			1,5-2,0	Spygliuočių želdiniai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti birželio–rugpjūčio mėnesiais. Eglių, kaukazinių ir pilkųjų kėnių plantacijas galima purkšti rudenį, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, subrendus pavasariniams ūgliams ir ant šakų viršūnių susiformavus pumpurams, ne anksčiau kaip eglėms gerai įsitvirtinusios nuolatinėje augimo vietoje.	1	Herbicido negali patekti ant medžių
			20 proc. tirpalas	Kelmai		Tepti kelmus, tuoj pat nupjovus medį, spalio – vasario mėnesiais	1	
			1,75	Kalėdinės eglutės	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti subrendus (sumedėjus) naujiems kalėdinių eglučių ūgliams, rugsėjo–spalio mėnesį	1	

17.	Roundup Ultra Bayer AG AS2-64H(2021) 2023-12-15	Glifosatas 360 g/l	2,0–5,17	Miškų ūkyje ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, minkštųjų lapuočių atžalos bei krūmai	Purkšti birželio–rugpjūčio mėnesiais vegetuojančias piktžoles	3	Didesnė norma naikina daugiametės vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus. Didžiausias leistinas kiekis per sezoną 10 l/ha.
			2,0–3,03	Spygliuočių plantacijos (Kalėdinių eglių plantacijos)	Vienametės ir daugiametės dviskiltės piktžolės	Purkšti vegetuojančias piktžoles, rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesį, pasibaigus spygliuočių vegetacijai	3	Didesnė norma naikina daugiametės vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus. Didžiausias leistinas kiekis per sezoną 8,75 l/ha.
			1 dalis Roundup Ultra ir 4–5 dalys vandens (1:4–5)	Minkštųjų lapuočių kelmai	Atžalos	Tepti tuoj pat nupjovus medį, birželio–rugpjūčio mėnesiais	1	
18.	Taifun B Adama registrations B.V. 0261H/06, 2023-12-15	Glifosatas 360 g/l	3,0–4,0	Kirtavietės	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, minkštųjų lapuočių atžalos	Purkšti antžemine aparatūra birželio–rugpjūčio mėnesiais augalų vegetacijos metu	1	
			3,0	Miškai	Mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės piktžolės, Vienametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės	Purkšti piktžolių vegetacijos metu, apsaugant medelių kamienus energetiniuose miškuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenyse miško medelyne.	1	

			6,0	Miškai	Daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Purkšti piktžolių vegetacijos metu, apsaugant medelių kamienus energetiniuose miškuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenys miško medelynuose.	1	
			1 dalis Taifun B ir 2 dalys vandens	Miškai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Pavienės aukštaūgės piktžolės naikinamos aplikacijos (tepimo) būdu energetiniuose miškuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenys miško medelynuose.	1	Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų. Saugoti, kad tirpalo nepatektų ant medžių šakų ir / ar lapų.
			200 ml ir 10 l vandens	Miškai	Krūmai, Lapuočių medžių kelmai	Purkšti nugariniais purkštuvais bei lašeliniais aplikatoriais energetiniuose miškuose, spygliuočių ir lapuočių sodmenis miško medelynuose kelmų naikinimui.	1	
			200 ml ir 10 l vandens	Medelynai	Vienametės ir daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės	Pavienius kelmus / augalus purkšti arba tepti. Apsaugoti augalus, kurių nenorima sunaikinti.	1	Didžiausia naudojimo norma yra 400 ml / 100 m ² 2 proc. tirpalo.

BEICAI

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdorojimo būdai	
1.	Bariton Super Bayer AG AS2-79B(2017) 2022-07-31	Protiokonazolas + tebukonazolas + fludioksonilas 50 +l 10 + 37,5 g/l.	1,0	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose	Pašaknio puviniai	Beicuoti naudojant 6–10 l/t tirpalo

REPELENTAI

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami augalai	Paskirtis	Apdoravimo laikas
1.	Cervacol extra Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG , AS2-18R/2015, 2022-08-31	Kvarcinis smėlis 251 g/kg	3,0-4,0 kg/1000 augalų	Lapuočių ir spygliuočių želdiniai	Saugo nuo stirnų ir elnių nugrauzimo	Tepti lapuočių ir spygliuočių viršūninio ūglio 5-10 cm rudenį pasibaigus vegetacijai
2.	Wam Extra Witasek Pflanzenschutz GmbH AS2-19R/2015 2022-08-31	Kvarcinis smėlis 300 g/kg	2,5-4,0 kg/1000 augalų	Lapuočių ir spygliuočių želdiniai	Saugo želdinius nuo kanopinių žvėrių nugrauzimo	Tepti lapuočių ir spygliuočių viršūninio ūglio 5-10 cm rudenį pasibaigus vegetacijai
3.	Plantskydd Plantskydd AB AS2-28R(2022) 2037-03-31	Kraujo miltai 998 g/kg	0,8-1,6 kg/1000 augalų	Lapuočių, spygliuočių sodinukai, dekoratyviniai augalai	Apsaugo nuo kiškių, stirnų, elnių ir briedžių.	Augalus apipurkšti, aptepti arba mirkyti paruoštame tirpale 1 kartą per sezoną nuo rugsėjo iki kovo mėnesio.
4.	Trico Kwizda Agro GmbH 0462R/13 2022-08-31	Avių riebalai 65 g/l	10 – 20 l/ha	Miškai, miško daigynai, medelynai	Saugo nuo elnių, stirnų, briedžių apgraužimo	Purkštu rudenį arba pavasarį, ne daugiau kaip 1 kartą