



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. SPALIO 15 D. ĮSAKIMO NR. A1-259 „DĖL
FUNGICIDO ACANTO 250 SC ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2017 m. rugpjūčio 2 d. Nr. A1-427
Vilnius

P a k e i ė i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2007 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. A1-259 „Dėl fungicido *Acanto 250 SC* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO ACANTO 250 SC ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. rugsėjo 25 d. protokole Nr. 6 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į *Acanto 250 SC* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1), išvadas ir į Du Pont Finland Ltd. 2017 m. birželio 19 d. prašymą:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Acanto 250 SC*, DuPont Sverige AB, profesionaliajam naudojimui iki 2018 m. spalio 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: pikoksistrobinas 250 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono Gali sukelti alerginę reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną (kai naudojimo norma yra 0,5 l/ha) ir 10 metrų apsaugos zoną (kai naudojimo norma yra 1 l/ha) iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotė: 5 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rudųjų, geltonųjų, juodųjų rūdžių, kviečių dryžligės, septoriozės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip du kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Pastaba: didžiausia norma per sezoną – 1,0 l/ha.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, smulkiųjų rūdžių, tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip du kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Pastaba: didžiausia norma per sezoną – 1,0 l/ha.

Žieminiams rugiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rudųjų, juodųjų rūdžių, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip du kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Pastaba: didžiausia norma per sezoną – 1,0 l/ha.

Žieminiams kvietrugiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo kvietrugius nuo miltligės, rudųjų rūdžių, rinchosporiozės, septoriozės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip du kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Pastaba: didžiausia norma per sezoną – 1,0 l/ha.

Avižoms.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo avižas nuo miltligės, vainikuotųjų rūdžių, avižų dryžligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip du kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Pastaba: didžiausia norma per sezoną – 1,0 l/ha.

Žieminiams ir vasariniams rapsams, rapsukams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip vieną kartą, ne vėliau kaip baigiant rapsams / rapsukams žydėti (BBCH 69).

Cukriniams runkeliams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, baltulių, rudmargės, iš dalies nuo rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip du kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Pastaba: didžiausia norma per sezoną – 1,0 l/ha.

2. P r i p a ž i s t u netekusiu galios DuPont Finland Ltd. 2007 m. spalio 22 d. išduotą fungicido *Acanto 250 SC* registracijos liudijimą 0333F/07.

3. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas