



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKymo NR. A1-132  
„DĖL FUNGICIDO *ACANTO PRIMA* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2017 m. rugpjūčio 2 d. Nr. A1-428  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. A1-132 „Dėl fungicido *Acanto Prima* perregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *ACANTO PRIMA* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2011 m. balandžio 15 d. protokole Nr. AS1-3 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į *Acanto Prima* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1) išvadas ir į Du Pont Finland Ltd. 2017 m. birželio 19 d. prašymą:

1. A t n a u j i n u fungicido *Acanto Prima*, DuPont Sverige AB, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2018 m. spalio 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: pikoksistrobinas 80 g/kg + ciprodinilas 300 g/kg.

1.2. Fungicido forma: vandenyje dispersiškos granulės.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sudėtyje yra ciprodinilo. Gali sukelti alerginę reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 5 kg.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 1,0–1,5 kg/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

arba

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 1,5 kg/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu po 0,75 kg/ha, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,0–1,5 kg/ha.

Saugo nuo miltligės, rinchosporiozės, tinkliškosios dryžligės, smulkiųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

arba

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,5 kg/ha.

Saugo nuo miltligės, rinchosporiozės, tinkliškosios dryžligės, smulkiųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu po 0,75 kg/ha, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

Rugiams.

Norma: 1,0–1,5 kg/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, miltligės, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

arba

Rugiams.

Norma: 1,5 kg/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, miltligės, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu po 0,75 kg/ha, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

Kvietrugiams.

Norma: 1,0–1,5 kg/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, miltligės, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

arba

Kvietrugiams.

Norma: 1,5 kg/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, miltligės, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu po 0,75 kg/ha, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

Avižoms.

Norma: 0,75–1,0 kg/ha.

Saugo nuo miltligės, avižų dryžligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

2. P r i p a ž i s t u netekusiu galios DuPont Finland Ltd. 2011 m. gegužės 4 d. išduotą fungicido *Acanto Prima* registracijos liudijimą 0334F/11.

3. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas