



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *GOLTIX SUPER* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2015 m. vasario 25 d. Nr. A1-101

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Goltix super* registracijos ataskaitos išvadomis,

perregistruoju herbicidą *Goltix super*, Adama Registrations B. V., profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. liepos 31 d.

Veikliosios medžiagos: metamitronas 350 g/l + etofumezatas 150 g/l

Herbicido forma: koncentruota suspensija

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sudėtyje yra 1,2-benzistiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metamitrono ir / arba etofumezato dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke, neviršijant 1 kg/ha etofumezato.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

Herbicidas naudojamas:

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, burokėliams.

Norma: 3,5–4,5 l/ha

Naikina dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.

Purkšti per 3 kartus, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnio (nepriklausomai nuo runkelių ar burokėlių augimo tarpsnio), pirmą kartą – 1,0 l/ha, antrą kartą 1,0–1,5 l/ha, trečią kartą 1,5–2,0 l/ha.

Direktorius

Sergejus Fedotovas