



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL BEICO *CHAMBEL 6 FS* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

2015 m. vasario 25 d. Nr. A1-102

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Chambel 6FS* registracijos ataskaitos išvadomis,

p e r r e g i s t r u o j u beicą *Chambel 6 FS*, Adama Registrations B. V., profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Veiklioji medžiaga: tebukonazolas 60 g/l

Beico forma: takus koncentratas sėklų beicavimui

Beicas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti paukščius / laukinius gyvūnus būtina beicuotas sėklas visiškai įterpti į dirvą; užtikrinti, kad beicuotos sėklos būtų visiškai įterptos vagų gale.

Siekiant apsaugoti paukščius / laukinius gyvūnus pašalinti pabiras ar išsiliejusi produktą.

Pakuotė: 1 l, 5 l.

Beicas naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Saugo nuo kietųjų kūlių.

Norma: 0,5 l/t

Beicuoti naudojant 5 l vandens 1 t sėklinių grūdų.

Vasariniams miežiams.

Saugo nuo dulkančiųjų kūlių, pašaknio puvinių, juostuotosios dryžligės, tinkliškosios dryžligės ankstyvuosiuose vystymosi tarpsniuose.

Norma: 0,5 l/t

Beicuoti naudojant 5 l vandens 1 t sėklinių grūdų.

Direktorius

Sergejus Fedotovas