



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *GOLTIX 700 SC* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2015 m. vasario 25 d. Nr. A1-103

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Goltix 700 SC* registracijos ataskaitos išvadomis,

p e r r e g i s t r u o j u herbicidą *Goltix 700 SC*, Adama Registrations B. V., profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Veiklioji medžiaga: metamitronas 700 g/l

Herbicido forma: koncentruota suspensija

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-3(2H)-izotiazolono mišinio su 2-metil-3(2H)-izotiazolonu. Gali sukelti alerginę reakciją.

Kenksminga prarijus.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo ir įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant apsaugoti gruntinį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metamitrono, dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke.

Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l

Herbicidas naudojamas:

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, burokėliams.

Norma: 3,0 l/ha

Naikina dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai runkeliai ar burokėliai yra nuo skilčialapių iki 8 tikrųjų lapelių (BBCH 10–18) tarpsnio, o piktžolės turi 2–4 tikruosius lapelius:

per 2 kartus – po 1,5 l/ha, per 3 kartus – po 1,0 l/ha, per 4 kartus – po 0,75 l/ha, kas 10–15 dienų.

Direktorius

Sergejus Fedotovas