



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *ARCHER TURBO 575 EC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2013 m. kovo 25 d. Nr. A1-105
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 90-2013; 2012, Nr. 63-3162) 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Archer Turbo 575 EC* registracijos ataskaitos išvadomis,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Archer Turbo 575 EC*, Syngenta Crop Protection AG, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Veikliosios medžiagos: propikonazolas 125 g/l + fenpropidinas 450 g/l.

Fungicidas klasifikuojamas:

Kenksmingas.

Aplinkai pavojingas.

Kenksmingas įkvėpus ir prarijus.

Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

Gali smarkiai pažeisti akis.

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Neįkvėpti garų / aerozolių.

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mėvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Pakuotė: 5 l.

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, miežiams, kvietrugiams.

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti bamblėjimo (BBCH 31-33) metu, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,75–1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rudųjų rūdžių, lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės.

Purkšti nuo bamblėjimo pabaigos iki žydėjimo vidurio (BBCH 37–65), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 0,75–1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rudųjų rūdžių, lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės.

Purkšti nuo bamblėjimo pabaigos iki žydėjimo vidurio (BBCH 37-65), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,75–1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, smulkiųjų rūdžių, rinchosporiozės, tinkliškosios dryžligės.

Purkšti nuo bamblėjimo pabaigos iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 37–59), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Žieminiams rugiams.

Norma: 0,8–1,0 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rudųjų rūdys, rinchosporiozės.

Purkšti nuo bamblėjimo pabaigos iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 32–59), ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas