



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2010 M.
BALANDŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. A1-075 „DĖL HERBICIDO *ACTIVUS 330 EC*
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2013 m. kovo 25 d. Nr. A1-108
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2010 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. A1-075 „Dėl herbicido *Activus 330 EC* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *ACTIVUS 330 EC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2010 m. vasario 25 d. protokole Nr. AS1-2, 2010 m. kovo 30 d. protokole Nr. AS1-3 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į pareiškėjo pateiktą informaciją ir pendimetalino liekanų vertinimo išvadas,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Activus 330 EC*, Makhteshim-Agan Holland B.V., profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: pendimetalinas 330 g/l.

Herbicidas klasifikuojamas:

Kenksmingas.

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Degus.

Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

Gali smarkiai pažeisti akis.

Kenksmingas – prarijus gali pakenkti plaučius.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Neįkvėpti garų / aerozolių.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mėvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones

Prarijus neskatinėti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Pakuotė: 1 l, 5 l.

Herbicidas naudojamas:

Vasariniams miežiams.

Norma: 4,0 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sėjos iki sudygimo arba sudygus, kai miežiai yra 1–3 lapelių tarpsnio, piktžolės yra 2 lapelių tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams miežiams su dobilų įsėliu.

Norma: 4,0 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sėjos iki sudygimo arba sudygus, kai miežiai yra 1–3 lapelių tarpsnio, piktžolės yra 2 lapelių tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Purškiant po sudygimo dobilai turi turėti bent vieną tikrąjį lapelį.

Pašariniams kukurūzams.

Norma: 3,0 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti per 5 dienas po kukurūzų sėjos arba sudygus, kukurūzams turint 1–4 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Žirniams.

Norma: 3,0 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo sėjos iki sudygimo arba kai žirniai yra 3–6 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Svogūnams, porams.

Norma: 2,0–3,0 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Auginant iš sėklų, purkšti tuoj po svogūnų / porų sėjos, auginant iš ropelių, purkšti prieš sodinimą. Po sudygimo purkšti, kai svogūnai / porai turi ne mažiau kaip 1 lapelį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Naudojant 2,0 l/ha purkšti ne daugiau kaip 2 kartus.

Morkoms, pastarnokams.

Norma: 4,0 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, iki morkų / pastarnokų sudygimo arba kai morkos bei pastarnokai turi 2 visiškai išsivysčiusius lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Briuselio kopūstams, gūžiniams kopūstams, žiediniams kopūstams, brokoliams.

Norma: 4,0 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti prieš kopūstų sudygimą arba prieš daigų persodinimą ne daugiau kaip 1 kartą.

Vyšnioms, slyvoms, obelims, kriaušėms.

Norma: 4,0 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vėlai rudenį arba anksti pavasarį, kol augalai yra ramybės būklės, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Nenaudoti pirmais vaismedžių pasodinimo metais.

Gervuogėms, aviečių ir gervuogių hibridams, avietėms, juodiesiems serbentams, agrastams.

Norma: 4,0 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kol augalai yra ramybės būklės, iki pumpurų susiformavimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Nenaudoti pirmais uogakrūmių pasodinimo metais.

Braškėms.

Norma: 4,0 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, braškių vegetacijos pabaigoje arba pavasarį, vėliausiai iki žiedyno pasirodymo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Nepurkšti ką tik pasodintų braškių, taip pat nepurkšti dirvos, kurioje bus sodinamos braškes.“

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas