



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M. KOVO 20  
D. ĮSAKYMO NR. A1-77 „DĖL FUNGICIDO *GLORIA* ĮREGISTRAVIMO  
PROFESIONALIAM IR INDIVIDUALIAM NAUDOJIMUI“ PAKĖITIMO**

2015 m. kovo 2 d. Nr. A1-113  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. A1-77 „Dėl fungicido *Gloria 450 SC* įregistravimo profesionaliam ir individualiam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *GLORIA* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM IR  
NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2006 m. kovo 15 d. protokole Nr. 2 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Gloria* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Gloria*, Bayer CropScience AG, profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: fenamidonas 75 g/l + propamokarbo hidrochloridas 375 g/l

Fungicido forma: koncentruota suspensija

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sudėtyje yra propamokarbo hidrochlorido ir 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos reikalavimus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 3 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos fenamidono, dažniau kaip kas dvejus metus tame pačiame lauke.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

Fungicidas naudojamas:

Bulvėms.

Norma: 2,0 l/ha

Saugo nuo maro ir sausligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

2. Į r e g i s t r u o j u fungicidą Gloria, Bayer CropScience AG, neprofesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: fenamidonas 75 g/l + propamokarbo hidrochloridas 375 g/l

Fungicido forma: koncentruota suspensija

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sudėtyje yra propamokarbo hidrochlorido ir 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 3 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos fenamidono, dažniau kaip kas dvejus metus tame pačiame lauke.

Pakuotė: 40 ml, 100ml, 200 ml

Fungicidas naudojamas:

Bulvėms.

Norma: 20 ml/a

Saugo nuo maro ir sausligės.

Purškti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas