



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *ACANTO PRIMA* PERREGISTRAVIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2011 m. balandžio 28 d. Nr. A1- 132  
Vilnius

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2011 m. balandžio 15 d. protokole Nr. AS1-3 pateiktomis rekomendacijomis,

p e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Acanto Prima*, Du Pont Finland Ltd., profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: pikoksistrobinas 80 g/kg + ciprodinilas 300 g/kg.

Fungicidas klasifikuojamas:

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius, nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Mūvėti tinkamas pirštines.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 metrus iki paviršinių vandens telkinių.

Pakuotė: 5 kg.

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 1,0–1,5 kg/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 1,5 kg/ha (po 0,75 kg/ha 2 kartus).

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu po 0,75 kg/ha, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,0–1,5 kg/ha.

Saugo nuo miltligės, rinchosporiozės, tinkliškosios dryžligės, smulkiųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,5 kg/ha (po 0,75 kg/ha 2 kartus).

Saugo nuo miltligės, rinchosporiozės, tinkliškosios dryžligės, smulkiųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu po 0,75 kg/ha, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

Rugiams.

Norma: 1,0–1,5 kg/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, miltligės, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

Rugiams.

Norma: 1,5 kg/ha (po 0,75 kg/ha 2 kartus).

Saugo nuo rudųjų rūdžių, miltligės, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu po 0,75 kg/ha, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

Kvietrugiams.

Norma: 1,0–1,5 kg/ha.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, miltligės, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

Kvietrugiams.

Norma: 1,5 kg/ha (po 0,75 kg/ha 2 kartus).

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, miltligės, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu po 0,75 kg/ha, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

Avižoms.

Norma: 0,75–1,0 kg/ha.

Saugo nuo miltligės, avižų dryžligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

Direktorius

Evaldas Zigmantas Čijauskas