



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *FALCON PLUS* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2019 m. kovo 6 d. Nr. A1-134

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikiniančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/605 (OL 2018 L 101, p. 33), 40 straipsnio 1 dalies b punktu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Falcon Plus* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Įregistruoju fungicidą *Falcon Plus*, Bayer AG, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. liepos 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos – prokvinazidas 40 g/l + protiokonazolas 160 g/l + spiroksaminas 200 g/l.

1.2. Fungicido forma – koncentruota emulsija.

1.3. Fungicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/1480 (OL 2018 L 251, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinaamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Pavojinga“.

1.3.2. Pavojingumo frazes:

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Smarkiai pažeidžia akis.

Kenksmingas įkvėpus.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Gali pakenkti akims, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.3.3. Atsargumo frazes:

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra, ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.3.4. Papildomas ir specialiasias saugos frazes:

10,9 procentus mišinio sudaro nežinomo toksiškumo įkvėpus sudedamosios dalys.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotės: 5 l, 15 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma – 0,75 l/ha.

Saugo nuo miltligės, lapų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių.

Purkšti nuo bamblių pradžios iki vamzdelėjimo pabaigos (BBCH 30–49), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma – 0,75 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki antro bamblio susidarymo (BBCH 30–32), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma – 0,75 l/ha.

Saugo nuo miltligės, tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki vamzdelėjimo pabaigos (BBCH 30–49), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma – 0,75 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki antro bamblio susidarymo (BBCH 30–32), ne daugiau kaip 1 kartą.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma – 0,75 l/ha.

Saugo nuo miltligės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, rinchosporiozės, lapų septoriozės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki vamzdelėjimo pabaigos (BBCH 30–49), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma – 0,75 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki antro bamblio susidarymo (BBCH 30–32), ne daugiau kaip 1 kartą.

Rugiams.

Norma – 0,75 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rudųjų rūdžių, rinchosporiozės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki vamzdelėjimo pabaigos (BBCH 30–49), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Rugiams.

Norma – 0,75 l/ha.

Saugo nuo stiebalūžės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki antro bamblio susidarymo (BBCH 30–32), ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas