



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2010 M.
VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A1-020 „DĖL INSEKTICIDO *CYPERKILL 500 EC*
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. kovo 17 d. Nr. A1-133
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2010 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. A1-020 „Dėl insekticido *Cyperkill 500 EC* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO *CYPERKILL 500 EC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2009 m. gruodžio 3 d. protokole Nr. AS1-6 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Cyperkill 500 EC* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

į r e g i s t r u o j u insekticidą *Cyperkill 500 EC*, Agriphar S. A., profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: cipermetrinas 500 g/l.

Insekticido forma: koncentruota emulsija.

Insekticidas klasifikuojamas:

Degūs skystis ir garai.

Kenksmingas įkvėpus.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Dirgina odą.

Smarkiai pažeidžia akis.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiovimą arba skilinėjimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. Nerūkyti.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius / ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Pavoingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto augalų žydėjimo metu. Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu. Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių.

Pakuotė: 1 l, 5 l

Insekticidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, rugiams, kvietrugiams, miežiams.

Norma: 0,05 l/ha

Naikina amarus, švedines museles, tripsus, lemus, pjūklelius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 28 d.

Vasariniams kviečiams, kvietrugiams, miežiams, avižoms.

Norma: 0,05 l/ha

Naikina amarus, švedines museles, tripsus, lemus, pjūklelius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 28 d.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 0,05 l/ha

Naikina rapsinius žiedinukus, rapsines ir kryžmažiedes sprages, rapsinius ir kopūstinius paslėptastraublius, ankštarinius paslėptastraublius, ankštarinius gumbauodžius, rapsinius pjūklelius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 49 d.

Žirniams, pupoms.

Norma: 0,05 l/ha

Naikina sitonus, žirninius vaisėdžius, pupinius amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 14 d.

Žiediniams ir gūžiniams kopūstams.

Norma: 0,05 l/ha

Naikina kryžmažiedes sprages, kopūstinius paslėptastraublius, kopūstinius pelėdgalvius, baltukus, rapsinius pjūklelius, kopūstines kandis, amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 7 d.

Svogūnams, porams, česnakams.

Norma: 0,05 l/ha

Naikina tripsus, kandis.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 7 d.

Bulvėms.

Norma: 0,05 l/ha

Naikina kolorado vabalus, amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 7 d.

Dekoratyviems augalams.

Norma: 0,1 l/ha

Naikina amarus, tripsus, sprages.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus.“

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Basiulis