



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M. KOVO 20
D. ĮSAKYMO NR. A1-77 „DĖL FUNGICIDO *GLORIA* ĮREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM IR NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKĖITIMO**

2016 m. kovo 4 d. Nr. A1-137
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. A1-77 „Dėl fungicido *Gloria* įregistravimo profesionaliajam ir neprofesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *GLORIA* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM IR
NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2006 m. kovo 15 d. protokole Nr. 2 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į *Gloria* klasifikavimo 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1), išvadas ir į 2016 m. vasario 29 d. Bayer CropScience AG prašymą:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Gloria*, Bayer CropScience AG, profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. liepos 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: fenamidonas 75 g/l + propamokarbo hidrochloridas 375 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sudėtyje yra propamokarbohidrochlorido ir 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos reikalavimus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 3 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos fenamidono, dažniau kaip kas dvejus metus tame pačiame lauke.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Bulvėms.

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo nuo maro ir sausligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus mažiausiai kaip 7 dienoms.

2. Į r e g i s t r u o j u fungicidą Gloria, Bayer CropScience AG, neprofesionaliajam naudojimui iki 2017 m. liepos 31 d.

2.1. Veikliosios medžiagos: fenamidonas 75 g/l + propamokarbo hidrochloridas 375 g/l.

2.2. Fungicido forma: koncentruota suspensija.

2.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sudėtyje yra propamokarbohidrochlorido ir 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 3 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos fenamidono, dažniau kaip kas dvejus metus tame pačiame lauke.

2.4. Pakuotė: 40 ml, 100ml, 200 ml.

2.5. Fungicidas naudojamas:

Bulvėms.

Norma: 20 ml/a

Saugo nuo maro ir sausligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

3. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas