



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *TOPAS (A6209G)* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

2015 m. kovo 17 d. Nr. A1-138  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Topas (A6209G)* registracijos ataskaitos išvadomis,

p e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Topas (A6209G)*, Syngenta Polska Sp. z o.o., profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Veiklioji medžiaga: penkonazolas 100 g/l.

Fungicido forma: koncentruota emulsija.

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių /vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra penkonazolo, dažniau nei du kartus per trejus metus tame pačiame lauke.

Pakuotė: 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l

Fungicidas naudojamas:

Obelims, kriaušėms.

Norma: 0,5 l/ha

Saugo nuo miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Agurkams lauke ir šiltnamiuose.

Norma: 0,5 l/ha

Saugo nuo miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Pomidorams lauke ir šiltnamiuose.

Norma: 0,5 l/ha

Saugo nuo miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Paprikoms lauke ir šiltnamiuose.

Norma: 0,5 l/ha

Saugo nuo miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Arbūzams, cukinijoms, melionams, moliūgams lauke ir šiltnamiuose.

Norma: 0,5 l/ha

Saugo nuo miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Juodiesiems, raudoniesiems serbentams, agrastams.

Norma: 0,5 l/ha

Saugo nuo tamsiosios miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 20 dienų.

Braškėms lauke.

Norma: 0,5 l/ha

Saugo nuo miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Braškėms šiltnamiuose.

Norma: 0,5 l/ha

Saugo nuo miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Vynuogėms.

Norma: 0,3 l/ha

Saugo nuo miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Dekoratyviems augalams lauke ir šiltnamiuose.

Norma: 0,5 l/ha

Saugo nuo miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą.

Vyšnioms.

Norma: 0,5 l/ha

Saugo nuo kokomikozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 20 dienų.

Direktoriaus pavaduotojas,  
atliekantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Basiulis