



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *PICTOR ACTIVE* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2018 m. kovo 28 d. Nr. A1-141

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Pictor Active* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Įregistruoju fungicidą *Pictor Active*, BASF A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. liepos 31 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: boskalidas 150 g/l + piraklostrobinas 250 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Dirgina odą.

Kenksmingas įkvėpus.

Kenksmingas prarijus.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių.

1.4. Pakuotė: 0,5; 1,0; 5,0 ir 10 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, juodosios dėmėtligės.

Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60–69), ne daugiau kaip 1 kartą;
arba

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, juodosios dėmėtligės.

Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60–69), ne daugiau kaip 2 kartus.

Žieminiams ir vasariniams rapsukams, baltosioms ir juodosioms garstyčioms, daržinėms aguonoms, aliejiniams ridikams (*Pictor Active* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, alternariozės.

Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60–69), ne daugiau kaip 1 kartą;
arba

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, alternariozės.

Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60–69), ne daugiau kaip 2 kartus.

Pluoštiniams ir sėmeniniams linams (*Pictor Active* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,6–1,0 l/ha.

Saugo nuo fomezės, alternariozės.

Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60–69), ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Norma: 0,5 l/ha.

Saugo nuo fomezės, alternariozės.

Purkšti žydėjimo tarpsniu (BBCH 60–69), ne daugiau kaip 2 kartus.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas