



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2010 M.
BALANDŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. A1-075 „DĖL HERBICIDO *ACTIVUS 330 EC*
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2015 m. kovo 20 d. Nr. A1-142
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2010 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. A1-075 „Dėl herbicido *Activus 330 EC* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *ACTIVUS 330 EC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2010 m. vasario 25 d. protokole Nr. AS1-2, 2010 m. kovo 30 d. protokole Nr. AS1-3 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į pendimetalino liekanų vertinimo išvadas ir į *Activus 330 EC* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas ir Adama Registrations B.V. 2015 m. kovo 5 d. pateiktą paraišką,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Activus 330 EC*, Adama Registrations B. V., profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: pendimetalinas 330 g/l

Herbicido forma: koncentruota emulsija

Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Sudėtyje yra pendimetalino. Gali sukelti alerginę reakciją.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Dirgina odą.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Degūs skystis ir garai.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro - iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l

Herbicidas naudojamas:

Vasariniams miežiams.

Norma: 4,0 l/ha

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sėjos iki sudygimo arba sudygus, kai miežiai yra 1–3 lapelių tarpsnio, piktžolės yra 2 lapelių tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams miežiams su dobilų įsėliu.

Norma: 4,0 l/ha

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti po sėjos iki sudygimo arba sudygus, kai miežiai yra 1–3 lapelių tarpsnio, piktžolės yra 2 lapelių tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Purškiant po sudygimo dobilai turi turėti bent vieną tikrąjį lapelį.

Pašariniams kukurūzams.

Norma: 3,0 l/ha

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti per 5 dienas po kukurūzų sėjos arba sudygus, kukurūzams turint 1–4 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Žirniams.

Norma: 3,0 l/ha

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo sėjos iki sudygimo arba kai žirniai yra 3–6 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Svogūnams, porams.

Norma: 2,0 – 3,0 l/ha

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Auginant iš sėklų, purkšti tuoj po svogūnų / porų sėjos, auginant iš ropelių, purkšti prieš sodinimą. Po sudygimo purkšti, kai svogūnai / porai turi ne mažiau kaip 1 lapelį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Naudojant 2,0 l/ha purkšti ne daugiau kaip 2 kartus.

Morkoms, pastarnokams.

Norma: 4,0 l/ha

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, iki morkų / pastarnokų sudygimo arba kai morkos bei pastarnokai turi 2 visiškai išsivysčiusius lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Briuseliniams kopūstams, gūžiniams kopūstams, žiediniams kopūstams, brokolinitams kopūstams.

Norma: 4,0 l/ha

Naikina vienametės vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti prieš kopūstų sudygimą arba prieš daigų persodinimą ne daugiau kaip 1 kartą.

Vyšnioms, slyvoms, obelims, kriaušėms.

Norma: 4,0 l/ha

Naikina vienametės vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vėlai rudenį arba anksti pavasarį, kol augalai yra ramybės būklės, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Nenaudoti pirmais vaismedžių pasodinimo metais.

Gervuogėms, aviečių ir gervuogių hibridams, avietėms, juodiesiems serbentams, agrastams.

Norma: 4,0 l/ha

Naikina vienametės vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kol augalai yra ramybės būklės, iki pumpurų susiformavimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Nenaudoti pirmais uogakrūmių pasodinimo metais.

Braškėms.

Norma: 4,0 l/ha

Naikina vienametės vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti braškių vegetacijos pabaigoje arba pavasarį, vėliausiai – iki žiedyno pasirodymo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba. Nepurkšti ką tik pasodintų braškių, taip pat nepurkšti dirvos, kurioje bus sodinamos braškės.“

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Basiulis