



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *SILTRA XPRO* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

2015 m. sausio 9 d. Nr. A1- 14

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikiniančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB 40 straipsnio 1 (a) punktu (OL 2009 L309, p. 1), 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Siltra Xpro* registracijos ataskaitos išvadomis,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Siltra Xpro*, Bayer CropScience AG, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. liepos 31 d.

Veiklioji medžiaga: biksafenas 60 g/l + protiokonazolas 200 g/l.

Fungicido forma: koncentruota emulsija.

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksmingas prarijus.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Pakuotė: 5 l, 15 l

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių, miltligės, varpų fuzariozės.

Norma: 0,75–1,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip vieną kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Vasariniams ir žieminiams kvietrugiams.

Saugo nuo lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rinchosporiozės, rudųjų ir geltonųjų rūdžių, miltligės, varpų fuzariozės.

Norma: 0,75–1,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip vieną kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams rugiams.

Saugo nuo miltligės, rinchosporiozės, rudųjų rūdžių, varpų fuzariozės.

Norma: 0,75–1,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip vieną kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Saugo nuo miltligės, tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių, ramuliarijos, varpų fuzariozės.

Norma: 0,75–1,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip vieną kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Avižoms.

Saugo nuo avižų dryžligės, varpų fuzariozės.

Norma: 0,75–1,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip vieną kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Direktorius

Sergejus Fedotovas