



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**Į SAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO *SATEL 100 EW* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2018 m. balandžio 4 d. Nr. A1-152
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu ir atsižvelgdamas į FMC Chemical sprl 2018 m. kovo 15 d. prašymą:

1. Į r e g i s t r u o j u insekticidą *Satel 100 EW*, FMC Chemical sprl, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. lapkričio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: zeta cipermetrinas 100 g/l.

1.2. Insekticido forma: aliejinė vandeninė emulsija.

1.3. Insekticidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksmingas prarijus.

Kenksmingas įkvėpus.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną purškiant rapsus ir bulves bei 15 metrų apsaugos zoną purškiant javus iki paviršinio vandens telkinių bei 1 metro – iki melioracijos griovių.

Pavoingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų žydėjimo metu. Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu. Pašalinti ir uždengti bičių avilius purškimo metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių. Sunaikinti piktžoles iki jų žydėjimo.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l.

1.5. Insekticidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams ir vasariniams miežiams, vasariniams kvietrugiams.

Naikina amarus, lemus, javinius lapinius pjūklelius.

Norma: 0,07–0,1 l/ha.

Naikina gumbauodžius.

Norma: 0,15 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Žieminiams rugiams, kvietrugiams.

Naikina amarus, lemus, javinius lapinius pjūklelius.

Norma: 0,07–0,1 l/ha.

Naikina tripsus, gumbauodžius.

Norma: 0,15 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Naikina sprages, rapsinius žiedinukus.

Norma: 0,07–0,1 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms.

Bulvėms.

Naikina kolorado vabalus.

Norma: 0,07–0,1 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, raudoniesiems burokėliams.

Naikina amarus.

Norma: 0,1 l/ha.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas