



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *PROSARO* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2015 m. sausio 9 d. Nr. A1- 14

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Prosaro* registracijos ataskaitos išvadamis,

p e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Prosaro*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. liepos 31 d.

Veikliosios medžiagos: protiokonazolas 125 g/l + tebukonazolas 125 g/l.

Fungicido forma: koncentruota emulsija.

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 2-[2-(1-chlorciklopropil)-2-hidroksi-3-fenilpropil]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-iono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo / filtravimo sistema).

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus purškiant žieminius javus, pupas, žirnius ir rapsus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus purškiant vasarinius javus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l, 50 l HDPE

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Saugo nuo miltligės, lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės, rudųjų rūdžių, varpų fuzariozės.

Norma: 0,75–1,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams kvietrugiams.

Saugo nuo septoriozės, rudųjų rūdžių, varpų fuzariozės.

Vasariniams kvietrugiams.

Saugo nuo septoriozės, miltligės, rudųjų rūdžių, varpų fuzariozės.

Norma: 0,75–1,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams miežiams.

Saugo nuo miltligės, rinchosporiozės.

Vasariniams miežiams.

Saugo nuo miltligės, rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių, tinkliškosios dryžligės, rudadėmės dryžligės, miežių septoriozės.

Norma: 0,75–1,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žieminiams rapsams.

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, fomozės, sklerotinio (baltojo) puvinio, pilkojo puvinio.

Vasariniams rapsams.

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, sklerotinio (baltojo) puvinio.

Norma: 1,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 d.

Pupoms (*Prosaro* registruotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Saugo nuo askochitozės, rudosios dėmėtligės, rūdžių.

Norma: 1,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Žirniams (*Prosaro* registruotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Saugo nuo askochitozės, rudosios dėmėtligės, miltligės.

Norma: 1,0 l/ha

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Direktorius

Sergejus Fedotovas