



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2008 M.
SPALIO 17 D. ĮSAKymo NR. A1-213 „DĖL FUNGICIDO ZAMIR 400 EW
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2015 m. kovo 25 d. Nr. A1-160
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2008 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. A1-213 „Dėl fungicido *Zamir 400 EW* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO AMPERA ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokole Nr. AS1-5 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Ampera* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Ampera*, ADAMA Registrations B. V., profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: tebukonazolas 133 g/l + prochlorazas 267 g/l

Fungicido forma: aliejinė vandeninė emulsija

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksmingas prarijus.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra propano rūgšties 2-hidroksi-, 2-etilheksiloesteris. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu. Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10l, 20 l, 200 l

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha

Saugo nuo stiebalūžės, lapų septoriozės, varpų septoriozės, miltligės, rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių, varpų fuzariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus 30 dienų.

Pastaba. Didesnė fungicido norma naudojama jautresnių ligoms kviečių veislėms ar intensyviai plintant ligoms ir kai pasėliai purškiami vieną kartą.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha

Saugo miežius nuo tinkliškosios dryžligės, smulkiųjų rūdžių, rinchosporiozės, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus 30 dienų.

Pastaba. Didesnė fungicido norma naudojama jautresnių ligoms miežių veislėms ar intensyviai plintant ligoms ir kai pasėliai purškiami vieną kartą.

Rugiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha

Saugo rugius nuo miltligės, rudųjų rūdžių, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus 30 dienų.

Pastaba. Didesnė fungicido norma naudojama jautresnių ligoms rugių veislėms ar intensyviai plintant ligoms ir kai pasėliai purškiami vieną kartą.

Kvietrugiams.

Norma: 1,0–1,5 l/ha

Saugo rugius nuo miltligės, rudųjų rūdžių, lapų ir varpų septoriozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, paskutinį kartą – iki derliaus nuėmimo likus 30 dienų.

Pastaba. Didesnė fungicido norma naudojama jautresnių ligoms kvietrugių veislėms ar intensyviai plintant ligoms ir kai pasėliai purškiami vieną kartą.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 1,0–1,2 l/ha

Saugo rapsus nuo juodosios dėmėtligės, baltojo sklerotinio puvinio, fomezės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus 56 dienoms.

Pastaba. Didesnė fungicido norma naudojama jautresnių ligoms rapsų veislėms ar intensyviai plintant ligoms.“