



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *ACCURATE 200 WG* REGISTRACIJOS ATNAUJINIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2017 m. kovo 28 d. Nr. A1-162

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančiu Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1) 43 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), įgyvendindamas 2016 m. vasario 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/139, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos metilmetsulfurono, kaip keistinos medžiagos, patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (OL 2016 L 27 p.7), ir atsižvelgdamas į *Accurate 200 WG* registracijos ataskaitos išvadas:

1. A t n a u j i n u herbicido *Accurate 200 WG*, Cheminova A/S, registraciją profesionaliajam naudojimui iki 2024 m. kovo 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: metsulfuron metilas 200 g/kg.

1.2. Herbicido forma: vandenyje dispersiškos granulės.

1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių; vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotė: 100 g.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams.

Norma: 10 g/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–29), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 60 dienų;

arba

Žieminiams kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams.

Norma: 20 g/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo bamblių pradžia iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30–32) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 60 dienų.

Vasariniams kviečiams, miežiams, avižoms.

Norma: 10 g/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo trečiojo šoninio lapo iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13–29), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 60 dienų;

arba

Vasariniams kviečiams, miežiams, avižoms.

Norma: 20 g/ha.

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti nuo bamblių pradžia iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30–32), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 60 dienų.

Ne žemės ūkio paskirties plotuose (*Accurate 200 WG* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 20 g/ha.

Naikina Sosnovskio barščius.

Pavasari, kai Sosnovskio barščiai pradeda vegetaciją, t. y. yra 2–8 lapelių (20–30 cm dydžio rozetės iki pradendant auginti stiebą), mišinyje su *Nuance 75 WG* 10 g/ha ir *PAM ekstra* 200 g/ha, ne daugiau kaip 1 kartą;

arba

Ne žemės ūkio paskirties plotuose (*Accurate 200 WG* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 20 g/ha.

Naikina Sosnovskio barščius.

Vasarą, po mechaninio šienavimo praėjus 2–3 savaitėms, kai Sosnovskio barščiai išauga iki 20–30 cm dydžio, mišinyje su *Nuance 75 WG* 10 g/ha ir *PAM ekstra* 200 g/ha, ne daugiau kaip 1 kartą.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas