



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2007 M.  
BALANDŽIO 16 D. ĮSAKIMO NR. A1-110 „DĖL INSEKTICIDO *BULLDOCK 025 EC*  
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“  
PAKEITIMO**

2015 m. kovo 25 d. Nr. A1- 163  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. A1-110 „Dėl insekticido *Bulldock 025 EC* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL INSEKTICIDO *BULLDOCK 025 EC* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. kovo 30 d. protokole Nr. 3 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Bulldock 025 EC* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

p e r r e g i s t r u o j u insekticidą *Bulldock 025 EC*, ADAMA Registrations B. V., profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: beta-cyflutrinas 25 g/l

Insekticido forma: koncentruota emulsija

Insekticidas klasifikuojamas:

Pavojinga.

Degūs skystis ir garai.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Kenksminga prarijus ir įkvėpus.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių.

Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną purškiant rapsus, bulves, kopūstus, ir 15 m – purškiant sodus iki paviršinio vandens telkinių bei 1 metro apsaugos zoną iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną lauko pasėliams ir 10 m – sodams iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto bičių aktyvaus maitinimosi metu. Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 20 l

Insekticidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 0,2–0,3 l/ha

Naikina rapsines ir kryžmažiedes sprages, rapsinius žiedinukus, rapsinius ir kopūstinius paslėptastraublius, ankštinius paslėptastraublius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 d.

Vasariniams miežiams.

Norma: 0,1–0,3 l/ha

Naikina ievinius ir javinius amarus, javines museles, javinius geltonuosius pjūklelius, tripsus, sprages.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

Žieminiams kviečiams, kvietrugiams, rugiams.

Norma: 0,2–0,3 l/ha

Naikina ruginius ir tuščiažiedžius tripsus ir javinius amarus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

Bulvėms.

Norma: 0,15–0,25 l/ha

Naikina kolorado vabalus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 d.

Obelims ir kriaušėms.

Norma: 0,2–0,3 l/ha

Naikina obelinius žiedgraužius ir vaisėdžius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 d.

Kopūstams

Norma: 0,2 l/ha

Naikina kopūstinio ir ropinio baltuko vikšrus, kopūstines kandis, kopūstinius pelėdgalvius, amarus, sprages ir paslėptastraublius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14d.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas