



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL INSEKTICIDO *DELMETROS 100 SC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

2019 m. kovo 22 d. Nr. A1-167  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/605 (OL 2018 L 101, p. 33), 40 straipsnio 1 dalies b punktu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Delmetros 100 SC* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u insekticidą *Delmetros 100 SC*, Innvigo Sp. z o.o, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. spalio 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: deltametrinas 100 g/l.

1.2. Insekticido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Insekticidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/1480 (OL 2018 L 251, p. 1), klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinis žodis nepriskiriamas.

1.3.2. Pavojaus frazės:

Kenksminga prarijus.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

### 1.3.3. Atsargumo frazės:

Naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

### 1.3.4. Papildomas ir specialiąsias saugos frazės:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. 3 procentus mišinio sudaro nežinomo toksiškumo prarijus sudedamosios dalys. 3,6 procento mišinio sudaro nežinomo toksiškumo susilietus su oda ir įkvėpus sudedamosios dalys.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus būtina išlaikyti 5 m apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pavoingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto bičių aktyvaus maitinimosi metu.

1.4. Pakuotės: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l.

### 1.5. Insekticidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Norma: 0,05 l/ha.

Naikina raudonkrūtinis lemus.

Purkšti nuo tada, kai matyti pirmieji akuotai iki pieninės brandos pabaigos (BBCH 49–79), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų.

Vasariniams miežiams.

Norma: 0,05 l/ha.

Naikina raudonkrūtinis lemus.

Purkšti nuo nuo vamzdelėjimo vidurio iki pieninės brandos vidurio (BBCH 45–75), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų.

Bulvėms.

Norma: 0,05 l/ha.

Naikina kolorado vabalų lervas.

Purkšti nuo tada, kai matomi pirmojo žiedyno pumpurai, iki išsiskleidžia 50 proc. pirmojo žiedyno žiedų (BBCH 51–65), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Žieminiams rapsams.

Norma: 0,05 l/ha.

Naikina rapsines sprages, pavasarines kopūstines muses.

Purkšti rudenį, kai rapsai turi 2–5 tikruosius lapelius (BBCH 12–15);

arba

Naikina rapsinius žiedinukus.

Purkšti nuo tada, kai pagrindinio žiedyno butonai išsiskirstę, tačiau neišsiskleidę, iki matomi pirmieji žiedlapiai, tačiau butonai vis dar neišsiskleidę (geltoni butonai) (BBCH 55–59);

arba

Naikina ankštarinius paslėptastraublius, ankštarinius gumbauodžius.

Purkšti nuo žydėjimo pabaigos iki pirmųjų ankštarių formavimosi pradžios (BBCH 67–72).

Purkšti žieminius rapsus tik 1 kartą per auginimo sezoną, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 45 dienoms.

Gūžiniams kopūstams (*Delmetros 100 SC* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2008 L 309, p. 1) 51 straipsnį).

Norma: 0,05 l/ha.

Naikina kopūstinius baltukus, ropinius baltukus, kopūstinius amarus, kopūstinius pelėdgalvius, pavasarines kopūstines muses.

Purkšti nuo gūžės formavimosi pradžios iki susiformuoja būdingas gūžės dydis, forma ir kietumas (BBCH 41–49), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotoja,  
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė