



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2009M.
GRUODŽIO 16 D. ĮSAKIMO NR. A1-245 „DĖL FUNGICIDO *SIGNUM*
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2012 m. birželio 18 d. Nr. A1-175
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2009 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. A1-245 „Dėl fungicido *Signum* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ (Informaciniai pranešimai, 2009, Nr. 101-1238) ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *SIGNUM* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2009 m. gruodžio 3 d. protokole Nr. AS1-6, 2012 m. birželio 7 d. protokole Nr. AS1-4 pateiktomis rekomendacijomis,

p e r r e g i s t r u o j u fungicidą *Signum*, BASF A/S profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: boskalidas 267 g/kg + piraklostrobinas 67 g/kg.

Fungicidas klasifikuojamas:

Kenksmingas.

Aplinkai pavojingas.

Rizikos frazės:

Gali pakenkti negimusiam vaikui.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius, nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Neįkvėpti aerozolių.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mėvėti tinkamas pirštines.

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną purškiant daržoves ir braškes, 10 metrų apsaugos zoną purškiant juoduosius serbentus, avietes ir pušų sodinukus ir 20 metrų apsaugos zoną purškiant kaulavaisius iki paviršinio vandens telkinių.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg.

Fungicidas naudojamas:

Gūžiniams kopūstams.

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo alternariozės, baltųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Morkoms.

Norma: 0,75–1,0 kg/ha.

Saugo nuo juodosios dėmėtligės, miltligės, dalinai nuo sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Porams.

Norma: 1,5 kg/ha.

Saugo nuo puvinų.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Svogūnams.

Norma: 1,5 kg/ha.

Saugo nuo puvinų.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Salotoms.

Norma: 1,5 kg/ha.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, sklerotinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Žirniams ir pupoms (grūdams).

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, pupų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 21 dienai.

Braškėms.

Norma: 1,8 kg/ha.

Saugo nuo kekerinio puvinio, šviesmargės, miltligės, braškių juodosios dėmėtligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Bulvėms.

Norma: 0,2 kg/ha.

Saugo nuo bulvių alternariozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Vyšnioms, slyvoms.

Norma: 0,75 kg/ha.

Saugo nuo pilkojo kekerinio puvinio, monilozės, vaisių rudojo puvinio, kokomikozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Juodiesiems serbentams.

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo degulių, miltligės, kekerinio puvinio.

Purkšti žydėjimo pradžioje – brandos pradžioje (BBCH 59 – 75) ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Juodiesiems serbentams.

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo šviesmargės, degulių, miltligės, kekerinio puvinio.

Purkšti po derliaus nuėmimo ne daugiau kaip 1 kartą.

Avietėms.

Norma: 1,5 kg/ha.

Saugo nuo žievėplaišos, kekerinio puvinio.

Purkšti vegetacijos metune daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Pušų sodmenims medelynuose.

Norma: 1,0 kg/ha.

Saugo nuo spygliakritės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus.”

Direktorius

Evaldas Zigmas Čijauskas