



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SPALIO 22 D. ĮSAKIMO NR. A1-114 „DĖL
HERBICIDO *ROSATE 36* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2015 m. kovo 31 d. Nr. A1-181
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. spalio 22 d. įsakymą Nr. A1-114 „Dėl herbicido *Rosate 36* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *ROSATE 36* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2010 m. gegužės 25 d. protokole Nr. AS1-4 ir 2010 m. rugsėjo 14 d. protokole Nr. AS1-5 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Rosate 36* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Rosate 36*, Albaugh UK Limited, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l.

Herbicido forma: tirpus koncentratas.

Herbidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Pakuotė: 0,5 l, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 200 l, 1000 l.

Pastaba: 1000 l pakuotės skirtos tik profesionaliems naudotojams, naudojančioms didelius šių herbicidų kiekius.

Herbidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams ir vasariniams miežiams, avižoms.

Norma: 2,0-4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 proc. ne daugiau kaip vieną kartą, ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 10 dienų.

Pastaba. Nenaudoti sėkliniuose kviečių, miežių ir avižų pasėliuose.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 3,0-4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne daugiau kaip vieną kartą, ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 14 dienų.

Pastaba. Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose.

Garstyčioms.

Norma: 3,0-4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti kai vidutinė garstyčių sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne daugiau kaip vieną kartą, ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 10 dienų.

Pastaba. Nenaudoti sėklinių garstyčių pasėliuose.

Žirniams, lauko pupoms.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti kai grūdų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc. ne daugiau kaip vieną kartą, ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 10 dienų.

Pastaba. Nenaudoti sėklinių žirnių ir pupų pasėliuose.

Linams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc. ne daugiau kaip vieną kartą, ne vėliau nei iki derliaus nuėmimo likus 14 dienų.

Pastaba. Nenaudoti sėklinių linų pasėliuose.

Ražienoms, laukams prieš sėją arba sodinimą, išskyrus sodus.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti ne daugiau kaip vieną kartą.

Pastaba. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Plotams žalienoms atsėti, augalams sodinti arba sėti

Norma: 3,0 l/ha.

Naikina trumpos sėjomainos svidres, taip pat vienameses piktžoles.

Norma: 4,0 l/ha

Naikina 2-4 metų žalienas, kuriose vyrauja daugiamesės vienaskiltės piktžolės.

Norma: 5,0 l/ha.

Naikina 4-7 metų žalienas, kuriose vyrauja daugiameses dviskiltes piktžoles.

Norma 6,0 l/ha.

Naikina ilgalaikes ganyklas.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip vieną kartą.

Plotams, kuriuose bus sodinami sodai.

Norma: 4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles ariamoje žemėje.

Norma: 5,0 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles pievose arba ganyklose.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu ne daugiau kaip vieną kartą.

Pastaba. Nesodinti medelių 7 dienas po purškimo.

Obelių, kriaušių, slyvų ir vyšnių pomedžiams.

Norma: 5,0 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, šaknų atžalas.

Purkšti, kai vaismedžiai (obelys, kriaušės) numeta lapus rudenį arba pavasarį iki žaliojo pumpuro tarpsnio arba iki vyšnių, slyvų baltojo pumpuro tarpsnio piktžolių vegetacijos metu ne daugiau kaip vieną kartą apsaugant vaismedžius.

Pastaba. Nenaudoti jaunesniuose nei 2 metų soduose.

Ne žemės ūkio paskirties plotams.

Norma: 2,0 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu ne daugiau kaip vieną kartą.

Norma: 5,0 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu ne daugiau kaip vieną kartą.

Plotams skirtiems miškų sodinimui.

Norma: 4,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles ariamoje žemėje.

Norma: 5,0 l/ha.

Naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles ganyklose.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu ne daugiau kaip vieną kartą.

Pastaba. Nesodinti medelių 7 dienas po purškimo.

Plotams pasodinus medelius.

Norma: 3,0 l/ha.

Naikina sumedėjusias piktžoles, taip pat alksnius, gervuoges, lazdynus, klevus, karklus.

Norma: 4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, viržius durpingose dirvose.

Norma: 6,0 l/ha.

Naikina viržius mineralinėse dirvose.

Purkšti vegetacijos metu apsaugant medelius ne daugiau kaip vieną kartą.

Kelmų apdorojimui.

Norma lapuočių medžių kelmams 1 dalis Rosate 36 ir 9 dalys vandens (10% tirpalas).

Spygliuočių kelmams 1 dalis Rosate 36 ir 4 dalys vandens (20% tirpalas).

Tirpalu aptepti šviežiai nupjauto medžio kelmo paviršių arba įšvirkšti tirpalą su inžektoriais, arba specialiai pritaikytais pjūklais.

Nepageidaujamų spygliuočių ir lapuočių medžių naikinimas.

Norma: 2 ml neskiesto *Rosate 36*

Įšvirkšti į medžių kamienus.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas