



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2007 M.
GRUODŽIO 17 D. ĮSAKIMO NR. A1-309 „DĖL HERBICIDO *BARCLAY BARBARIAN*
BIOGRADE 360 ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2015 m. kovo 31 d. Nr. A1-182
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. A1-309 „Dėl herbicido *Barclay Barbarian Biograde 360* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *BARCLAY BARBARIAN BIOGRADE 360* PERREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. lapkričio 27 d. protokole Nr. AS1-7 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Barclay Barbarian Biograde 360* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Barclay Barbarian Biograde 360*, Barclay Chemicals (R&D) Limited profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l.

Herbicido forma: vandeninis tirpalas.

Herbicidas klasifikuojamas:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Purškiant spygliuočių želdynus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro-iki melioracijos griovių.

Pakuotė: 20 l.

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams javams.

Norma: 3,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 proc. ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba. Nenaudoti sėkliniams varpinių javų pasėliams.

Žirniams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai paruduoja 75 proc. anksčių, ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba. Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliams.

Linams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 10 dienų.

Pastaba. Nenaudoti sėklinių linų pasėliams.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 3,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Pastaba. Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliams.

Pūdymams.

Norma: 2,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu 1 kartą.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo.

Norma: 2,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, javų pabiras. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu 1 kartą.

Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 14 dienų.

Vaismedžių pomedžiams.

Norma: 2,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu 1 kartą.

Pastaba. 1–2 metų soduose naudoti tik su specialia medžio kamienų apsauga.

Ne žemės ūkio paskirties plotams (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostoms, pakelėms, geležinkeliams).

Norma: 3,0–6,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti piktžolių vegetacijos metu 1 kartą.

Miškų ūkyje ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams.

Norma: 2,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus.

Purkšti augalų vegetacijos metu antžemine aparatūra birželio–rugpjūčio mėnesiais augalų 1 kartą.

Spygliuočių želdiniams.

Norma: 2,0–4,0 l/ha.

Naikina vienmetes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus.

Purškama rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo mėnesiais, pasibaigus spygliuočių vegetacijai, susiformavus einamųjų metų pumpurui antžemine aparatūra 1 kartą.

Minkštųjų lapuočių kelmams.

Norma: 1 dalis *Barclay Barbarian Biograde 360* ir 4 dalys vandens (1:4).

Birželio–rugpjūčio mėnesiais nupjovus medį, kelmai tuoj pat aptepami ar apipurškiami.