



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUMIGANTO *QUICKPHOS TABLETS 56 GE* ĮREGISTRAVIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2016 m. sausio 19 d. Nr. A1-18

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikiniančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB 40 straipsnio 1 dalies a punktu (OL 2009 L309, p. 1), 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Quickphos Tablets 56 GE* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u fumigantą *Quickphos Tablets 56 GE*, UPL Europe Ltd profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: aliuminio fosfidas 560 g/kg.

1.2. Fumiganto forma: dujas išskiriančios tabletės.

1.3. Fumigantas klasifikuojamas:

Pavojinga.

Kontaktuodama su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti.

Mirtina prarijus.

Mirtina susilietus su oda.

Mirtina įkvėpus.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Labai toksiškas vandens organizmams.

Kontaktuodama su vandeniu išskiria toksiškas dujas.

Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas.

Toksiška patekus į akis.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Saugoti nuo bet kokio galimo kontakto su vandeniu, nes smarkiai reaguoja ir gali susidaryti ugnies pliūpsnis.

Saugoti nuo drėgmės.

Laikyti tik originalioje talpykloje.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Neįkvėpti dulkių / dujų.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos, pirmiausia nuvalyti sausu audiniu, po to gerai nuplauti vandeniu. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Gaisro atveju: gesinimui naudoti sausą smėlį, sausas medžiagas ir anglies dioksidą (CO<sub>2</sub>).

Laikyti sausoje vietoje. Laikyti uždaroje talpykloje.

Laikyti užrakintą.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote.

1.4. Pakuotė: 300 g, 1000 g.

1.5. Fumigantas naudojamas:

Kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams, avižoms, sorų, sorgo grūdams, pupų ir žirnių sėkloms, laikomiems nesupakuotiems kaupuose ir grūdų talpyklose (bokštuose).

Norma: 4–5g PH<sub>3</sub>/ 1 t grūdų.

Fumiguoti 3–10 dienų (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12°C – 10 dienų, 13–15°C – 5 dienos, 16–20°C – 4 dienos, virš 20°C – 3 dienos); ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., grūdus galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.

Pastaba: Įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau kaip, kai  $\text{PH}_3$  koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė  $5^\circ\text{C}$ .

Kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams, avižoms, sorų, sorgo grūdams, pupų ir žirnių sėkloms, laikomiems supakuotiems į maišus ant padėklų.

Norma: 4–5g  $\text{PH}_3$ / 1 t grūdų

Fumiguoti 3–10 dienų (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros:  $5\text{--}12^\circ\text{C}$  – 10 dienų,  $13\text{--}15^\circ\text{C}$  – 5 dienos,  $16\text{--}20^\circ\text{C}$  – 4 dienos, virš  $20^\circ\text{C}$  – 3 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., grūdus galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.

Pastaba: Įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau kaip, kai  $\text{PH}_3$  koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė  $5^\circ\text{C}$ .

Kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams, avižoms, sorų, sorgo grūdams, pupų ir žirnių sėkloms, transportuojamiems nesupakuotiems geležinkelio vagonuose ir jūriniuose konteineriuose.

Norma: 2–5g  $\text{PH}_3$ / 1 t grūdų

Fumiguoti 3–10 dienų (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros:  $5\text{--}12^\circ\text{C}$  – 10 dienų,  $13\text{--}15^\circ\text{C}$  – 5 dienos,  $16\text{--}20^\circ\text{C}$  – 4 dienos, virš  $20^\circ\text{C}$  – 3 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., grūdus galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.

Pastaba: Įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau kaip, kai  $\text{PH}_3$  koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė  $5^\circ\text{C}$ .

Tuščioms saugykloms.

Norma: 2–5g  $\text{PH}_3$ / 1 t grūdų

Fumiguoti 3–10 dienų (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros:  $5\text{--}12^\circ\text{C}$  – 10 dienų,  $13\text{--}15^\circ\text{C}$  – 5 dienos,  $16\text{--}20^\circ\text{C}$  – 4 dienos, virš  $20^\circ\text{C}$  – 3 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val.

Pastaba: Įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau kaip, kai  $\text{PH}_3$  koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė  $5^\circ\text{C}$ .

Kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams, avižoms, sorų, sorgo grūdams, pupų ir žirnių sėkloms, transportuojamiems laivuose.

Norma: 2–4g  $\text{PH}_3$ / 1 t grūdų

Fumiguoti 9–15 dienų (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo supilto produkto aukščio: mažiau 6 metrų – 9 dienos, 6–12 metrų – 15 dienų), naudojant nedegius padėklus ar

dujoms pralaidžius maišelius; ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., grūdus galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.

Pastaba: Įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau kaip, kai  $\text{PH}_3$  koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė  $5^\circ\text{C}$ .

arba

Kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams, avižoms, sorų, sorgo grūdams, pupų ir žirnių sėkloms, transportuojamiems laivuose.

Norma: 1,5–2g  $\text{PH}_3$ / 1 t grūdų

Fumiguoti 3,5 dienas, naudojant recirkuliacijos sistemą; ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., grūdus galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.

Pastaba: Įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau kaip, kai  $\text{PH}_3$  koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė  $5^\circ\text{C}$

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Sergejus Fedotovas