



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. BIRŽELIO 6 D. ĮSAKYMO NR. A1-180 „DĖL
INSEKTICIDO *KAISO 50 EG* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“
PAKEITIMO**

2015 m. balandžio 1 d. Nr. A1- 198
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 6 d. įsakymą Nr. A1-180 „Dėl insekticido *Kaiso 50 EG* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL INSEKTICIDO *KAISO 50 EG* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2011 m. gegužės 24 d. protokole Nr. AS1-4 pateiktomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į Nufarm GmbH & Co KG prašymą, *Kaiso 50 EG* veiksmingumo vertinimo išvadas ir atsižvelgdamas į *Kaiso 50 EG* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

į r e g i s t r u o j u insekticidą *Kaiso 50 EG*, Nufarm GmbH & Co KG, profesionaliajam naudojimui iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Veiklioji medžiaga: lambda cihalotrinas 50 g/kg

Insekticido forma: emulguojančios granulės

Insekticidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Kenksmingas prarijus.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti, kai lauke yra žydinčių piktžolių. Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu.

Pakuotė: 0,6 kg, 3 kg, 6 kg

Insekticidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, miežiams, rugiams, kvietrugiams, avižoms.

Norma: 0,15 kg/ha

Naikina amarus, lemus, tripsus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 0,15 kg/ha

Naikina rapsines sprages, rapsinius žiedinukus, ankštarinius paslėptastraublius, kopūstinius stiebinius paslėptastraublius, rapsinius stiebinius paslėptastraublius, ankštarinius gumbauodžius.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 d.

Bulvėms.

Norma: 0,15 kg/ha

Naikina amarus, kolorado vabalus.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 d.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas