



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. KOVO 17 D. ĮSAKYMO NR. A1-137 „DĖL
HERBICIDO *CENTURION PLUS* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2018 m. balandžio 25 d. Nr. A1-204
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. A1-137 „Dėl herbicido *Centurion Plus* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *CENTURION PLUS* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdamas į *Centurion Plus* registracijos ataskaitos išvadas bei Arysta Life Science S. A. S. 2018 m. balandžio 5 d. prašymą:

1. Į r e g i s t r u o j u herbicidą *Centurion Plus*, Arysta Life Science S. A. S., profesionaliajam naudojimui iki 2022 m. gegužės 31 d.

- 1.1. Veiklioji medžiaga: kletodimas 120 g/l.
- 1.2. Herbicido forma: koncentruota emulsija.
- 1.3. Herbicidas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra kletodimo. Gali sukelti alerginę reakciją.

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir aerozolio.

Prarijus: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą / kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

1.4. Pakuotė: 1 l, 5 l.

1.5. Herbicidas naudojamas:

Braškėms.

Norma: 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai braškės yra 2 pilnų lapelių tarpsnyje iki kol žiedai su vainiklapiais suformuoja vainikėlį (BBCH 12–59) arba po derliaus nuėmimo, kai vienametės vienaskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių iki krūmijimosi pradžios, o daugiamesės vienaskiltės – 15–20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau 30 dienų.

Bulvėms.

Norma: 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai išsiskleidžia pagrindinio stiebo antras lapas iki kol tarpueiliuose susilieja 30 proc. augalų (BBCH 12–33), vienametės vienaskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių iki krūmijimosi

pradžios, o daugiametės vienaskiltės – 15–20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.

Morkoms.

Norma: 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiabetes vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai išsiskleidę du tikrieji lapeliai, kol šaknis padidėja iki 50 proc. būdingo dydžio (BBCH 12–45), vienametės vienaskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienaskiltės – 15–20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 40 dienų.

Svogūnams.

Norma: 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiabetes vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai gerai matomas antras lapelis iki svogūnų gumbai yra 50 proc. skersmens (BBCH 12–45), vienametės vienaskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienaskiltės – 15–20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 56 dienoms.

Baltagūžiams, raudongūžiams, briuseliniams, savojiniam kopūstams.

Norma: 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiabetes vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai gerai matomas 2 lapelis iki kol augalai pradeda formuoti gūžes (BBCH 12–41), vienametės vienaskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienaskiltės – 15–20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Pupoms.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiabetes vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai pupos yra 2 tikrųjų lapelių tarpsnyje iki kol išsiskleidžia 9 ar daugiau lapelių (BBCH 12–19), vienametės vienaskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienaskiltės – 15–20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 30 dienų.

Žirniams.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai žirniai yra 2 tikrųjų lapelių tarpsnyje iki matomi 9 ar daugiau tarpubamblių (BBCH 12–39), vienametės vienaskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienaskiltės – 15–20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai rapsai turi 2 lapelius iki stiebo ilgėjimo pradžios (BBCH 12–30), vienametės vienaskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienaskiltės – 15–20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 90 dienų.

Cukriniams ir pašariniams runkeliams, raudoniesiems burokėliams.

Norma: 1,0–2,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kai išsiskleidę 2 tikrieji lapeliai, kol lapai uždengia 30 proc. tarpueilių (BBCH 12–33), vienametės vienaskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienaskiltės – 15–20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.

Linams.

Norma: 1,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes piktžoles.

Purkšti, kol linai pasiekia 20 cm aukščio, vienametės vienaskiltės piktžolės yra nuo 3 lapelių iki krūmijimosi pradžios, o daugiametės vienaskiltės – 15–20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 70 dienų.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.“