



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL BIOLOGINIO FUNGICIDO *MYCOSTOP* PERREGISTRAVIMO  
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2015 m. balandžio 3 d. Nr. A1-205  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Mycostop* registracijos ataskaitos išvadamis,

p e r r e g i s t r u o j u biologinį fungicidą *Mycostop*, Verdera Oy, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. balandžio 30 d.

Veiklioji medžiaga: *Streptomyces* štamai K61 32 proc. pagal masę, nominaliai  $5 \cdot 10^8$  kfv/g

Biologinio fungicido forma: šlampantys milteliai

Biologinis fungicidas klasifikuojamas:

Sudėtyje yra *Streptomyces K61*. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Stengtis neįkvėpti dulkių.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 2 g, 5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100g, 250 g

Biologinis fungicidas naudojamas:

Daržovių, prieskoninių žolelių, dekoratyvinių augalų sodinukams.

Norma: 2–10 g/100 m<sup>2</sup>

Saugo nuo *Fusarium sp.*, *Pythium sp.* ir *Phytophthora sp.* sukeliama šlapiojo puvinio, šaknų ir stiebų puvinio bei vytimo.

Sudrėkinti auginimo substratą, mirkyti substratą arba įmaišyti į substratą augalų sodinimo ar persodinimo į vazonus metu.

Vaisinėms daržovėms (pomidorams, agurkams, paprikoms).

Norma: 2–10 g/100 m<sup>2</sup> lysvėse arba 5–20 g/1000 augalų

Saugo nuo *Fusarium sp.*, *Pythium sp.* ir *Phytophthora sp.* sukeliama šlapiojo puvinio, šaknų ir stiebų puvinio bei vytimo.

Persodinimo metu *Mycostop* į auginimo substratą supilti per dirvožemio sumirkymo arba lašinio drėkinimo sistemas.

Dekoratyviems augalams (vazoniniams augalams, skinamoms gėlėms, įšaknytiniams ūgliams).

Norma: 1–10 g/100 m<sup>2</sup> lysvėse arba 5–20 g/1000 augalų

Saugo nuo *Fusarium sp.*, *Pythium sp.* ir *Phytophthora sp.* sukeliama šlapiojo puvinio, šaknų ir stiebų puvinio bei vytimo.

Sudrėkinti auginimo substratą, mirkyti substratą arba įmaišyti į substratą augalų sodinimo ar persodinimo į vazonus metu.

Lapinėms daržovėms ir prieskoninėms žolelėms hidroponinio auginimo sistemose.

Norma: 1 g/1000 augalų

Saugo nuo *Fusarium sp.*, *Pythium sp.* ir *Phytophthora sp.* sukeliama šlapiojo puvinio, šaknų ir stiebų puvinio bei vytimo.

Persodinus augalus supilti vandeninį *Mycostop* tirpalą į cirkuliuojantį maitinamąjį tirpalą.

Daržovių, prieskoninių žolelių, dekoratyvinių augalų sėkloms.

Norma: 2–8 g/1 kg sėklų

Saugo nuo *Fusarium sp.*, *Pythium sp.* ir *Phytophthora sp.* sukeliama šlapiojo puvinio, šaknų ir stiebų puvinio bei vytimo.

Sausai apdoroti daržovių, prieskoninių žolelių, dekoratyvinių augalų sėklas prieš sėją.

Substratui, skirtam sodinukų, lapinių daržovių ir prieskoninių žolelių auginimui. Įmaišymas į auginimo terpę.

Norma: 1–10 g/1 m<sup>3</sup>

Saugo nuo *Fusarium sp.*, *Pythium sp.* ir *Phytophthora sp.* sukeliama šlapiojo puvinio, šaknų ir stiebų puvinio bei vytimo.

Purkšti, sumirkyti auginimo substratą arba įmaišyti vandeninį *Mycostop* tirpalą į auginimo terpę prieš sėją, sodinimą į vazonėlius arba persodinimą.

Direktoriaus pavaduotojas,  
atliekantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Basiulis