



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

DĖL BEICO *BAYTAN TRIO* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI

2014 m. sausio 23 d. Nr. A1- 21
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančiu Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L309, p. 1), 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Baytan Trio* registracijos ataskaitos išvadomis,

į r e g i s t r u o j u beică *Baytan Trio*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. liepos 31 d.

Veikliosios medžiagos: fluopiramas 5 g/l + fluoksastrobinas 25 g/l + triadimenolas 150 g/l.

Beicas klasifikuojamas:

Pavojingas.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzisothiazol-3(2H)-1. Gali sukelti alerginę reakciją.

Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti užrakintą.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aukštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti beicavimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, beicuotas sėklas būtina visiškai įterpti į dirvą, užtikrinti, kad beicuotos sėklos būtų visiškai įterptos lauko gale.

Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, pabirusios beicuotos sėklos turi būti pašalinamos.

Pakuotė: 5 l, 25 l.

Beicas naudojamas:

Žieminiam kviečiams.

Saugo nuo kietųjų kūlių, dulkančiųjų kūlių, pašaknio puvinų, pavasarinio pelėsio, miltligės.

Norma: 2,0 l/t.

Beicuoti naudojant 5–10 l/t tirpalo.

Vasariniams kviečiams.

Saugo nuo kietųjų kūlių, dulkančiųjų kūlių, pašaknio puvinų, miltligės.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Beicuoti naudojant 5–10 l/t tirpalo.

Žieminiam rugiams.

Saugo nuo stiebinių kūlių, pašaknio puvinų, pavasarinio pelėsio, rinchosporiozės, miltligės.

Norma: 2,0 l/t.

Beicuoti naudojant 5–10 l/t tirpalo.

Žieminiam kvietrugiams.

Saugo nuo pašaknio puvinų, pavasarinio pelėsio, rinchosporiozės, miltligės.

Norma: 2,0 l/t.

Beicuoti naudojant 5–10 l/t tirpalo.

Vasariniams kvietrugiams.

Saugo nuo pašaknio puvinų, rinchosporiozės, miltligės.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Beicuoti naudojant 5–10 l/t tirpalo.

Žieminiams miežiams.

Saugo nuo dulkančiųjų kūlių, juostuotosios dryžligės, tinkliškosios dryžligės, pašaknio puvinių, pavasarinio pelėsio, rinchosporiozės, miltligės.

Norma: 2,0 l/t.

Beicuoti naudojant 5–10 l/t tirpalo.

Vasariniams miežiams.

Saugo nuo dulkančiųjų kūlių, juostuotosios dryžligės, tinkliškosios dryžligės, pašaknio puvinių, rinchosporiozės, miltligės.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Beicuoti naudojant 5–10 l/t tirpalo.

Avižoms.

Saugo nuo dulkančiųjų kūlių, pašaknio puvinių.

Norma: 1,5–2,0 l/t.

Beicuoti naudojant 5–10 l/t tirpalo.

Direktorius

Jonas Lisauskas