



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *GLYPHOMAX 480* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2012 m. liepos 24 d. Nr. A1-223
Vilnius

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2012 m. birželio 7 d. protokole Nr. AS1-4 pateiktomis rekomendacijomis,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Glyphomax 480*, Dow Agro Sciences Denmark A/S, profesionaliajam naudojimui iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Veiklioji medžiaga: glifosatas 480 g/l.

Herbicidas klasifikuojamas:

-

Rizikos frazės:

Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos frazės:

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mėvėti tinkamas pirštines.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Specialiosios saugos frazės:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l, 640 l.

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams, miežiams, kvietrugiams, rugiams, avižoms.

Norma: 1,5–2,25 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniams pasėliams.

Žirniams.

Norma: 1,5–3,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai paruduoja 70-75% ankščių, ne vėliau kaip 10 dienų iki derliaus nuėmimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes, didesnė – daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniams pasėliams.

Pupoms.

Norma: 2,25–3,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai paruduoja 75% ankščių, ne vėliau kaip 10 iki derliaus nuėmimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiameses vienaskiltes, didesnė – daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniams pasėliams.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.

Norma: 2,25–3,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai sėklų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30% , ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: Nenaudoti sėkliniams pasėliams.

Pūdymams.

Norma: 2,25–4,5 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Ražienoms.

Norma: 1,125–1,5 l/ha.

Naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Norma: 2,25–3,0 l/ha.

Naikina daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Pastaba: žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Sėklinių žolių ražienoms.

Norma: 2,25–4,5 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vaismedžių (obelų, kriaušių, vyšnių, slyvų) pomedžiams.

Norma: 1,5–4,5 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis, ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiabetes vienaskiltes, didesnė – daugiabetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pastaba: nenaudoti 1–2 metų vaismedžių sodų pomedžiuose.

Plotuose prieš sėją.

Norma: 0,75–1,5 l/ha.

Naikina javų pabiras.

Norma: 2,25 l/ha.

Naikina varpučius.

Purkšti vegetuojančias piktžoles prieš pavasarinę dirvos dirbimą ne daugiau kaip 1 kartą.

Sėjant į ražienas.

Norma: 1,5–3,0 l/ha.

Purkšti po sėjos vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pastaba: sėklos turi būti gerai įterptos į dirvą.

Ne žemės ūkio paskirties plotams (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostoms, pakelėms, geležinkeliams).

Norma: 2,25–4,5 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Spygliuočių želdiniams.

Norma: 1,5–4,5 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus.

Purkšti vegetuojančias piktžoles rudenį, kai spygliuočių augimas sustojęs ir ūgliai visiškai sumedėję ne daugiau kaip 1 kartą.

Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas, krūmus.

Lapuočių medžių kelmams.

Teptuku tepti arba apipurkšti kelmus kirtimo dieną, siekiant išvengti atžėlimo, tirpalu: 1 dalis *Glyphomax 480* ir 4 dalys vandens.

Direktorius

Evaldas Zigmantas Čijauskas