



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *GLOBAZTAR 250 SC* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2017 m. balandžio 27 d. Nr. A1-230
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), atsižvelgdamas į *Globaztar 250 SC* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Globaztar 250 SC*, Globachem NV, profesionaliajam naudojimui iki 2022 m. gruodžio 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: azoksistrobinas 250 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota suspensija.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kenksminga įkvėpus.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė : 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, kviečių dryžligės, miltligės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams kvietrugiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo lapų septoriozės, kviečių dryžligės, miltligės, rinchosporiozės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams rugiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo rinchosporiozės, rudųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo tinkliškosios dryžligės, miltligės, rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Avižoms.

Norma: 0,5–1,0 l/ha.

Saugo nuo avižų dryžligės, vainikuotųjų rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu, ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.