



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M.  
BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-165 „DĖL HERBICIDO *HARMONY 50 SX*  
ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI PAKEITIMO**

2015 m. balandžio 20 d. Nr. A1-237  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. A1-165 „Dėl herbicido *Harmony 50 SX* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *HARMONY 50 SX* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2006 m. vasario 14 d. protokole Nr. 2 ir 2006 m. birželio 6 d. protokole Nr. 4 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Harmony 50 SX* klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, išvadas,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Harmony 50 SX*, Du Pont Finland Ltd. profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: tifensulfuronmetilas 500 g/kg

Herbicido forma: vandenyje tirpios granulės

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 2 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti lengvos mechaninės sudėties dirvožemiuose, kuriuose organinių medžiagų kiekis mažesnis nei 1 proc.

Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, nenaudoti augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra tifensulfuronmetilo, daugiau kaip 1 kartą per sezoną.

Pakuotė: 5 × 22,5 g (vandenyje tirpiuose pakeliuose)

Herbicidas naudojamas:

Pašariniams kukurūzams.

Norma: 0,011–0,015 kg/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga (50 ml/100 l purškiamojo tirpalo).

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės išskleidžia 2, o kukurūzai – 3–6 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams ir žieminiams kviečiams, vasariniams ir žieminiams miežiams, avižoms su / be varpinių žolių įsėliu.

Norma: 0,023 kg/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga (50 ml/100 l purškiamojo tirpalo)

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, iki kol piktžolės išskleidžia 2 lapelius, o žieminiai javai yra nuo krūmijimosi iki 2 bamblio tarpsnio, vasariniai – išskleidę 1–4 lapelius, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams ir žieminiams kviečiams, vasariniams ir žieminiams miežiams, avižoms su liucernos įsėliu.

Norma: 0,015 kg/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga (25 ml/100 l purškiamojo tirpalo)

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, iki kol piktžolės išskleidžia 2 lapelius, o žieminiai javai yra nuo krūmijimosi iki 2 bamblio tarpsnio, vasariniai – išskleidę 1–4 lapelius, o liucerna turi 1 tikrąjį lapelį, ne daugiau kaip 1 kartą.

Varpinių žolių pievoms ir ganykloms.

Norma: 0,030–0,038 kg/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga (50 ml/100 l purškiamo tirpalo).

Naikina dviskiltes piktžoles.

Pievas ir ganyklas purkšti 2–3 savaitės po šienavimo, kai piktžolės intensyviai atauga, ne daugiau kaip 1 kartą. Didesniąją normą naudoti rūgštyinėms naikinti.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas