



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2007 M. SPALIO  
15 D. ĮSAKYMO NR. A1-259 „DĖL FUNGICIDO ACANTO 250 SC ĮREGISTRAVIMO  
PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. balandžio 22 d. Nr. A1-244  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2007 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. A1-259 „Dėl fungicido *Acanto 250 SC* įregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO ACANTO 250 SC ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2007 m. rugsėjo 25 d. protokole Nr. 6 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Acanto 250 SC* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL, 2008 L 353, p.1), išvadas,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Acanto 250 SC*, Du Pont Finland Ltd., profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: pikoksistrobinas 250 g/l

Fungicido forma: koncentruota suspensija.

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono Gali sukelti alerginę reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną (kai naudojimo norma yra 0,5 l/ha) ir 10 metrų apsaugos zoną (kai naudojimo norma yra 1 l/ha) iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 5 l

Fungicidas naudojamas:

Žieminiams ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha

Saugo nuo miltligės, rudųjų, geltonųjų, juodųjų rūdžių, kviečių dryžligės, septoriozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip du kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Pastaba: didžiausia norma per sezoną 1,0 l/ha.

Žieminiams ir vasariniams miežiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha

Saugo nuo miltligės, smulkiųjų rūdžių, tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip du kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Pastaba: didžiausia norma per sezoną 1,0 l/ha.

Žieminiams rugiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha

Saugo nuo miltligės, rudųjų, juodųjų rūdžių, rinchosporiozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip du kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Pastaba: didžiausia norma per sezoną 1,0 l/ha.

Žieminiams kvietrugiams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha

Saugo kvietrugius nuo miltligės, rudųjų rūdžių, rinchosporiozės, septoriozės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip du kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Pastaba: didžiausia norma per sezoną 1,0 l/ha.

Avižoms.

Norma: 0,5 l/ha

Saugo avižas nuo miltligės, vainikuotųjų rūdžių, avižų dryžligės.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip du kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 d.

Pastaba: didžiausia norma per sezoną 1,0 l/ha.

Žieminiams ir vasariniams rapsams, rapsiukams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha

Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip vieną kartą, ne vėliau kaip baigiant rapsams, rapsiukams žydėti (BBCH 69).

Cukriniams runkeliams.

Norma: 0,5–1,0 l/ha

Saugo nuo miltligės, baltulių, rudmargės, dalinai nuo rūdžių.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip du kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 d.

Pastaba: didžiausia norma per sezoną 1,0 l/ha.“

Direktorius

Sergejus Fedotovas