



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *BANVEL 4 S (A7254B)* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

2014 m. rugpjūčio 4 d. Nr. A1-246  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir *Banvel 4 S (A7154B)* registracijos ataskaitos išvadomis,

p e r r e g i s t r u o j u herbicidą *Banvel 4S (A7254B)*, Syngenta Crop Protection AG, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Veiklioji medžiaga: dikamba 480 g/l.

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5l.

Herbidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, kvietrugiams, rugiams, miežiams.

Norma: 0,15–0,2 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti javų krūmijimosi metu (BBCH 21–29) ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, miežiams, avižoms.

Norma: 0,15–0,2 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti javų krūmijimosi metu (BBCH 21–29) ne daugiau kaip 1 kartą.

Kukurūzams.

Norma: 0,3–0,6 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai kukurūzai yra 2–8 lapelių tarpsnyje (BBCH 12–18) ne daugiau kaip 1 kartą.

Pūdymams.

Norma: 0,3–1,0 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti pavasarį piktžolėms intensyviai augant iki žiedinių pumpurų pasirodymo ne daugiau kaip 1 kartą.

Ne žemės ūkio paskirties plotams, dirvonams.

Norma: 0,75 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti pavasarį–vasarą piktžolėms intensyviai augant, kai jos yra 15–20 cm aukščio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Ražienoms.

Norma: 0,75 l/ha.

Naikina vienametes ir daugiameses dviskiltes piktžoles.

Purkšti po derliaus nuėmimo sudygus išbirusioms sėkloms ne daugiau kaip 1 kartą.