



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSAKYMO NR. A1-180 „DĖL  
HERBICIDO *ALLY MAX SX* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“  
PAKEITIMO**

2015 m. balandžio 23 d. Nr. A1-250  
Vilnius

P a k e i ė i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. A1-180 „Dėl herbicido *Ally Max SX* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *ALLY MAX SX* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2012 m. birželio 7 d. protokole Nr. AS1-4 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Ally Max SX* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), išvadas,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Ally Max SX*, Du Pont Finland Ltd., profesionaliajam naudojimui iki 2017 m. vasario 28 d.

Veikliosios medžiagos: metsulfuronmetilas 143 g/kg + tribenuronmetilas 143 g/kg

Herbicido forma: vandenyje tirpios granulės

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra tribenuronmetilo. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant apsaugoti požemį vandenį nenaudoti šarminiuose ( $\text{pH} > 7$ ) dirvožemiuose.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra metsulfuronmetilo, dažniau kaip kartą per dvejus metus.

Pakuotė: 115 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 3 kg

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, rugiams, kvietrugiams, miežiams.

Norma: 0,021 kg/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai javai yra krūmijimosi–paskutiniojo lapo (BBCH 20-39) tarpsnyje, o piktžolės yra nuo skilčialapių iki 4 lapelių tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams kviečiams, kvietrugiams, miežiams, avižoms.

Norma: 0,021 kg/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai javai yra dviejų lapelių–paskutiniojo lapo (BBCH 12–39) tarpsnyje, o piktžolės yra nuo skilčialapių iki 4 lapelių tarpsnio, ne daugiau kaip 1 kartą.“