



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *FROWNCIDE* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2014 m. rugpjūčio 5 d. Nr. A1-250
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu ir atsižvelgdamas į ISK BioSciences Europe NV 2014 m. liepos 11 d. pateiktą paraišką,

į r e g i s t r u o j u fungicidą *Frowncide*, ISK BioSciences Europe NV, profesionaliajam naudojimui iki 2020 m. vasario 28 d.

Veiklioji medžiaga: fluazinamas 500 g/l.

Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius.

Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti dirvos organizmus nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra fluazinamo, dažniau kaip kas antrus metus tame pačiame lauke.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną purškiant bulves ir 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais, purškiant svogūnus iki paviršinio vandens telkinių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Pakuotė: 1 l.

Fungicidas naudojamas:

Bulvėms.

Norma: 0,4 l/ha.

Saugo nuo bulvių maro.

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 8 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Svogūnams.

Norma: 0,4 l/ha.

Saugo nuo lapų dėmėtligės (*Botrytis squamosa*) ir netikrosios miltligės (*Peronospora destructor*).

Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 d.

Direktorius

Sergejus Fedotovas