



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2005 M. SPALIO
21 D. ĮSAKYMO NR. 193 „DĖL HERBICIDO *GRANSTAR PREMIA 50 SX*
ĮREGISTRAVIMO“ PAKEITIMO**

2015 m. balandžio 23 d. Nr. A1-252
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2005 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. 193 „Dėl herbicido *Granstar Premia 50 SX* įregistravimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL HERBICIDO *GRANSTAR PREMIA 50 SX* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2005 m. rugsėjo 27 d. protokole Nr. 5 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Granstar Premia 50 SX* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1), išvadas,

į r e g i s t r u o j u herbicidą *Granstar Premia 50 SX*, DuPont Finland Ltd., profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: tribenuron metilas 500 g/kg

Herbicido forma: vandenyje tirpios granulės

Herbicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti dulkių / rūko / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti augalų apsaugos produkto šarminės reakcijos ($\text{pH} > 7$) dirvožemiuose.

Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, nenaudoti augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra tribenuronmetilas, daugiau kaip 1 kartą per sezoną.

Pakuotė: 150 g, 225 g, 300 g, 1,5 kg

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams, rugiams.

Norma: 15–22,5 g/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius (BBCH 12–14), o javai yra nuo 2 lapelių iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 12–39), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams miežiams, kviečiams.

Norma: 15–22,5 g/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga

Naikina dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai piktžolės turi 2–4 lapelius (BBCH 12–14), o javai yra nuo 2 lapelių iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 12–39), ne daugiau kaip 1 kartą.“