



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS TARNYBOS VIRŠININKO 2006 M.  
BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. A1-112 „DĖL HERBICIDO *ATTRIBUT 70 SG*  
PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2015 m. balandžio 24 d. Nr. A1- 274  
Vilnius

P a k e i č i u Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. A1-112 „Dėl herbicido *Attribut 70 SG* perregistravimo profesionaliam naudojimui“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

**„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL HERBICIDO *ATTRIBUT* PERREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI**

Vadovaudamasis Konsultavimo komisijos 2006 m. balandžio 14 d. protokole Nr. 3, 2006 m. rugsėjo 26 d. protokole Nr. 6 pateiktomis rekomendacijomis ir atsižvelgdamas į *Attribut* klasifikavimo pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1), išvadas,

p e r r e g i s t r u o j u herbicidą *Attribut*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: natrio propoksikarbazonas 700 g/kg

Herbicido forma: vandenyje tirpstančios granulės

Herbidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti keliamos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro – iki melioracijos griovių.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti lengvos mechaninės sudėties dirvožemyje (smėlio ir lengvo priesmėlio).

Pakuotė: 120 g, 300 g, 320 g, 1 kg

Herbicidas naudojamas:

Žieminiams kviečiams.

Norma: 0,06–0,1kg/ha

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes, kai kurias vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai javai yra nuo 3 lapo išsiskleidimo iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13–29), ne daugiau kaip 1 kartą. Varputis jautriausias, kai išskleidžia 3–5, o kitos piktžolės – 2–3 lapelius.

Vasariniams kviečiams.

Norma: 0,06 kg/ha

Naikina vienametes ir daugiameses vienaskiltes, kai kurias vienametes dviskiltes piktžoles.

Purkšti, kai javai yra nuo 3 lapo išsiskleidimo iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13–29), ne daugiau kaip 1 kartą. Varputis jautriausias kai išskleidžia 3–5, o kitos piktžolės – 2–3 lapelius.“

Veiklos, planavimo ir kontrolės skyriaus vedėja,  
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė