



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL FUNGICIDO *ALLETTE* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2016 m. gegužės 4 d. Nr. A1-277  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsniu, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinancio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB 40 straipsnio 1 dalies a punktu (OL 2009 L309, p. 1), 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 127), ir atsižvelgdama į *Aliette* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Aliette*, Bayer Crop Science AG, profesionaliajam naudojimui iki 2019 m. balandžio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: aliuminio fosetilas 800 g/kg.

1.2. Fungicido forma: vandenyje dispersiškos granulės.

1.3. Fungicidas klasifikuojamas:

Atsargiai.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.

Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotė: 1 kg, 5 kg.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Salotoms, prieš persodinimą.

Norma: 3 kg/ha.

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti prieš persodinimą, ne daugiau kaip 1 kartą.

Salotoms, po persodinimo.

Norma: 3 kg/ha.

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti po persodinimo praėjus 1 savaitei, kai augalai gerai įsišaknija ir turi 2–4 lapelius, kas 7–14 dienų, ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Agurkams, auginamiems lauke.

Norma: 3–4 kg/ha.

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti profilaktiškai, kai susidaro palankios sąlygos ligai plisti, kas 8–14 dienų, ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

arba

Agurkams, auginamiems lauke.

Norma: 4 kg/ha.

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, kas 8–14 dienų, ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Agurkams, auginamiems šiltnamiuose.

Norma: 0,3–0,4 proc. tirpalas.

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Purkšti profilaktiškai, kai susidaro palankios sąlygos ligai plisti, kas 8–14 dienų, ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Dekoratyviems augalams, auginamiems šiltnamiuose.

Norma: 0,05–0,1 proc. tirpalas.

Saugo nuo šaknų ir pašaknio ligų, kurias sukelia (*Pythium spp.*, *Phytophthora spp.*) patogenai.

Laistyti prieš arba po sodinimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Dekoratyviniais augalams, auginamiems šiltnamiuose.

Norma: 0,25–0,5 proc. tirpalas.

Saugo nuo šaknų ir pašaknio ligų, kurias sukelia (*Pythium spp.*, *Phytophthora spp.*) patogenai.

Apdoroti naudojant laistymo sistemą prieš pasireiškiant ligos požymiams, kas 10 dienų, ne daugiau kaip 2 kartus.

Pastaba: Mažesniąją normą naudoti smulkesniems augalams ir jei infekcija nėra intensyvi.

Orchidėjoms.

Norma: 0,125 proc. tirpalas.

Saugo nuo šaknų ir pašaknio ligų, kurias sukelia (*Pythium spp.*, *Phytophthora spp.*) patogenai.

Apdoroti naudojant laistymo sistemą prieš pasireiškiant ligos požymiams, ne daugiau kaip 2 kartus.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius pavaduotoja,  
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė